



276-36

R71

617

Ref 276

11-36

276-36

AVRELII
COR. CELSI
DE RE MEDICA
LIBRI VIII.

*

ITEM

Qu. Sereni Liber de Medicinâ.
Qu. Rhemnij Fannij Palæmonis
de Pond. & Mensuris Liber.

*Omnia ex diversorum codicum dili
gentissima collatione castigata.*

LYG DVNI,
Apud Ioan. Tornæsum, & Gu-
lielmum Gazejum.

1554

UNIVERSITY





NVIDIT profecto Fortuna popu-
 lo Romano integrā, absolutamq; feli-
 citatem. Nam cum bellis artibus, &
 reipublica administranda peritia, ea
 ciuitas omnibus omnino præstiterit nationibus,
 quæ vel antecesserūt, vel sequuta sunt Romanum
 imperium: de erat illi certè nihil ad cumulū vir-
 tutum omnium, nisi vt doctrinæ, atq; literas ex-
 coleret: quarū iamdiu tamen gloriā ingeniosissi-
 ma, ac desertissima Græcia cum scribēdo, tum di-
 cendo occupasse videbatur. Verūm eisi serò Elo-
 quentiā, Philosophiamq; attigerit: tantos tamē in
 utraq; progressus fecit, vt multos Roma habuerit
 nobilissimos homines postremis temporibus, nō sō-
 lum Philosophia deditos, sed in ea iam excellentes
 atque perfectos. Eloquentia verò tantū in ea vrbe
 sibi paucissimus annus vēdicauit, vt eloquentissi-
 mas Athenas vel æquarit, vel paruo illi proxi-
 ma intervallo fuerit: id quod probare esset aut fa-
 cile, aut necessarium, si præclarissimæ extarent illo-
 rū monumenta, qui plurimum dicendo potuerit,
 Antoniorū scilicet, & Catonū, & Crassi, & Ce-
 sariū, & Truci, & aliorū prope innumerabilium:
 aut nisi vnus esset Cicero, quē omnibus aut præ-
 ferre, aut comparare saute, opponereq; valeamus.
 Itaq; in Astrologiis, in Geometria, in Dialecticis,
 omnib;q; ys artibus, quæ in veri inuestigatione

versantur, legimus dignū conatibus suis praestitisse Romana ingenia: sola autem Medicina ars, maximè salutaris, neglecta ab illis, inculta iacuit, ac derelicta: eā enim unā Gracarū artiū nō exercuisse Romanā gravi. atē, testis est Plinius: quin immo idem ipse scribit, Pop. Romanum medicina avidum expertū demum damnasse: itaq; caruisse medicis ad annū sexcētesimū: quod voluisse eos credendum est non artis odio, sed artificum: idq; Marcus Cato ad Marcum filium scribens manifestissimè docet. Quod si aut Hippocratem habuisset Roma, cui civium suorum salutem commendaret, aut Galeni interpretis monumenta cognovisset: quemadmodū & in re militari, & in rebus ceteris aut superavit omnes alias nationes, aut illis proxima fuit, & interdū equalis: verisimile est, in Medicina quoque excellētem futuram fuisse industriam suā. Hanc tamen partē ut ostenderet Cornelius Celsus nō esse supra vires Romanas, cum eloquentissimè & peritissimè tractavit octo libris: in quibus nō solum eius partis, quae vitæ, & eius quae medicamentis, sed illius etiā, quae manū medetur, praecepta copiosissime dedit. A plerisq; autē dubitari video, an artem Cornelius exercuerit, alijs existimantibus caruisse illū usū: vel quia quadā prodidit artē coarguentia, qualia sunt, quae de venarū pulsu, & urinae indicijs, ac de imperibus diebus, Asclepiadē sequutus, tradidit: vel quia in ponendis constituendisq; prae-

pris longissimè abijt à consuetudine eorum, qui de re medica ante illū scripserūt, alijs verò credentibus, nō potuissē eum tā multa, tamq; insigniter & articulatē nouisse, tamq; postremo appositē ad usum, ut interdū multus sit in describēda via, & ratione exercendi artificis actus: nisi eam aliter quā cogitādo & audiendo, & legendo didicisset. Quamuis autē eorū, qui Cornelium fuisse medicū negant, & ratio, & autoritas me parū moueat: constat enim & Asclepiadē, & Themisonē eius discipulū, & Thessalum tam saepe, tamq; vehementer à Galeno damnatū, aberrasse à placitis & à doctrina maiorū, cum tamē omnes medicinā usu ipso professi fuerint: quamobrē mirū non est, si in tam erratica disciplina, vixq; tādem autore Galeno consistente, idq; non tam certitudine rei, quā imbecillitate eorū, qui post Galenū fuerūt, libuit Cornelio modo ingenioq; suo potius, quam ex aliorū consuetudine scribenti, eorum mutare precepta, quibus superiorū delere placita, & mendando & scribendo licuerat. Quamuis, inquā, me parū illi moueāt: adducor tamē, nisi fallor, certissimis ad suspiciandū argumentis, idē molitū fuisse Cornelii, quod Empedoclē, & Democritū fecisse legimus: scilicet, ut eam artē nō veluti purus medicus, atq; ad quæstū omnibus expositus, sed tanquā sapiens, cen partē Philosophiæ explicaret, eam cū studio sapientiæ cōiungens. Nam cū Plinius naturalis hystoriæ libros digesserit, indicans qui-

bus autoribus, testibusq; niteretur: libro primo, quē indicis loco esse voluit, separatim autorū meminit & medicorū: neq; unquā retulit Cornelium in medicos, sed in autores: Ex autoribus, inquit, C. Valgio, Cornelio Celso, M. Varrone, &c. deinde subiicit externos: postremo numerat medicos, in quibus nusquā Cornelij nomē legitur. Quod si aut ille se medicū fuisset professus, aut alij in numerū medicorū Cornelium recepiſſent, Plinius illū certē non separasset in singulorū librorū indice à medicis. Constat præterea, vixisse Cornelium aut Augusti, aut Tiberij tēporibus, aut C. Caesaris: cū Columella, qui Claudio potiente rerum scripsit de re Rustica libros, mentionē fecerit eius, tanquam superioris: quā etate, si Plinio credimus, paucissimi Quiritum artē medicā profitebantur, delegata ea cura ac meditatione vel Græcis hominibus, vel libertis, aut servis: quales fuerut Sallustius, Dioscorus, & Curio, & ij, quos supra nominavi: quāobrem occidenti medicū, quod plerunq; servi essent, pœna erat ex constitutionibus non valde magnæ pecunia: liberi enim hominis nulla est æstimatio. Cornelium verò fuisse ingenuum Romanū satis indicant tria nomina: cum liberos constet duobus, servos autē uno tantum nomine fuisse demonstratos. Caterum qualis qualis ille fuerit, dignus est profectō vel doctrina vel elegantia non solum qui legatur, sed qui semper habeatur in manibus. Quamvis autem ubiq; illum reprehendat Fabius

Quint

Quintilianus: itaq; interdum leuiter, ut studio id
 eū efficere cognoscas & a mulatione (si uis sit enim
 uterq; Rhetoricos libros) tamen ueritate ita cogē-
 te, eruditū uirum eum appellat, lib. IX. & lib. se-
 quenti. scripsit, inquit, non parū multa Cornelius
 Celsus, Scepticos sequutus, nō sine cultu, ac nitore.
 Columella uero lib. 11. de re rustica, eū fuisse tra-
 dit non solum agricolationis, sed uniuersa natu-
 ra prudētē. Cum Cornelius & ius ciuile, et phi-
 losophiā monumentis illustrauerit, suis & rei mi-
 litaris, & rustica etiam & medicina precepta re-
 liquerit: dignus (ut ait idē Fabius) uel ipso pro-
 posito, ut eum scisse omnia illa credamus: quis erit
 qui se satis putet eruditū, cui ea, quæ supersunt,
 reliquia uigiliarum tam elaboratarū ignota fue-
 rint? Quædam tamē ab eo fateor esse prodita, quæ
 uel insolentia, uel nouitate deterrere lēctore pos-
 sunt: quale illud est, quod de aqua frigida libro
 primo traditur: quæ infusa, putat ille sanari posse
 infirmitatem capitis, & prater ea uitari grauedi-
 nes, ac destillationes: quibus intēperantia uultus,
 & incōtinentia uoluptatū præcipue atas hæc no-
 stra grauissimè torquetur. Caterum si balneis nūc
 uteremur, ubi calida sordes mundarētur capitis,
 & sudor vapores iā itinere patefacto emitteret,
 itaq; quotidie quasi caput purgaretur: non esset
 fortasse usus aqua frigida tam periculosus, quam
 uulgo creditur. Neq; etiam ille simpliciter insun-
 di frigidam iubet, sed calidariū proponit, in quo

sudetur: & calida aqua perfundi præcipit, tū tepida, deinde frigida. Plin. item lib. XXVIII. capito IIII. Perfundere, inquit, caput aqua calida ante balnearū vaporatiōē, & postea frigida, saluberrimū intelligitur. Qua res profectō nisi esset valde salutaris, neq; imperitē eam & imprudenter tum præcisè laudasset Cornelius: neq; Plinius ita manifestè idem probaret: cū præsertim Senecam eo remedio semper usum fuisse legamus: cuius rei certè rationem reddere possim à re medica nō abhorrentem, si aut id mihi ab initio proposuissē, cū epistolam hanc scribere institui: aut esset hoc muneris partiumq; mearum. Illud equidem animaduerti, sequuti esse Cornelium in plerisq; Hippocrate, quem lib. VII. parentē omnis medicine appellat: quamobrem non potest hic noster Latinus Hippocrates reprehendi, quin alteri quoq; idem vitiū tribuatur. nam si dixerimus, nimis generaliter, & nulla reddita causa hunc frequenter præcepta dedisse medicina: cū eadem sit ratio atq; via Hippocratis, interpretandus potius, & distinctionibus explicandus erat Cornelius, quàm improbandus, atq; reijciendus: id quod videmus in Hippocrate factū fuisse à Galeno, non tam, quàm isti sunt, delicato & moroso, certè tamen doctiori atq; peritiori. ita enim didicissent medici, à Cornelio de rebus ad artē suam pertinētibus proprijs, suisq; Latinis vocibus loqui: & hunc gravissimū in primis auctorē loco suo, suisq; sedibus posuisset:

& postremo planam fecissent hominibus, non ab-
 horrere penitus à vero, quod à Cicerone scriptum
 fuit. Omnia Latinos inuenisse melius, quàm Græ-
 cos: aut ab illis accepta fecisse meliora. Sed inuidit
 (ut dixi) Fortuna cunctam Romanis hominibus
 felicitatē. Nos verò, qui aliquid nostra cura pra-
 stare posse fortasse credimur Cornelio, quòd eo iā-
 diu utamur magistro scribendi, atq; vinēdi (quā-
 uis illi ignauia forte nostra non aequē stylum ac sa-
 lutem debeamus) nonnihil tēporis consumpsimus
 in recognoscendo hoc eruditissimo autore: cumq;
 emendatissimū, quantū ipsi efficere potuimus, ex-
 cudendū dedimus Sebastiano Gryphio Typogra-
 pho nobilissimo, ut tam culto, & tam nitido scri-
 ptore vti cōmode possint omnes, quibus bonae ar-
 tes cura sunt: & ut Medicis, quorum aetas nostra
 maximè ferax est, animum faciamus ad Cornelium
 legendum, interpretandum, illustrandū: ita enim
 futurū facile speramus, ut omnes paulatim planè
 Latine de medicina loquentes audiamus: & ali-
 quis apud nostros eam laudē consequi curet, quā
 apud Græcos consequutus est Galenus, cuius nisi
 labor & industria tantum luminis addidisset Hip-
 pocrati, is ferte malo magno publico turpius ex-
 tinētus fuisset, quàm iacet Cornelius: cuius laudi
 digna immortalitate si vitio ingenij Medici ho-
 rū temporum, & posteriores inuidebunt, sunt ta-
 men nitor & elegātia, vel illis contra nitentibus,
 cum à tenebris & ab interitu vindicabunt.

A V R E L I I
C O R N E L I I
C E L S I
D E
M E D I C I N A
L I B E R P R I -
M V S.

*



N T ALIMENTA sanis corpo-
ribus Agricultura, sic sanitatem
agris Medicina promittit. Hai-
nusquam quidem non est. Siqui-
dem etiam imperitissima gentes
herbas, aliaq; prompta in auxilium vulnerum, mor-
borumq; noverunt. Veruntamen apud Græcos ali-
quanto magis, quam in cæteris nationibus excolta
est: ac ne apud hos quidem a prima origine, sed pau-
cis ante nos seculis, utpote cum vetustissimus auctor
Æsculapius celebretur. Qui quoniam adhuc ror-
dem & vulgarem hanc scientiam paulo subtilior
excoluit, in deorum numerum receptus est. Huins de-
inde duo filij Podalirius & Machaon bello Tro-
iano duce Argemnonem secuti, non mediocrem
operam cõsulionibus suis attulerunt. Quos tamen
Homerus nõ in pestilentia, neq; in varijs generibus
morborum aliquid attulisse auxilij, sed vulneri-
bus tantummodo ferro, & medicamentis mederi
solitos

solitos esse proposuit. Ex quo apparet, has partes
 medicina solas ab his esse tentatas, easq; esse vetu-
 stissimas. Eodemq; autore disci potest, morbos, tum
 ad iram deorum immortalium relatos esse, & ab
 iisdem opem posci solitam. Veriq; simile est, inter
 nonnulla auxilia aduersa valetudinis, plerunq;
 tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos
 neq; desidia, neq; luxuria* vitiant. Siquidem * tētarāt
 hac duo, corpora prius in Gracia, deinde apud
 nos affligerunt. Ideoq; multiplex ista medicina,
 neq; olim apud Gracos, neque apud alias gentes
 necessaria, vix aliquos ex bonis ad senectutis prin-
 cipia perducit. Ergo etiam post eos (de quibus re-
 tuli) nonnulli clari viri medicinam exercuerunt,
 donec maiore studio literarum disciplina agitari
 cepit: quæ ut animo præcipuè omnium necessaria, Disciplinæ
 sic corpori inimica est. Primoq; medendi scientia, corpori i-
 sapientie pars habebatur, ut & morborum cura-
 tio, & rerum natura contemplatio sub iisdem au-
 toribus nata sit. Scilicet his hanc maxime requi-
 rentibus, qui corporum suorum robora* inquieta * quieta
 cogitatione, nocturnaq; vigilia minuerunt. Ideoq;
 multos ex sapientia professoribus, peritos eius
 fuisse accepimus. Clarissimos vero ex his Pytha-
 goram, & Empedoclem, & Democritum. Hu-
 ius autem (ut quidam crediderunt) discipulus
 Hippocrates Cons, primus quidem ex omnibus Hippocra-
 memoria dignus ab studio sapientie disciplinam tes.
 hanc separauit, vir & arte & facundia insi-
 gnis.

gnis. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras, & Chrysippus, tū Herophilus & Erasistratus, sic artem hanc exercuerunt, ut etiam in diuersas curandi vias processerint. Iisdemq; temporibus, in tres partes medicina diducta est, ut una esset qua victu, altera qua medicamentis, tertia qua manu mederetur. Primam διατροφικὴν, secundā φαρμακικὴν, tertiam χειρουργικὴν, Græci nominauerunt. Eius autem, qua victu morbos curat longè clarissimi autores etiam altius quadam agitare conati, rerum quoq; natura sibi cognitionem vendicauerunt, tanquam sine ea trunca & debilis medicina esset post quos Serapion primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam professus, in usu & experimentis eam posuit. Quē Apollonius & Glaucias, & aliquanto post Heraclides Tarentinus, & aliqui non mediocres viri secuti, ex ipsa professione, se Empiricos appellauerunt. Sic in duas partes ea quoq; qua victu caret, medicina diuisa est, alijs rationalem artem, alijs usum tantum sibi vendicantibus, nullo verò quicquam post eos, qui supra comprehensi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi rationem ex magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse quoq; quadam in senectute deflexit. Et per hos quidē maximè viros salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus medicina partibus, ut difficilima, sic etiam clarissi-

ma est ea, qua morbis medetur, ante omnia de hac
dicendum est. Et quia prima in ea dissensio est,
quòd alij sibi experimentorum tantummodo no-
titiam necessariam esse contendunt, alij nisi cor-
porum rerumq; ratione comperta, non satis poten-
tem usum esse proponunt: indicandum est, qua
maxime ex utraq; parte dicantur, quò facilius no-
stra quoq; opinio interponi possit. Igitur hi, qui
rationalem medicinam proficiuntur, hac neces-
saria esse proponunt, Abditarum, & morbos conti-
nentium caussarum notitiam, deinde Eviden-
tium, post hac etiam Naturalium actionum, no-
tissimè partium interiorum. Abditas caussas vo-
cant, in quibus requiritur, ex quibus principijs
nostra corpora sint, quid secundam, quid aduer-
sam valetudinem faciat. Neq; enim credunt pos-
se eum scire, quomodo morbos curare conveniat,
qui vnde hi sint, ignoret. Neq; esse dubium, quin
alia curatione opus sit, si ex quatuor principijs,
vel superans aliquid, vel deficiens aduersam vale-
tudinem creat, ut quidam ex sapientia professo-
ribus dixerunt, alia, si in humidis omne vitium
est, ut Herophilo visum est: alia, si in spiritu, ut
Hippocrati: alia, si sanguis in eas venas, quæ spi-
ritui accommodata sunt, transfunditur, & in-
flammationem, quam Græci φλεγμονή, nomi-
nant, excitat, eaq; inflammatio, talem motum ef-
ficat, qualis in febre est, ut Erasistrato placuit:
alia, si manantia corpuscula, per invisibilia fora-

mina subsistendo, iter claudunt, ut Asclepiades contendit. Eum vero recte curaturum, quem prima origo causse non fecerit. Neq; vero inficiuntur, experimenta quoq; esse necessaria. Sed ne ad hac quidem aditum fieri potuisse, nisi ab aliqua ratione contēdunt. Non enim quidlibet antiquiores viros agris inculcasse: sed cogitasse, quid maxime cōveniret, & id usu explorasse, quod antē cōtectura aliqua duxissent. Neq; interesse, * an nūc
 * an ini- ita plerq; explorata sint, si a consilio tamen cōperunt. Et id quidem in multis ita se habere. Sape
 tia plera- iam plerq; explorata sint, si a consilio tamen cōque
 que perunt. Et id quidem in multis ita se habere. Sape
 vero etiam nova incidere genera morborū, in quibus nihil adhuc usus ostēderit. Et ideo necessarium sit animadvertere, unde ea cōperint: sine quo nemo moraliū reperire possit, cur hoc, quā illo potius utatur. Et ob hac quidem in obscuris positas causas persequuntur. Evidentes verò has appellant, in quibus quarant initium morbi calor attulerit, an frigus: fames, an satietas: & quæ similia sunt. Occursurum enim vitio dicunt eam, quæ originem non ignorarit. Naturales verò corporis ætiones appellant, per quas spiritum trahimus, & emittimus cibū, potionemq;: & assumimus, & concoquimus. Itemq; per quas eadem hæc in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiā, quare vene nostræ modo submitant se, modo attollant: quæ ratio somni, quæ vigilia sit. Si quorum notitia neminem putant vel occurrere, vel mederi morbis inter hac nascentibus posse.

Ex quibus quammaxime pertinere ad rem conco-
ctio videtur. Huic potissimum insistent, & duce alij
Erasistrato, alteri cibum in ventre contendunt: alij
Plistonico, Proxagora discipulo, putrescere: alij cre-
dunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Ac-
ceduntq; Asclepiadis amuli, qui omnia ista vana
& supernacua esse proponunt. Nihil enim conco-
qui, sed crudam materiam (sicut assumpta est) in cor-
pus omne diduci. Et hac quidem inter eos parum
constant. Illud vero convenit, aliud dandum cibum
laborantibus, si hoc: aliud, si illud verum est. Non
si teritur intus, cum querendum esse, qui facillime
teri possit. Si putrescit, cum in quo hoc expeditis-
simum est. Si calor concoquit, cum qui maxime
calorem moueat. At nihil ex his esse querendum, si
nihil concoquitur. Ea vero sumenda quae maxime
manent, qualia assumpta sunt. Eademq; ratione
cum spiritus grauis est, cum somnus, aut vigilia vr-
gent, cum mederi posse arbitrantur, qui prius illa
ipsa qualiter eueniant praeceperit. Praeter hoc cum
in interioribus partibus & dolores, & morborum
varia genera nascantur, neminem putant his ad-
hibere posse remedia, quae ipse ignoret. Necessarium
ergo esse incidere corpora mortuorum, eorumq;
viscera atque intestina scrutari: longeq; optime
fecisse Herophilum, & Erasistratum, qui nocen-
tes homines à regibus ex carcere acceptos, vi-
uos incidierat, considerariq; etiam spiritu re-
manente, ea quae natura ante clausisset, eorumq;
positur.

sed ab experimentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter aviditatem primis diebus, protinus cibum assumpsisse, alios propter fastidium abstinuisse, levatumq; magis eorum morbum esse, qui abstinerant: itemq; alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eā, alios post remissionem eius, optime deinde his cessisse, qui post finem febris id fecerint. Eademq; ratione, alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore, alios exiguo, gravioresq; eos factos, qui se implerent. Hæc similiaq;, cum quotidie incideret, diligentes homines notasse, quæ plerunque melius responderent: deinde ægotantibus ea præcipere cœpisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciosa discernentem à salutaribus. Repertis deinde iam medicina remedijs, homines de rationibus eorum differere cœpisse, nec post rationem medicinam esse inuentam, sed post inuentam medicinam, rationem esse quasitam. Requiritur etiam, si ratio idem doceat, quod experientia, an aliud. Si idem, superfluum esse: Si aliud, esse contrariam. Primò tamen remedia exploranda summa cura fuisse, nunc verò iam explorata esse, neque ulli aut nova genera morborum reperiri, aut novam desiderari medicinam. Quòd si iam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed eum protinus visurum, cui morbo id proximum sit, tentaturumq;

renucl

Remedia similia illis, quæ vicino malo saepe succurrerint, & per eius similitudinem opem reperi-
turum. Neq; enim se dicere consilio medicum non
egere, & irrationale animal hanc artē posse præ-
stare: sed has latentium rerum coniecturas ad rem
non pertinere: quia non intersit, quid morbum
faciat, sed quid tollat. Neq; ad rem pertineat, quo-
modo, sed quid optimè digeratur. Sive de hac
caussa concoctio* intercidat, sive de illa: & sive,* incidat
concoctio sit illi, sive tantam digestio. Neq; qua-
rendum esse quomodo spiremus: sed quid grauem,
tardumq; spiritum expediat. Neque quid venas
moueant, sed quid quaq; motus genera significent.
Hæc autem cognosci experimentis, & in omnibus
eiusmodi cogitationibus in utranque partem dis-
seri posse. Itaque ingenium & facundiam vince-
re, morbos autem non eloquentia, sed remedijs
curari. Quæ si quis elinguis, usu* discreta bene,* discre-
porit, hunc aliquanto maiorem medicum futurū, tus
quàm si sine usu linguam suam excoluerit. Atq;
ea quidem, de quibus est dictum, superuacua esse
tantummodo. Id verò quod restat, etiam crude-
le, vimorum hominum alium atq; præcordia in-
cidi, & salutis humane præsidem artem, non so-
lum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam
inferre, cum præsertim ex his, quæ tanta violentia
querantur, alia non possint omnino cognosci, alia
possint etiam sine scelere. Nec colorem, laurem,
mollitiem, duritiem, similiaq; omnia non esse

talia inciso corpore, qualia integro fuerint: quia
 cum corporibus inuiolatis, hæc tamē metū, dolore,
 inedia, cruditate, lassitudine, nulle alijs mediocri-
 bus affectibus, sæpe mutetur: multo magis verisi-
 mile est, interiora, quibus maior mollities, lux ipsa
 noua sit, sub grauissimis vulneribus, & ipsa truci
 datione mutari. Neq; quicquā esse stultius, quā
 quale quicquam viuo homine est, tale existimari
 esse moriēte, imò iam mortuo. Nam utrum qui-
 dem, qui minus ad rem pertineat, spirante homi-
 ne posse diduci? Simul atq; verò ferrum ad præ-
 cordia accessit, & discissum transuersum septum
 est, quod membrana quadam superiores partes ab
 inferioribus diducit (διαφραγμα Græci vocant)
 hominem protinus animam amittere. Ita demum
 mortui præcordia, & viscus omne in conspectum
 latrocinātis medici dari: quod necesse sit tale esse,
 quale mortui sit, non quale vini fuit. Itaq; conse-
 qui medicum, ut hominem crudeliter ingulet: nō
 ut sciat qualia vini viscera habeamus. Si quid
 tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui
 subiciatur, id sæpe casum offerre curantibus. In-
 terdum enim gladiatorem in harena, vel militem
 in acie, vel viatorem à latronibus exceptum, sic
 vulnerari, ut eius interior aliqua pars aperiatur,
 & in alio alia sita, ita sedem, positum, ordinem,
 figuram, similiaq; cognoscere prudentem medi-
 cum, non eadem, sed sanitatē mollientem, idq; per
 misericordiam discere, quod alij dira crudelitate

cognouerint. Ob hac ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse. Quæ etsi non crudelis, tamen sæda sit, cum aliter pleraque in mortuis se habeant. Quantum verò in vivis cognosci potest, ipsa curatio ostēdat. Cum hæc per multa volumina, perq; magna contentionis disputationes à medicis sæpe tractata sint, atq; tractētur: subiiciendū est quæ proxima vero videri possint. Ea neq; addicta alterutri opinioni sunt, neq; ab utraque nimium abhorrentia, media quodammodo inter diversas sententias. Quod in plurimis cōtentionibus deprehēdere licet, sine ambitione verum scrutantibus, ut in hac ipsa re. Nam quæ demum causse vel secundam valetudinem præstent, vel morbos excitēt: quomodo spiritus, aut cibus, vel detrahatur, vel digeratur, ne sapiētia quidem professores scientia comprehendunt, sed coniectura persequuntur. Cuius autem rei nō est certa notitia, eius opinio certum reperire remediū non potest. Verumq; est, ad ipsam curandi rationem nihil plus cōferre, quàm experiētiā. Quanquā igitur multa sint ad ipsas artes propriè non pertinentia, tamen eas adiuuat excitando artificis ingenium. Itaq; ista quoq; natura rerum contemplatio,* quamvis non faciat medicum aptiorem, tamen medicina reddit profectum. Veriq; simile est, & Hippocratem, & Erasistratum, & quicumq; alij non contenti febres & ulcera agitare, rerū quoq; naturam ex aliqua parte scrutati sunt, nō ideo quidē medicos fuisse,

* Aliās: quāvis non faciat medicū: aptiorem tamen medicinæ reddit, atq; perfectum.

Cato ex naturalibus
prolapsa.

verum ideo quoq; maiores medicos extitisse. Ratione verò opus est ipsi medicina, etsi nō inter obscuras causas, neq; inter naturales actiones, tamē saepe. * Est enim hac ars coniecturalis: neq; respondet ei plerunq; non solum coniectura, sed etiam experientia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Rerius, sed aliquando tamen morbus quoq; ipse novus est, quem non incidere, manifestè falsum est: cum etate nostra quadam ex naturalibus partibus carne prolapsa, & arente, intra paucas horas expiraverit: sic ut nobilissimi medici, neq; genus mali, neq; remediū inveniunt. Quos ego nihil ideo tentasse iudico, quia nemo in splendida persona periculi coniectura sua voluerit: ne occidisse, nisi servasse videretur. Veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitare, detracta tali verecundia, & fortasse respondurū fuisse id, quod aliquis esset expertus. Ad quod medicina genus neq; semper similitudo aliquid confert: etsi quando confert, tamen id ipsum rationabile est inter multa similia genera, & morborum, & remedium cogitare, quo potissimum medicamentū sit utendū. Cū igitur talis res incidit, medicus aliquid oportet inveniāt, quod non utiq; fortassē, sed saepius tamen etiam respondeat. Petat autem novū quoq; consiliū, non à rebus latentibus (is. a enim dubie, & incertae sunt) sed ab his, quae explorari possūt, id est evidētibus causis. Interest enim fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an calor.

lor, an vigilia, an fames fecerit, ac cibi, viniq;
 abundantia, an intemperantia libidinis. Neq; igno-
 rare hunc oportet, quæ sit ægri natura, humidum
 magis, an magis siccū corpus eius sit: validi nervi,
 an infirmi, frequens aduersa valetudo, an rara:
 eaq; cum est, vehemens esse soleat, an levis: brevis,
 an longa. Quod is vitæ genus sit securus, laborio-
 sum, an quietum: cū luxu, an cum frugalitate. Ex
 his enim, similibusq; saepe curandi nona ratio du-
 cenda est. Quamuis ne hæc quidē sic præteriri de-
 bent, quasi nullam cōtrouersia recipiant. Nam &
 Erasistratus non ex his fieri morbos dixit, quum
 & alij, & idem alias post ista non sebricitarēt: &
 quidem medici seculi nostri sub autore (ut ipsi
 videri volunt) Themisone contendunt, nullius
 causæ notitiā quicquam ad curationes pertinere,
 satisq; esse quadam cōmunia morborum intueri.
 Siquidem horum tria genera esse, vnum adstri-
 ctum, alterū fluens, tertium mixtum. Nam modo
 parū excernere ægros, modo nimium: modo alia par-
 te parum; alia nimium. Hæc autem genera morborū,
 modo acuta esse, modo longa: & modo incrementum
 modo cōsistere, modo minui consueverunt. Cogni-
 to igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictū est,
 digerendum esse: si profluvio laborat, cōtinendum:
 si mixtum vitium habet, occurrendum subinde ve-
 hementiori malo: & aliter acutis medendum, ali-
 ter vetustis, aliter incrementibus, aliter subsisten-
 tibus, aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Ho-

rum observationē medicinā esse, quam ita finiūt,
 ut quasi viam quandā, quem *μῆθοδος* Graci no-
 minant, eorumq; quae in morbis communia sunt,
 contemplatricem esse contendunt. ac neq; rationa-
 libus se, neq; experimenta tantum spectantibus an-
 numerari volunt, cum ab illis eo nomine dissen-
 * nolunt tiant, quod in cōiectura rerū latentium* volūt esse
 medicinā: ab his, eò quod parū artis esse in obser-
 vatione experimentorum credūt. Quod ad Erasistratū pertinet, primū ipsa evidentia eius opi-
 nioni repugnat, quia rarò, nisi post horū aliquid
 morbus venit. Deinde non sequitur, ut quod aliū
 non afficit, aut eundem aliās, id ne alteri quidem,
 aut eidem tēpore alio noceat. Possunt enim quaedā
 fuisse corpori, vel ex infirmitate eius, vel ex ali-
 quo affectu, quae vel in alio non sunt, vel in hoc
 aliās non fuerunt, eaq; per se non tanta vi concit-
 ant morbū, tamen obnoxium magis alijs iniurijs
 corpus efficiunt. Quod si contemplationē rerū na-
 tura (quam temere medici sibi vendicant) satius
 cōprehendisset, etiā illud scisset, nihil omnino ob
 unam causam fieri: sed id pro causa apprehendi,
 quod contulisse plurimū videtur. Potest autem id
 dum solū est, non mouere, quod iunctum alijs mar-
 xime mouet. Accedit ad haec, quod ne ipse quidem
 Erasistratus, qui trāsuso in arterias sanguine fe-
 brem fieri dicit, idq; nimis repleto corpore incidere
 reperit, cur ex duobus equè repletis, alter in morbū
 inciderit, alter omni periculo vacarit (quod qua-
 tidie

tidie fieri apparet) non discreuerit. Ex quo disci
 potest, ut vera sit illa trāsfusio, tamen illā non per
 se (cum plenū corpus est) fieri: sed cum horum ali-
 quid accesserit. Themisonis verò emuli, si perpetua
 qua promittūt habēt, magis etiā quā ulli ratio-
 nales sunt. Neq; enim si quis nō omnia tenet, qua
 rationalis alius probat, protinus alio nouo nomine
 artis indiget: si modò, quod primū est, non memo-
 ria soli, sed rationi quoq; insistit. Si verò, quod
 propius est, vix vlla perpetua praecepta medicina-
 lis ars recipit: ydē sunt quod ij, quos experimēta
 sola sustinēt. Eo magis, quoniā si cōpresserit aliquē
 morbum, an fuderit, quilibet etiā imperitissimus
 videt. Quid autē cōpressum corpus resoluat, quid
 solutum teneat, si à ratione tractum est, rationalis
 est medicus. Si (ut ei, qui se rationalem negat, cō-
 fiteri necesse est) ab experientia Empiricus est. Ita
 apud eum morbi cognitio extra artem, medicina
 intra usum est. Neq; adiectū quicquā Empirico-
 rum profissioni, sed demptum est: quoniā illi mul-
 ta circumspiciunt, hi tantum facilima, & nō plus
 quā vulgaria. Nā et hi qui pecoribus ac iuuentis
 medētur, cum propria cuiusq; ex multis animali-
 bus nosse non possint, cōmunibus tātummodo in-
 sistunt. Et extera gētes, cum subtilē medicinae ra-
 tionē non nouerint, communia tātum vident. Et
 qui ample valetudinarios nutriunt (quia singulis
 summa cura consulere non sustinent) ad commu-
 nia ista confugiunt. Neq; Hercules istud, & anti-

Hinc me
 dicina, ar
 interpol
 à Plinio
 Etā est.

qui medici nescierunt, sed his cōtenti non fuerūt. Ergo etiā vetustissimus autor Hippocrates dixit, mederi oportere & communia, & propria intuentē. Ac ne isti quidem ipsi intra suam professionem consistere ullo modo possunt. Siquidē & compressorum & fluētium morborū genera diuersa sunt, faciliusq; id in his quae fluūt, inspicī potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibum vomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri, aliud tabe cōsumi. Atq; in partes quoq; humor erūpit, ut in oculos auresq;. Quo periculo nullum humanū membrum vacat. Nihil autem horum sic, ut aliud, curatur. Ita protinus in his à cōmuni fluētis morbi contēplatione, ad propriā medicina descendit. Atq; in hac quoq; rursus alia proprietatis notitia saepe necessaria est: quia non eadē omnibus, etiam in similibus casibus opitulantur. Siquidē certa quaedā res sunt, quae in pluribus ventrē aut adstringūt, aut resolvunt. Inueniuntur tamen, in quibus aliter atq; in ceteris, idē eueniat. In his ergo cōmunium inspectio contraria est, priorum tantū salutaris. Et causa quoq; estimatio saepe morbum soluit. Ergo etiā ingeniosissimus seculi nostri medicus, quē nuper vidimus, Cassius, febricitanti cuiadā, & magna siti affecto, cum post ebrietatē eum premi cēpisse cognosceret, aquā frigidam ingessit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno & sudore discussit. Quod auxilium medi-

tus opportune prouidit, non ex eo, quòd aut stric-
tum corpus erat, aut fluebat: sed ex causa, qua
antè præcesserat. Estq; etiã proprium aliquid &
loci & tēporis, istis quoq; autoribus, qui cūm di-
spiciāt, quemadmodū sanis hominibus agendum,
sit, præcipiūt, ut granibus aut locis aut tēporibus,
magis vitetur frigus, æstus, satietas, labor, libido,
magisq; ut conquiescat iisdē aut locis, aut tempo-
ribus. si quis grauitatē corporis sentit, ac neq; vo-
mitu stomachū, neq; purgatione aluum sollicitet.
Quæ vera quidē sunt, à communibus tamen ad
quadam propria descendunt: nisi persuadere nobis
volunt, sanis quidē considerandum esse, quid ex-
lis, quid tēpus anni sit, ægris verò non est. Quibus
tanto magis omnis observatio necessaria est, quāto
magis obnoxia offensis infirmitas est. Quinetiam
morborū in iisdē hominibus alia atq; alia proprie-
tates sunt: & qui secundis aliquādo frustra cura-
tus est, cōtrarijs sape restituitur. Plurimāq; in dā-
do cibo discrimina reperiuntur, ex quibus contē-
tus uno ero. Nā famē facilius firi adolescēs, quā
puer: facilius* in denso cælo, quā in tenui: faci-
lius in hyeme, quā æstate: facilius uno cibo, quā
prandio quoque assuetus: facilius in exercitatus,
quā exercitatus homo sustinet. Sape autē in eo
magis necessaria cibi festinatio est, qui minus in-
diā tolerat. Ob quā cōpetit eum, qui propria non
nouit, communia tantū intueri debere: eumq; qui
nosse propria potest, illa quidē non oportere negli-
gere,

* Quil
dā vide
hic leg
potius
tenui
lo, quā
dēso: &
state q
hyeme
propte
quod

ocrat. di-
at libro 1.
phor. Vē
es hyeme
vere sūt
lidissimi
uare per
tempo-
alimēta
piofiora
nt exhi-
nda. Et
ulus Ae
meta lib.
dē 1. c. 53.
eme qui
& for-
ri exer-
atiōe, &
niore ei
utendū
Nisi cō-
eras,
od in dē
celo, &
hyemē,
pora
t robu-
ra, atq;
tiā faci-
quali-
mole-
ferunt.
uncto
videtur
sferre
li. 29.

gere, sed his quoq; insistere. Ideoq; cū par scien-
tia sit, vtiliorē tamē medicū esse amicum, quam
extraneum. Igitur ut ad propositū meum redeam,
rationalem quidē puto medicinā esse debere, in-
strui verò ab euidentibus causis, obscuris omnibus
non à cogitatione artificis, sed ab ipsa arte reit-
etis. Incidere autē vinorum corpora, & crudele,
& supernacuum est: mortuorum corpora discen-
tibus necessariū. Nam positū, & ordinē nosse de-
bent: qua cadauera melius, quā viuis, & vul-
neratus homo representāt. Sed & cetera, qua mo-
dò in viuis cognosci possunt, in ipsis curationibus
vulneratorum paulo tardius, sed aliquāto mitius,
usus ipse monstrauit. His propositis, primum dicā,
quemadmodū sanos agere cōueniat: tū ad ea trās-
ibo, quę ad morbos, curationesq; eorū pertinebūt.

Quemadmodum sanos agere conueniat.

C A P. I.



SA N V S homo, qui & bene valet,
& sua spontis est, nullis obligare se
legibus debet: ac neq; medico, neque
iatriapta egere. Hunc oportet va-
rium habere vita genus: modò ruri esse, modò in
urbe: sapinsq; in agro, nauigare, venari, quiescere
interdū, sed frequētius se exercere. Si quidē igna-
uia corpus hebetat, labor firmat: illa maturā sene-
tutē, hic longā adolescentiā reddit. Prodest etiam
interdū balneo, interdum aquis frigidis uti: modò
ungi, modo id ipsum negligere: nullum cibi genus
fugere,

fugere, quo populus utatur: interdum in conuiuio
 esse, interdum ab eo se retrahere: modo plus iusto,
 modo non amplius assumere: bis die potius, quàm
 semel cibum capere: & semper quàm plurimum,
 dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis
 exercitationes, cibiq; necessarij sunt, sic athletici su-
 peruacui. Nam & intermissus propter ciuiles ali-
 quas necessitates ordo exercitationis corpus affli-
 git: & ea corpora, quæ more eorū repleta sunt, ce-
 lerrime & senescunt, & egrotāt. Concubitus verò
 neq; nimis concupiscendus, neq; nimis pertimescē-
 dus est. Rarus, corpus excitat, frequēs soluit. Cum
 autē frequēs, non numero sit, sed natura, ratione
 atatis & corporis scire licet, eum non inutile esse,
 quæ corporis neq; languor, neq; dolor sequitur. Idē
 interdū peior est, noctū tutior: ita tamen, si neq;
 illū cibus, neq; hunc cū vigilia labor statim sequi-
 tur. Hæc firmis seruanda sunt, cauendūq; ne in se-
 cunda valetudine, aduersa præsidia consumātor.

Quæ stomacho imbecillis seruanda sint.

C A P.

I I.

ET imbecillis stomacho (quo in numero ma-
 gna pars urbanorū, omnesq; penè cupidi li-
 terarum sunt) observatio maior necessaria est: ut
 quod vel corporis, vel loci, vel studij ratio detra-
 hit, cura restituat. Ex his igitur qui bene conco-
 xit, manē tutò surget: qui parum, quiescere debet:
 & si manē surgendi necessitas fuerit, redormire.
 Qui non concoxit, ex toto conquiescere, ac neq; la-
 bori

Paulus A
 gineta li.
 ca 37. Fre
 quēs concu
 bitus, cor
 pus rariu
 frigidu.
 imbecill
 reddit.

bori se, neq; exercitationi, neq; negotio credere.
 Qui crudus sine praecordiorum dolore ructat, in ex
 intervallo aquam frigidam bibere, & se nihilomi-
 nus continere. Habitare vero adificiis lucido, per
 flatum aestivum hybernum solem habente, cauere
 meridianum solem, matutinum & vespertinum
 frigus, itemq; auras fluminum, atq; stagnorum, mi-
 nimeq; nubilo caelo, soli aperienti se committere,
 ne modo frigus, modo calor moveat. Quae res ma-
 xime grauedines, distillationesq; concitat. Magis
 vero grauib; locis ista, seruanda sunt, in quibus
 etiam pestilentiam faciunt. Scire autem licet, in-
 tegrum corpus esse, cum quotidie mane vrina alba,
 dein ruffa est. Illud concoquere, hoc concoxisse si-
 gnificat. Vbi experrectus est aliquis, paulum inter-
 mittere, deinde (nisi hyems est) fouere os multa
 aqua frigida debet, longis diebus meridiari potius
 ante cibum, sin minus, post eum: per hyemem potis-
 simum totis noctibus conquiescere. Sin lucubran-
 dum est, non post cibum id facere, sed post conco-
 ctionem. Quem interdum vel domestica, vel ciui-
 lia officia tenuerunt, huic tempus aliquod seruand-
 um curationi corporis sui est. Prima autem eius
 curatio exercitatio est, quae semper antecedere ci-
 bum debet: in eo, qui minus laborauit, & bene
 concoxit, amplior: in eo, qui fatigatus est, & minus
 concoxit, remissior. Comode vero exercent, clari-
 lectio, arma, pilae, cursus, ambulatio: atq; haec non
 utiq; plana comodior est. Siquidem melius ascensus
 quoq;

quoq; & descensus cum quidam varietate corpus
moneat, nisi tamen id perquam imbecillum est.
Atelior autem est sub diuo, quàm in porticu: me-
lior (si caput patitur) in sole, quàm in umbra:
melior in umbra, quàm parietes, aut viridaria
efficiunt, quàm qua tecto subest: melior recta,
quàm flexuosa. Exercitationis autem plerumq; finis
esse debet sudor, aut cerè lassitudo, quæ citra fa-
tigationē sit, idq; ipsum, modo minus, modo ma-
gis faciendum est. Ac ne his quidem Athletarum
exemplo, vel certa esse lex, vel inmodicus esse la-
bor debet. Exercitationem recte sequitur, modo
vntio, vel in sole, vel ad ignem, modo balneum,
sed in cœlani, quàm maxime & alio, & lucido,
& spatiofo. Ex his verò neutrum sæpe fieri oport-
et, sed sapius alterutrum pro corporis natura. Post
hæc paulum conquiescere opus est. Vbi ad cibum
ventum est, nunquam utilis est nimia satietas.
Sæpe etiā inutilis nimia abstinentia. Sæpe si qua
intemperantia subest, * durior est in potione, quàm
in esca. Cibus a sacramentis, oleribus, similibusq;
rebus melius incipit. Tum caro assumenda est, quæ
assa optima, aut eluxa est. Conditæ omniæ diutius
de causis inutilia sunt, quoniam & plus propter
dulcedinem assumitur, & quod modo par est, ta-
men ægrius cœcoquitur. Secunda mensa bono sto-
macho nihil nocet, in imbecillo coacescit. Si quis
itaq; hoc parum valet, palmulas pomæq; & simi-
lia melius primo cibo assumit. Post multas potio-

Lassitudo
est graui-
tas corpo-
ris. Vergil.
Lassione pa-
pauera col-
lo. quæ etiā
citra labo-
rē accidit.
Fatio-
nē verōnti-
mueratē la-
boris itelli-
gimus. Idē
Veloceſ i-
culo cer-
uor. cursū
q; fouent.
quod mor-
timodiciū
labore ap-
pellant. ve-
rum de po-
neribus la-
situdinis il-
gulus est
lib. 3 Gale-
ni de Santi-
tate tpea-
da.

* tutior
Cibus.

nes,

nes, quæ aliquantum sitim exceſſerunt, nihil edendum eſt, poſt ſatietatē, nihil agendum. Vbi expletus eſt aliquis, facilius concoquit, ſi quicquid aſſumpſit porione aque frigide includit, tū pauliſſet inuigilat, deinde bene dormit. Si quis interdium ſimpleuit, poſt cibum neq; frigori, neq; aſtui, neq; labori ſe debet cōmittere. Neq; enim tā facile hec inani corpore quā repleto nocent. Si quibus de cauſſis futura inedia eſt, labor omnis vitandus eſt.

Obſervationes quædam prout res nouæ accidunt, & prout corporum genera, & ſexus, & ætates, & tempora anni ſunt.

C A P. I I I.

ATq; hæc quidem penè perpetua ſunt. Quædam autem obſervationes deſiderant & nouæ res, & corporum genera, & ſexus, & ætates, & tempora anni. Nam neque ex ſalubri loco in grauem, neque ex graui in ſalubrem tranſitus ſatis tutus eſt. Ex ſalubri in grauem prima hyeme : ex graui in eum, qui ſalubris eſt, prima æſtate tranſire melius eſt. Neq; verò ex multa fame, nimia ſatietas : neq; ex nimia ſatietate, fames idonea eſt. Periclitaturq; & qui ſemel, & qui bis die cibum incōtinenter, contra conſuetudinem aſſumit. Item neq; ex nimio labore ſubitū ocium, neq; ex nimio ocio ſup̄itus labor ſine graui noxa eſt. Ergo cum quis mutare aliquid uolet, paulatim debet aſſueſcere. Omnem etiā laborem

Facilius,

facilius, vel puer, vel senex, quàm insuetus homo *Puer,*
Senex,
Homo.
sustinet. Atq; ideo quoq; nimis otiosa vita utilis
non est, quia potest incidere laboris necessitas. Si
quando tamē insuetus aliquis laboravit, aut mul-
to plus quàm solet, etiā is qui assuevit, huic ieiun-
no dormiendū est, multo magis, si etiā os amarum
est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tūc
enim nō dormiendum tantummodo ieiuno est, sed
etiam in posterū diem permanendum, nisi cito id
quies sustulit. Quod si factum est, surgere oportet,
& lente paululum ambulare. At si somni neces-
sitas non fuit, quia modice magis aliquis labora-
vit, tamen ingredi aliquid eodē modo debet. Com-
munia deinde omnibus sunt post fatigationem: ci-
bum sumpturus, ubi paulum ambulauerit, si bal-
neum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem
ungi, atq; sudare: si est, ante omnia in tepidario
residere, deinde ubi paulū conquieverunt, intra-
re, & descendere in solium, tum multo oleo ungi,
leniterq; perfricari, iterū in solium descendere. Post
hac os aqua calida fovere, deinde frigida. Balneū
his feruens idoneum nō est. Ergo si nimium alicui
fatigatio penē febris est, huic abunde est loco tepido
dimittere se in quinibus tenuis in aquam calidam,
cui paulum olei adiectum sit: deinde totum quidē
corpus, maxime tamen eas partes, quæ in aqua
fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinum, &
paulum contriti salis sit adiectum. Post hac, omni-
bus fatigatis, aptum est cibum sumere, eoque humi-
do

do uti: aqua, vel certè diluta portione esse contentos, maximeq; ea quæ moueat urinā. Illud quoq; nosse oportet, quod ex labore sudanti, frigida portio perniciosissima est, atque etiam (cum sudor se remiserit) itinere fatigatis inutilis. A balneo quoq; venientibus Asclepiades inutilem eam iudicauit. Quod in his verum est, quibus aluus facile, nec tutò resolvitur, quiq; facile inhorrescunt. Perpetuum in omnibus non est, cum potius naturale sit portione astantem stomachū refrigerari, frigentem calefieri. Quod ita precipio, ut tamē fatear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse. Solet etiam prodesse, post varium cibū, frequentesq; dilutas portiones, vomitus, & postmodum longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio urget, in vicem modò aqua, modò vinū bibendum est, raroq; balneo utendū. Leuatq; lassitudinem etiam laboris mutatio, eumq; quem nouum genus eiusdem laboris prestat (id quod in consuetudine est) reficit. Fatigato quotidianū curabile tutissimum est, insolitum contra lassat. Quod enim contra consuetudinē est, nocet, seu molle, seu durum est. Propria quadam ad eum pertinet, qui ambulando fatigatur. hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio, post iter, primum sediles deinde vntio, tum calida aqua in balneo magis superiores partes, quam inferiores foueat. Si quis vero exustus, in sole est, huic in balneum protinus eundū est, perfundendumq; oleo corpus & caput, deinde

deinde in solium bene calidum descēdendum est, tum multa aqua per caput infundenda, prius calida, deinde frigida. At ei qui perfrixit, opus est balneo primū inuolato sedere donec insudet, tum ungi, deinde lauari, cibum modicum, deinde portiones meracas assumere. Is verò qui nauigabit, & nausea pressus est, si multam bilem euomit, vel abstinere cibo debet, vel paulū aliquid assumere. Si pituitā acidam effudit, utiq; sumere cibum, sed assueta leuiorem: si sine vomitu nausea fuit, vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui verò toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis sedit, huic nihil currendū, sed lente ambulandum est. Lenta quoq; in balneo mora, dein cæna exigua prodesse consueverunt. Si quis in balneo astat, reficit hunc ore exceptū, & in eo retentum acetū. Si id non est, eodem modo frigida aqua assumpta. Ante omnia autem norit quisq; naturam sui corporis: quoniam alij graciles, alij obesi sunt, alij calidi, alij frigidiores, alij humidi, alij siccī, alios astringit, alios resoluta aluus exercet. Raro quisquam, non aliquam partē corporis imbecillam habet. Tenuis verò homo implere se debet, plenus extenuare: calidus refrigerare, frigidus calefacere: madens siccare, succus madefacere: itemq; aluiū firmare is, cui fusa, soluere is, cui astricta est. Succurrēdumq; semper parti maximè laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequentior quies, ventio, & si post prandium est balneum, contracta

aluus, modicum frigus hyeme, somnus & plenus
 & non nimis longus, molle cubile, animi securitas,
 assumpta per cibos & potiones maximè dulcia
 & pinguis, cibus & frequentior, & quantus plu-
 rissimus potest conuolui. Extenuat corpus aqua
 calida, si quis in eam descēdit, magisq; si salsa est,
 in ieiunio balneum, inurens sol, & omnis calor,
 cura, vigilia, somnus nimium vel brevis, vel lon-
 gus, lectus per astatē terra, hyeme durum cubile,
 cursus, multa ambulatio, omnisq; vehemens exer-
 citatio, vomitus, deiectio, acida res & austera, &
 semel die assumpta epula, & vini non perfrigida
 potio ieiunio in consuetudinem adducta. Cum ve-
 rò inter extenuantia posuerim vomitum, & de-
 iectionem, de his quoq; propria quaedam dicenda
 sunt. Eiectū esse ab Asclepiade vomitū in eo volu-
 mine, quod de Tuenda sanitate composuit, videtur
 neq; reprehendo, si offensus eorū est consuetudine,
 qui quotidie eijciendo vorandi facultatē molian-
 tur. Paulo etiam longius processit. Idem purgati-
 nes quoq; eodē volumine expulit. Et sunt haec per-
 niciose, si nimis valentibus medicamentis fiant.
 Sed haec tamen submouenda est: non est perpetua
 quia corporum temporumq; ratio potest ea fieri
 necessaria, dum & modo, & nō nisi cum opus est,
 adhibeantur. Ergo ille quoq; ipse, si quid iam cor-
 ruptum esset, expelli debere confusus est. Ita non
 ex toto res condemnanda est. Sed esse eius etiam
 plures causae possunt, estq; in ea quaedam pars

Vomitum.

subtilior observatio adhibenda. Vomitus utilior est hyeme, quàm æstate. Nam tunc & pituita plus, & capitis gravitas maior subest. Inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum habentibus. Utilis est plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se repleverunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plus est, quàm quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur, non oportet. Si verò corruptum est, nihil commodius est, quàm id, qua via primum expelli potest, eicere. Itaque ubi amari ructus cum dolore & gravitate precordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Item prodest ei, cui pectus æstuat, & frequens saliva, vel nausea est, aut cui sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est. Similiterque ei, qui vel calum vel locum mutat. hisque quibus (si per plures dies non vomuerunt) dolor precordia infestat. Neque ignoro inter hac precipi quietem, qua non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus, nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuria causæ freri non oportere confiteor. Interdum valetudinis causæ rectè fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere, & senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tanquam tepidam antè debet assumere: si difficilius, aqua vel salis, vel mellis paulum adycere. At qui mane vomiturus est, antè bibere mulsum, vel hyssopum, aut esse radiculam debet, deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est.

Promoc-
tia vom-
tam

est, bibere. Cetera quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum (si stomachus infirmus est) paulum cibi, sed huius idonei, gustandū, & aqua frigida cyathi tres bibendi sunt. Si autem vomitus fauces exasperavit, qui vomuit (si mane id fecit) ambulare debet, tum ungi, deinde cœnare. Si post cœnam, postero die lavari, & in balneo sudare, hinc proximus cibus, mediocris utilior est, isq; esse debet cum pane histerno, vino austero, meraco, & carne assa, cibisq; omnibus quæ siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius cōsulet, si biduo cōtinuarit, quàm si post quintum demum diem vomuerit, nisi hæc mora gravitatem pectori faciet. Deiectio autē medicamento quoq; petenda est, ubi venter suppressus parū reddit, ex eoq; inflammationes, caliginēs, capitis dolores, aliaq; superioris partis mala increscunt. Quid enim inter hæc adiuungere possunt quies & inedia, quæ per illam maxime eveniunt? Qui eicere volet, primū cibis, vinitq; utetur his, quæ hoc præstant. Dehinc si parum illa proficiant, aloem sumat. Sed Purgationes quoq; ut interdum necessariae sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus, & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit. Calefacit autem vntctio, aqua salsa, magisq; si calida est, omnia & salsa, amara, carnosā, si post cibum est balneum, vinum austertum: refrigerat in ieiunio & balneū & somnus,

nisi

Deiectio.

Purgatio.
res.

nisi nimis longus est, & omnia acida, equa quàm
 frigidissima, oleum si aqua misceatur. Humidum
 autem corpus efficit labor* maior, quàm ex con- * aliàs
 suetudine, frequens balneum, cibus plenior, mul- minor,
 ta potio, posthac ambulatio, & vigilia: per se
 quoq; ambulatio multa, & vehemens, & matu-
 tina exercitatio, & non protinus cibus adiectus,
 ea genera esca quæ veniunt ex locis frigidis, &
 pluvij, & irriguis. Contrà siccatur,* modica exer- * aliàs
 citatio, fames, vultio sine aqua, calor, sol* modic- immodi-
 us, frigida aqua, cibus exercitationi statim sub- ca
 iectus, & is ipse ex siccis & æstuosis locis veniens. * aliàs,
 Alium astringit labor, si dila, creta figuralis cor- immodi-
 pori illata, cibus imminutus, & is ipse semel die cius
 assumptus ab eo, qui bis solet: exigua potio, neque
 adhibita, nisi cum cibi quis quàm assumpturus
 est, cepit: post cibum quies. Contrà solvit, aucta
 ambulatio atq; esca, post motus qui post cibum est,
 subinde potiones cibo immixta. Illud quoq; scire
 oportet, quod ventrem vomitus solutum compri-
 mit, compressum solvit. Itemq; comprimit is vom-
 itus, qui statim post cibum est: solvit is, qui tarde
 supervenit. Quod ad ætates vero pertinet, inedia
 facillime sustinent media ætates, minus iuvenes,
 minime pueri, & senectute confecti. Quo minus
 fert facile quisq; eo sæpius debet cibum assumere,
 maximeq; eo eget, qui increfcit. Calida lavatio,
 & pueris & senibus apta est. Vinum dilutum
 pueris, senibus meracius, neutri ætati qua inflatio

nes mouent. Inuenum minus, quæ assumant, & quomodo curentur, interest. Quibus inuenibus fixit alius, plerumq; in senectute contrahitur: quibus in adolescentia fuit adstricta, sæpe in senectute soluitur. Melior est autem in iuvene ferior, in senectute adstrictior. Tempus quoq; anni considerare oportet. Hyeme plus esse conuenit: minus, sed meracius bibere: multo pane uti, carne potius elixa, modici oleribus: semel die cibum capere, nisi si minus venter restrictus est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum sine carne, sine potione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, vel calorem mouenti bus. Venustum non aequè perniciofa est. At vere paulum cibum deinendum, adijciendumq; potioni, sed diluendum tamen bibendum est: magis carne utendum, magis oleribus. transiendum paulatim ad assæ ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Aestate vero & potione & cibo corpus satius eget. Ideo prandere quoq; commodum est. Eo tempore aptissima sunt & ceræ, & olea, potio quam diutissima, & sitim tollat, nec corpus incendat, frigida lauitio, caro assæ, frigidi cibi, vel qui refrigeret. Ut satius autem cibo utendum, sic exiguum est. Per autumnum propter cæli varietatē periculum maximum est. Itaq; neq; sine veste, neq; sine calceamentis prodire oportet, præcipueq; diebus frigidioribus: neq; sub diuina nocte dormire, aut certe bene operiri. Cibo verò iam paulo pleniore uti licet.

minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quæ immodicè toto die. plerunq; sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita nō hæc, sed consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quàm in his noxa est. Sed his uti non sæpius, quàm alio cibo convenit. Deniq; aliquid densiori cibo, cū id accedit necessarium est demi. Neq; æstate verò, neq; autumnō utilis venus est. Tolerabilior tamē per autumnū: æstate verò in totum, si fieri potest, abstinendum.

De his qui aliqua parte corporis laborant, est
& primum de his quibus caput infirmum.

CAP IIII.

Proximum est, ut de his dicam, qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is (si bene connoverit) leniter perfricare id manū manibus suis debet: nunquam id (si fieri potest) veste velare, aut ad cutem tonderi: utiq; lunam vitare, maximūq; ante ipsum lunæ, solisq; concursus: sed nusquam post cibum, progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pellere, multum ambulare: sed (si licet) sub tecto, neq; in sole. Ubique autem vitare solis ardorem, maximūq; post cibum & vinum: potius ungi quàm lavari, nunquam ad flammam ungi, interdum ad pruinam. Si in balneum venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi ungi, tum transire in calidarium. Vbi sudabit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere.

Aqua frigida capiti prodest.

fundere: tum tepida uti, dein frigida, diutiusq; ea caput, quàm ceteras partes perfundere: deinde id aliquandiu perfricare: novissimè detergere & vngere. Capiti nihil aquè prodest, atq; aqua frigida: itaq; is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene Largo canali quotidie debet aliquandiu subicere. Semper autē, etiam si sine balneo unctus est, neq; totū corpus refrigerare sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cum ceteras partes attingi uolit, demittere id, ne ad cervices aqua descendat, eamq; ne quid oculis, aliisve partibus noceat descendentem subinde manibus ad os revertere. Huiusmodicus cibus necessarius est, quem facile concoquat: isq; , si ieiunio caput leditur, assumendus etiam medio die est: si non leditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutum, leue, quàm aquam magis expedit: ut cum caput grauius esse ceperit, sit quò cōfugiat: eiq; ex toto neq; vinum, neq; aqua semper utilia sunt: medicamentum utrunq; est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, voce contendere, huic opus non est, utiq; post canam, postquam nec cogitatio quidem ei salutata est, maxime tamen vomitus alienus est.

De his qui lippitudine, grauedine, deffillatione, v. consiliisq; laborant.

C A P.

NEq; verò his solis, quos capitis imbecillitas torquet, vsus aqua frigida prodest: sed etiam, quos assidua lippitudines, grauedines, deffillationes, tonsillaq; malè habent. His autem non caput

caput tantum quotidie perfundendum est, sed os quoq; multa frigida aqua fovendum est: præcipueq; omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi gravius calum Austri reddiderunt. Cumq; omnibus inutilis sit, post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tum his præcipue, qui vel capitis, vel arteria dolores habere consueverunt; vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam gravedines, destillationesq; possunt, si quam minimè eū (qui his opportunus est) aërē vel loca; aquaq; mutet, si caput in se protegit, ne incendatur, nèue subitum ex repentino nubilo frigus id moveat, si post concoctionem ieiunus caput radit, si post cibum neq; legit, neq; scribit.

Ad solutam aluum remedia.

CAP. VI.

Quem verò frequenter citata aluus exercet, huic opus est pila, similibusq; superiores partes exercere, dum ieiunus est ambulare, vitare solis nimium ardorē, continua balnea, ungi citra sudorē, non uti cibis varijs, minimèq; iurulentis, aut leguminibus, oleribusve his, quæ celeriter descendunt, omnia deniq; fugere quæ tarde concoquantur. Venatio, duriq; pisces, & ex domesticis animalibus assa caro maximè iuvant. Nunquam vinum salsum bibere expedit, ne tenue quidem, aut dulce, sed austerrum, & plenius, neq; id ipsum peruetus. Si mulso uti volet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigida potiones ventrem eius non turbant, his utendum potissimum est. Si quid

Plin. lib.
14. cap. 3.
Tenue,
Dulce,
Austerrum,
Plenius.

offen

offensa in cæna sensit, vomere debet, idq; postero quoq; die facere, tertio modici ponderis panem ex vino esse, adiecta vna vel olea, vel ex defruto, similibusq; alijs, deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conquiescere, ac neque intendere animum, neq; ambulatione, quamvis leui, dimoueri.

Remedia ad coli dolorem.

CAP. VII.

ET si laxius intestinum dolere cōsuevit (quod *κῶλον* nominant) cū id nihil nisi genus inflationis sit, id agendum est, vt cōcoquat aliquis, vt lēctione, & alijs generibus exerceatur: vtatur balneo calido, cibis quoq; & potionibus calidis: deniq; omnimodo frigus euitet, itē dulcia omnia, leguminaq; & quicquid inflare consuevit.

Quæ agenda sint stomacho laborantibus.

CAP. VIII.

SI quis vere stomacho laborat, legere clarè debet. post lēctionem ambulare: tum pila, vel atmis, alióve quo genere, quo superior pars mouetur, exerceri. non aquā, sed vinū calidum bibere ieiunus: tum cibum bis die assumere, sic tamen & facile concoquat: vti vino tenui, & austero, & post cibum frigidis potionibus petius. Stomachum autem infirmum indicant, pallor, macies, præcordiorum dolor, nausea, & nolentium vomitus, in ieiunio dolor capitis. Quæ in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neq; credendum utiq; nostris est, qui cum in aduersa valetudine vinum aut frigidam aquam

aquam concupierunt, deliciarum patrociniū in
accusationem, non merentis stomachi habent. At
qui tardè concoquant, & quorum ideo praeordia
inflantur, qui ve propter ardorem aliquem noctis
sitire consueverūt, antè quàm conquiescant, duos,
trēs ve cyathos per tenuem fistulam bibant. Pro-
dest etiam aduersus tardam cōcoctionem clarè le-
gere, deinde ambulare, tum velungi, vel lauare
assiduè, vinum frigidum bibere, & post cibum
magnam potionem, sed (ut supra dixi) per siphonem,
deinde omnes potiones aqua frigida inter-
cludere. Cui verò cibus acescit, is ante eum bibere
aquam egelidam debet, & vomere. At is cui ex
hoc frequens deiectio incidit, quoties aluus ei con-
stitit, frigida potione potissimum utatur.

Quid observandum sit dolore nervorum labo-
rantibus.

CAP. IX.

SI cui verò dolere nervi solent (quod in poda-
gra, chiragra ve esse consuevit) huic quātum
feri potest, exercendum id est, quod afflictum est,
obijciendumq; labori & frigori, nisi cum dolor in-
creuit. Sub dio quies optima est. Venus semper ini-
mica est. Concoctio (sicut in omnib. corporis affe-
ctibus) necessaria est. Cruditas enim id maxime
ledit, & quoties offensum corpus est, vitiosa pars
maxime sentit. Ut concoctio autem omnibus vi-
tijs occurrat, sic rursus alijs frigus, alijs calor. Quae
sequi quiq; prohibitu corporis sui debet. Frigus
inimicum est seni, tenni, vulneri, praecordijs, inte-
stinis,

finis, vesica, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, vulva, cerebro. Idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram. Ex hoc horrores, tremoresq; nascuntur. At prodest iuuenibus, & omnibus plenis, erectiorq; mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cauetur. Aqua vero frigida infusa, praeterquam capiti, etiam stomacho prodest. Item articulis, doloribusq; qui sunt sine ulceribus. Item rubicundis nimis hominibus, si dolere vacant. Calor autem adiuvat omnia quae frigus infestat. Item lippientes si nec dolor, nec lacryma sunt. Non quoque qui contrahuntur, precipueq; ea ulcera, quae ex frigore sunt. Idem corporis calorem bonum facit, urinam mouet. Si nimis est, corpus effeminat, nervos emollit, stomachum soluit. Minime vero aut frigus, aut calor tanta sunt, ubi subita insuetis sunt. Nem frigus lateris dolores, aliaq; vitia: frigida aqua strumas excitat. Calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudorem digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

Observatio in pestilentia.

C A P. X.

Est etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, manigare. Vbi id non licet, gestari, ambulare sub dino, ante astitum leniter, eodemq; modo vinci, & ut supra comprehensum est, vitare fatigationem.

tionem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem, multoq; magis se continere, si qua grauitas in corpore est: tum neq; mane surgendum, neq; pedibus nudis ambulandum est, minimeq; post cibum, aut balneum, neq; ieiunio, neq; caenato comedum est. Neq; mouenda alius, atq; etiam si per se mota est, comprimenda est. Abstinentum potius, si plenus corpus est. Itemq; vitandum balneum, sudor, meridiane somnus, utiq; si cibus quoq; antecessit, qui tamen semel die tunc comedius assumitur: insuper etiam modicus, ne cruditatem moueat. Alternis diebus iunice modo aqua, modo uino bibendum est. Quibus seruatis, ex reliqua uictus consuetudine, quam minimū mutari debet. Cū uero hac in omni pestilentia faciēda sunt, tum in ea maxime, quam austeri excitarint. Atq; etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, ubi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus, uel ubi in græues regiones uenerunt. Ac si cetera res aliqua prohibebit, utiq; abstinere debebit. Atque ita ab uino ad aquam, ab hac ad uinum eo, qui suprapositus est, modo transitus ei esse.

LIBER II



INSTANTIS autem aduersæ ualitudinis signa cōplura sunt. In quibus explicandis non dubitabo autoritate antiquorum uirorum uti, maximūq; Hippocratis: cum recentiores quoq; Medici

quam

meliores pluvij, quàm tantum nebulosi, aut nubi-
bili, optimiq; hyeme qui omni vëto vacant: astate
quibus Favonij perflant. Si genus aliud vëtorum
est, salubriores Septentrionales, quàm Subsolani,
vel Austrisunt. Sic tamen, ut hac interdum re-
gionum sorte mutantur. Nam si rë ventus ubiq; à
mediterraneis regionibus veniens salubris, à ma-
ri gravis est. Neq; solum in bono tempestatum ha-
bitu certior valetudo est, sed priores morbi quoq;
(si qui inciderunt) leuiore sunt, & promptius fi-
niuntur. Pessimum ergo cælum est, quod agrum
facit, adeo ut in id quoq; genus, quod natura peius
est in hoc statu, salubris mutatio sit. Aetas media
tutissima est, quæ neq; iuuenta calore, neq; sen-
ectutis frigore infestatur. Longis morbis senectus,
acutis adolescentia magis patet. Corpus autem ha-
bilissimum quadratum est, neq; gracile, neq; obe-
sum. Nam longa statura, ut in iuuenta decora est,
sic matura senectute confuitur. Gracile corpus, in-
firmum: obesum, hebes est. Vere tamen maximè
quacunq; humoris motu novantur, in metu esse
consuerunt. Ergo tum lippitudines, pustula, pro-
fusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀποθήμα-
τα Græci nominant, bilis atq; quam μελαγχολία
appellant, insania, morbus comitialis, angina,
grauedines, destillationes oriri solent. Hi quoq;
morbi qui in articulis, nervisq; modo urgent, mo-
do quiescunt, tum maximè & incitantur & re-
periunt. At aestas non quidem vacat plerisq; ab his

Pluvij,
Nebulae,
Nebulae,

Corpus
quadratum.

quamvis quadam in curationibus mutarint, tamen hac illum optimè præfagisse fateantur. Sed antequàm dico, quibus præcedentibus morborum timor subsit, non alienum videtur exponere, quæ tempora anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora maximè tuta, vel periculis opportuna sint, quod genus aduersæ valetudinis in quoq; timeri maximè possit. Non quò nò omni tempore, in omni tempestatu genere, omnis ætatis omnis habitus hominū per omnia genera morborum & agrotent, & moriantur: sed quòd frequentius tamen quadam eueniant. Ideoq; vile est sciri unumquemq;, quid, & quando maxime caueat.

Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora vel tuta, vel morbis opportuna sint: & quod valetudinis genus in quoq; timeri possit.

CAP.

Igitur saluberrimum ver est, proxima deinde ab hoc hyems, periculosior æstas, autumnus longe periculosissimus. Ex tempestatibus verò optimæ æquales sunt, siue frigida, siue calida, pessimæ, quæ variant maxime. Quo fit, ut Autumnus plurimos opprimat. Nam si rē meridianis temporibus calor, nocturnis atq; matutinis, simulq; etiam vespertinis frigus est. Corpus ergo & astate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime, sic quandocunq; euenit, noxium est. Vbi æqualitas autem est, tamen saluberrimi sunt sereni &

niq; omnis calor & iecur, & lienem inflammat:
 mentē hebetat: ut anima deficiat, ut sanguis pro-
 rumpat, efficit. Frigus modo nervorū distentionē,
 modo rigorem infert, illud *σπασμὸς*, hoc *τὴταιν* &
 Gracè nominatur: nigriciem in ulceribus, horrorē
 in febribus excitat. In siccitatibus acuta febres, lip-
 pitudines, tormina, urinae difficultas, articulo-
 rum dolores oriuntur. Per hyemes longa febris, alius
 deiectiones, angina, canceri, morbi comitiales, reso-
 lutio nervorum, quā *παράλυσις* Graci nomināt.
 Neq; solum interest, quales dies sint, sed etiā qua-
 les ante praecesserint. Si hyems sicca Septentriona-
 les ventos habuit, ver autem Austros & pluvias
 exhibet, si se subeūt lippitudines, tormina, febres,
 maximeq; in mollioribus corporibus, idēq; prae-
 pue in mulieribus. Si verò Austri, pluviaq; hye-
 mem occuparūt, ver autem frigidū & siccum est,
 granida quidē semina, quibus animus adest partus,
 abortu periclitantur. Haec verò quae pigrescunt, imbe-
 cillosq; vixq; vitales edunt. Ceteros lippitudo ari-
 da, & si seniores sunt, grauedines, atq; destillatio-
 nes male habent. At si a prima hyeme Austri ad-
 ultimum ver continuaverunt, laterum dolores, &
 insensibilis febricitantium, quam *φεβίτις* appellāt,
 quam celerrime rapiunt. Vbi primò calor a primo
 vere orsus, estatem quoq; similem exhibet, *πύρεξις*
 est multū sudorē in febribus subsequi. At si sicca
 aestas Aquilones habuit, autumno vero Hyemes,
 Austriq; sunt, tota hyeme quae proxima est tussis,

morbis, sed adijcit febres; vel cōtinuas, vel arden-
 tes, vel tertianas, vomitus, alui deiectiones, auri-
 cularum dolores, ulcera oris, caneros, & in ceteris
 quidē partibus, sed maxime obsiænis, & quicquid
 sudore hominem resoluit. Vix qui quā ex his in
 autumnum non incidit: sed oriūtur eo quoq; tem-
 pore febres incerta, lienis dolor, aqua inter cutem,
 tabes, quam Græci φθίσις nominant: urinae diffi-
 cultas, quam τριχῶς πικρὰ appellant: tenuioris in-
 testini morbus, quem εἰλωπ nominant. Fit itē leni-
 tas intestinorum, quæ λυεντεπία vocatur, coxæ
 dolores, morbi comitiales. Idemq; tempus & diu-
 tinis malis fatigatos, & ab ætate tantū proxima
 oppressos interimit, & alijs novis morbis conficit,
 & quosdā longissimis implicat, maximeq; quat-
 tanis, quæ per hyemē quoq; exercent. Neq; aliud
 magis tempus pestilentia patet, cuiusq; ea ge-
 neris est, quamvis varijs rationibus nocet. Hyems
 autem capitis dolores, tussim, & quicquid in san-
 cibus, in lateribus, in visceribus mali contrahunt
 Aquilo. irritat. Ex tempestatibus Aquilo tussim mouet,
 funces exasperat, ventrem astringit, & rimam sup-
 primit; horrores excitat, item dolores lateris & pe-
 ctoris. Sanum tamen corpus spissat, & mobilius
 Aust. atq; expeditius reddit. Aust. aures hebetat, sen-
 sus tardat, capitis dolores mouet, aluum soluit, to-
 tum corpus efficit hebes, humidum, languidum.
 Ceteri venti quò vel huic vel illi propiores sunt,
 eo magis vicinos his illis ve- affectus faciunt. De-
 niq;

dragesimū diem, deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem inciderunt, ac neq; pubertate, neq; primis coitibus, neq; in semina primū menstruis finita sunt, frē longa sunt. Sapius tamē morbi pueriles, qui diutius māserunt, terminantur. Adolescentia morbis acutis, itē comitialibus, tabiq; maxime obiecta est, frēq; iuvenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc etatem laterum & pulmonis dolores, lethargus, cholera, insania, sanguinis per quadam etiam velut ora venarum (αἱμορροΐδας Græci appellant) profusio. In senectute spiritus & urina difficultas, gravedo articulorum, & renum dolores, nervorum resolutiones, malus corporis habitus (κακὴ ἑξία Græci appellant) nocturna vigilia, vitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præcipueq; soluta alvus, & qua sequuntur hanc tormina vel leuitas intestinorum, ceteraq; fusi ventris mala. Præter hac graciles, tabes, deiectiones, destillationes. Item viscerum & laterum dolores fatigant. Obesi plerunq; acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoq; sæpe moriuntur. Quod in corpore tenuiore vix evenit.

De signis * aduersæ valetudinis futuræ.

C A P. II.

* notis

ANte aduersam autem valetudinem (ut supra dixi) quadam nota oriuntur, quarum omnium commune est, aliter se corpus habere, atq;

destillatio, rancitas, in quibusdam etiam tabes, oriuntur. Sin autem autumnus quoque; equè sicca isdem Aquilonibus perflatur, omnibus quidem mollioribus corporibus, inter quæ muliebria esse proposui, secunda valetudo contingit. Durioribus verò instare possunt & arida lippitudines, & febres partim acuta, partim longa, & hi morbi, qui ex atra bile nascuntur. Quod ad ætates verò pertinet, pueri, proximique; his, vere optime valent, & æstate prima tutissimi sunt: Senes æstate, & autumni prima parte: iuvenes hyeme, quique; inter inventam senectutemque; sunt. Inimiciior senibus hyems æstas adolescentibus est. Tum si quæ imbecillitas oritur, proximū est, ut infantes, tenerosque; adhuc pueros serpentina vulnera oris (quæ ἀφθὰς Greci nominant) vomitus, nocturna vigilia, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerceant. Proprie etiā dentientium gingivarū exulcerationes, distentiones nervorum, fibriculæ interdum, alui deviationes, * maximeque; cæcivis dentibus orientibus male habent. Quæ pericula plenissimi cuiusque; sunt, & cui maxime venter adstrictus est. At ubi ætas paulum processit, glandula, & vertebrarū quæ in spina sunt, aliqua inclinationes: struma verrucarum quædam genera dolentia (ἀκρὸς χόρδων Greci appellant) & plura alia tubercula oriuntur. Incipiente verò iam pube, ex isdem multa & longa febres, sanguinis ex naribus cursus. Maximeque; omnis pueritia primū circa quædam

* maxil-
laeque;

consuevit, neq; in peius tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet. Quae quia neq; in eodē habitu, subsistere, neq; ultra progredi possunt, si rē retro, quasi ruina quadam, reuoluntur. Peius tamen signum est, ubi aliquis contra consuetudinem emacruit, & colorē decoremq; amisit, quoniam in his quae superant, est quod morbus demat: in his quae desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Prater haec protinus timeri debet, si grauiora membra sunt, si crebra ulcera oritur, si corpus supra consuetudinē incaluit, si grauior somnus pressit, si tumultuosa somnia fuerint, si saepius exurgiscitur aliquis, quam assuevit, deinde iterum soporatur, si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinē insudat, maximeq; circa pectus, aut cervices, aut crura, vel genua, vel coxas. Itē si marcescunt, si loqui & mueri piget, si corpus torpet, si dolor praecordiorum est, aut totius pectoris, * aut, qui in plurimis euenit, capitis: si salina plenum est os, si oculi cum dolore verentur, si tempora astricta sunt, si membra inhorrescunt, si spiritus grauior est, si circa frontē intenta vena mouentur, si frequentes oscitationes, si genua quasi fatigata sunt, totūve corpus lassitudinem sentit. Ex quibus saepe plura nunquā non aliqua, febrem antecedunt. In primis tamen illud considerandum est, nunquid saepius horum aliquid eueniat, ac ideo neq; corporis vlla

integrum quod èdampivis Græci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet, & in urina subsidere album, leve, æquale, sic ut etiam si quæ quasi nubecula innatarint, in immum defirantur. At venter ci qui a periculo tutus est, reddit modo mollia, si urata eodem serè tempore, quo secunda valetudine: assuevit modo convenientia his quæ assumuntur. Peior cita aluus est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & ruffa est, neq; fæditate odoris similem aluum sani hominis excedit. Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine morbi descendisse, nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus dolorem tumorèq; fecit, bonum signum est. Sonus ventris inde ad inferiores partes euolutus, magisq; etiam si sine difficultate cum stercore excessit.

Mala signa ægrotantium. CAP. IIII.

Contra gravis morbi periculum est, ubi supinus ager iacet, porrectis manibus & cruribus, ubi residere vult, in ipso acuti morbi impetu, præcipueq; pulmonibus laborantibus. Ubi nocturna vigilia premitur, etiã si interdum somnus accedit. Ex quo tamen peior est, qui inter quartam horam & noctem, quàm qui matutino tempore ad quartam. Pessimum tamen est, si somnus neq; nocturnus, neq; interdum accedit: id enim serè sine continuo dolore esse non potest. Aequè verò signum

difficultas subsequatur. Sunt enim quadam proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quicquam in futurum prasagiri potest. Facile itaq; securus est in his aliquis, quae saepe sine periculo evasit. Ille sollicitari debet, cui haec nona sunt, aut qui ista nunquam sine custodia sui tuta habuit.

Quae bona in aegrotantibus signa sint.

C A P. I I I.

V Ti vero febris aliquem occupat, scire licet non periculitari, si in latus aut dextrum, aut sinistrum, ut ipsi visum est, cubat, cruribus paulum reductis: qui si re sani quoq; iacentis habitus est: si facile conueritur, si noctu dormit, si interdum vigilat, si ex facili spirat, si non conflatur, si circa umbilicum & pubē cutis plana est: si praecordia eius sine ullo sensu doloris aequaliter mollia in utraq; parte sunt: quod si paulo tumidiora sunt, sed tamen digitis cedunt, & non dolent, haec valetudo, ut spatium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoq; quod aequaliter molle & calidum est, quodq; aequaliter totum insudat, & cuius fibrícula eo sudore finitur, securitatem pollicetur, quando iam ad sanitatem venit corpus. Sternutamentum etiam inter bona indicia est: & cupiditas cibi, vel a primo servata, vel etiam post fastidium orta. Neq; terrere debet ea febris, quae eodem die finita est: ac ne ea quidem, quae quamvis longiore tempore evanuit, tamen ante alteram accessionem ex toto quievit, sic ut corpus

gnus malum est, etiam somno vltra debitum
 urgeri, peiusq; quo magis se sopor interdum, no-
 ctuq; continuat. Mali etiam morbi i. Stimonium
 est, vehementer & crebro spirare, à sexto die cæ-
 pisse inhorrescere, pus expuere, vix exercere, dolo-
 rem habere continuum, difficulter ferre morbum,
 iactare brachia & crura, sine voluntate lacryma-
 re, habere humorem glutinosum dentibus inha-
 rentem, cutem circa umbilicum & pubem ma-
 cram, præcordia inflammata, dolentia, dura, tu-
 mida, intenta: magisq; si hac dextra parte, quàm
 sinistra sunt: periculosissimum tamen est, si vene
 quoq; ibi vehementer agitantur. Mali etiam mor-
 bi signum est, nimis celeriter emacrescere, caput,
 & pedes, manusq; calidas habere, ventre & late-
 ribus frigentibus, aut frigidas extremas partes
 acuto morbo urgente, aut post sudorem inhorre-
 scere, aut post vomitum singultum esse, vel rubere
 oculos, aut post cupiditatem cibi, post vel longas
 febres hunc fastidire, aut multum sudare, maxi-
 meq; frigido sudore: aut habere sudores non per
 totum corpus æquales, quiq; febrem non finiant,
 & eas febres quæ quotidie tempore eodem reuer-
 tantur, quæve semper pares accessiones habeant,
 neq; tertio quoq; die lenentur, quæve continent
 * vel per accessiones increcant, per discessiones * ut
 tantum molliantur, nec unquam integrum cor-
 pus dimittant. Pessimum est, si ne lenatur quæ-
 dam febris, sed æquè concitata continuat. Pericu-
 d 3 losum

losum est etiam post arquatum morbum febrem
oriri, vtiq; si precordia dextra parte dura manser-
runt, ac dolentibus his lava. Nulla acuta febris le-
uiter terrere eos debet: neq; vnquam in acuta fe-
bre, vt à somno, non est terribilis nervorum dissec-
tio. Timere etiã ex somno, mali morbi est. Itemq;
in prima febre protinus mentem esse turbatam
membrum ve aliquod esse resolutum. Ex quo casu
quamuis vita redditur, tamen id ferè membrum
debilitatur. Vomitus etiam periculosus est syncre-
pituita, vel bilis, peiorq;, si viridis, aut niger est.

Vrina. At mala vrina est, in qua subsidunt subrubri
aut liuida: deterior, in qua quasi fila quadam te-
nuia, atq; alba: pessima ex his, si tanquam ex ful-
furibus factas nubeculas representat: diluta quoq;
atq; alba vitiosa est, sed in phreneticis maxime.
Alius autem mala est ex toto suppressa. Pericu-
losa etiam qua inter febres fluens, conuiescere to-
minem in cubili non patitur: vtiq; si quod disce-
dit est perlucidum, aut albidum, aut pallidum,
aut spumans. Præter hac periculum ostendit id
quod excernitur, si est exiguum, glutinosum, le-
ue, album, idemq; subpallidum, vel si est aut lni-
dum, aut biliosum, aut cruentum, aut peioris odo-
ris, quam ex consuetudine. Malum est etiam, quod
post longas febres hucerni est.

De signis longæ valetudinis.

CAP. V.

Post hac indicia, notum est longum morbum
feri. Sic enim necesse est, nisi occidit. Neq;

lumen refugiunt, & illacrymant, quæq; in ijs alba esse debent, rubescunt, atq; in hisdem venula pallent, pituitaq; in ijs innatans novissimè angulis inhaerescit, alterq; ex his minor est, hiq; aut vehementer subsederunt, aut facti humidiores sunt: perq; somnum palpebra non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet: neq; id fluens alius expressit: eademq; palpebra pallent, & idem pallor labra & nares decolorat. Eademq; labra & nares oculiq; & palpebra & supercilia, aliquavè ex his perversuntur, isq; propter imbecillitatem iam non audit, aut non videt: eadem mors denuntiatur, ubi æger supinus cubat, eiq; genua contracta sunt. Ubi dorsum ad pedes subinde delabitur. Ubi brachia & crura nudat, & inequabiliter dispergit, neq; his calor sabbest. Ubi hiat, ubi assidue dormit: ubi is qui mentis suæ non est, neq; id facere sanus solet, dentibus fridet. Ubi vultus quod aut antè, aut in ipso morbo natus est, aridum, & aut pallidum, aut lividum factus est. Illa quoq; mortis indicia sunt, ungues, digitiq; pallidi, frigidus spiritus, aut si manibus quis in febre & acuto morbo vel insaniti pulmonisve dolore, vel capitis, in veste floccos legit, fimbriasve diducit, vel in adiuncto pariete, si qua minuta eminent, carpit. Dolores etiam circa coxas & inferiores partes orti, si ad viscera transierunt, subitoq; desierunt, mortem subesse testantur, magisq; si alia quoq; signa accesserint.

Neq; iſervuari poteſt, qui ſine * ullo tremore ſi- * alij, tu-
 tricitans, ſubito ſtrangulatur, aut denotare ſali- more. alij,
 nam ſuam non poteſt. Cui ve in eodem febris cor- timore
 porisq; habitu cervix converſitur, ſic ve denotare
 æquè nihil poſſit. Aut cui ſimul & continua fe-
 bris, & ultima corporis infirmitas eſt: aut cui fe-
 bre non quieſcente, exterior pars friget, interior ſic-
 calet, ve etiam ſitum faciat: aut qui ſi bre æquè nō
 quieſcente ſimul & delirio, & ſpirandi difficul-
 tate vexatur: aut qui epoto veratro exceptus di-
 ſtentione nervorum eſt: aut qui ebrius obmutuit.
 Is enim ſi bre, adiecta nervorum diſtentione con-
 ſumitur, niſi aut febris* acceſſit, aut eo tempore, * abſceſſit
 quo ebrietas ſolvi debet, loqui capit. Mulier quo-
 que gravidæ, acuto morbo facilè conſumitur. & iſi
 cui ſomnus dolorem auget, & cui protinus in re-
 centi morbo bilis atra vel infra, vel ſupra ſe oſten-
 dit, cui ve alterutrum modo ſe prompſit, cum iam
 longo morbo corpus eius eſſet extenuatum, & affe-
 ctum, ſputum etiam bilioſum & purulentum, ſi-
 ne ſeparatim iſta, ſive mixta proueniunt, interi-
 tus periculum oſtendunt. At ſi circa ſeptimum
 diem tale eſſe capit, proximū eſt, ut iſi circa quar-
 tumdecimum diem deſcedat, niſi alia ſigna melio-
 ra, peiora ve acceſſerint: quæ quo leuiora, gra-
 uiora ve ſubſecuta ſunt, eo vel ſeriores mortem,
 vel maturior: m denuntiant. Sudor quoq; frigi-
 dus in acut: ſi bre p:ſiſtitus eſt, atq; in omni mor-
 bo vomitus, qui varius, & multorum colorum
 eſt,

est, precipueq; si malus in hoc odor est. Ac sanguinem quoq; in febre vomuisse, pestiferum est. Urina vero rubra, & tenuis * in magna cruditate effusa, consuevit, & saepe antequam spatium maturescat, hominem rapit. Itaq; si talis diutius permanet, periculum mortis ostendit. Pessima tamen est, precipueq; mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Atq; in viris quidem & mulieribus talis deterrima est. In pueris vero quae tenuis & diluta est. Aluus quoq; variis pestifera est, quae strigmentum, sanguinem, bilem viridem, aliquid modis diversis temporibus, modo simul, & in mixtura quadam, discreta tamē representat. Sed haec quidem potest paulo diutius trahere. In precipiti vero iam esse denuntiat quae liquida, eademq; vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utiq; si magna scditas odoris accessit. Illud interrogari me possit ab aliquo scio: Si certa futura mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti a medicis convalescant, quosdamq; fama prodiderit in ipsis funebribus renixisse? qui etiam vir iure magni nominis Democritus, ne finita quidem vita satis certitas esse proposuit, quibus medici credidissent: at adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa futurae mortis essent. Aduersus quos ne illud quidem dicam, quod in vicino saepe quadam nota posita, non bonos sed imperitos medicos decipiunt. quod Alcibiades funeri obuius intellexit, cum iuvene, qui efferebatur, ne protinus crimen artis esset, si quid pro

In magna cruditate, subaudiendum est, morbi. Sic in Prognos. Hippocr. lib. 1. Urina quoad ruffa tenuisq; apparuerit, crudum morbum significat.

professoris sit. Illa tamen moderatius subiiciam. Coniecturalem artem esse medicinam, ratione cuiq; coniectura talem esse, ut cum sapius aliquando responderit, interdum tamen fallat nos. Siquid itaq; vix in nullissimo corpore aliquando decipit, id notam non habet, cum per innumerabiles homines respondeat. Idq; non in his tantum, quæ peristira sunt, dico: sed in his quoq; quæ salutaria. Siquidem etiam spes interdum frustratur, & moritur aliquis, de quo medicus securus primò fuit. Quæq; medendi causa reperta sunt, nonnunquã in peius aliquid convertunt. Neq; id evitare humana imbecillitas in tanta varietate corporum potest. Sed est tamen medicina fides, quæ multo sapius, perq; multo plures agros prodest. Neq; tamen ignorare oportet, in acutis morbis fallaces magis notas esse, & salutis & mortis.

De notis, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit.

CAP. VII.

Sed cum proposuerim signa quæ in omni aduersa valitudine communia esse consueverunt, ea quoq; transibo, ut quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit notis, indicem. Quædam autem sunt, quæ ante febres, quædam quæ inter eas, quid aut intus sit, aut venturum sit, ostendunt. Ante febres, si caput graue est, aut ex somno oculi caligant, aut frequentia stercuramenta sunt, circa caput aliquis pituitæ impetus timeri potest. Si sanguis aut calor abundat,

ulla alia spes in malis magnis est, quin ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, & corrigaturq; in id tempus, quod curationi locum praestet. Proti- nus tamē signa quadam sunt, ex quibus colligere possumus morbum, & si non interemerit, longius tamen tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter- ter fibres non acutas circa caput tantum, & cerni- cet oritur: aut ubi fibre non quiescente corpus in- sudat: aut ubi corpus modo frigidum, modo cali- diū est, & color alius ex alio sit: aut ubi quod in- ter fibres aliqua parte abcessit, ad sanitatem non peruenit: aut ubi aeger pro spatio parū emacrescit. Item si urina modo liquida & pura est, modo ha- bet quadam subsidentia, si lenia, atq; alba, rubra- ve sunt, quae in ea subsidunt, aut si quasdā quasi maculas representat, aut si bullulas excitat.

Urina.

De indicis mortis.

CAP. VI.

Sed inter haec quidem proposito metu spes ta- men superest. Ad ultima verò iam ventum esse testantur, nares acuta, collapsa tempora, oculi concavi, frigida languidaq; aures, & imis parti- bus leniter versa, cutis circa frontem dura & in- tenta, color aut niger, aut per pallidus, multoq; magis si ita haec sunt, ut neq; vigilia praecesserit, neq; ventris resolutio, neq; inedia. Ex quibus causis interdum hac species oritur, sed vno die finitur. Itaq; diutius durans mortis index est. Si verò morbo vetere iam triduo talis est, in propin- quo mors est: magisq; si praeterea oculi quoque

Habet de his indicis Hippocra- tem ipsum in primo prognosti- cō, unde haec autor desumpsit, ut alia mul- ta in hoc secūdo li- bro.

lumen

est, ut eo loco nervi contrahantur, aut si id membrum ex levi causa fatigatum aquè frigido calidoq; offenditur, ποδάρπαρ χερσάρπαρ ve vel eius articuli in quo id sentitur, morbum futurum esse denūciat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desyt, hi vel capitis doloribus consiliētur necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graues habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus faminis menstrua non proveniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel qualibet alia pars morbo infestetur. Eademq; his pericula sunt, quibus articulorū vitia, dolores, tumoresq; sine podagra similibusq; morbis oriuntur & desinunt. Vtiq; si saepe tempora ipsidem dolent, noctuq; corpora insudant, frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier à partu vehemētes dolores habet, neq; alia praeter ea signa mala sunt circa vigesimum diem, aut sanguis per nares erūpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicūq; etiā dolorem ingentem circa tempora & frontem habebit, is alterutra ratione eū finiet, magisq; si iuuenis erit, per sanguinis profusionem, si senior, per suppurationem. Febris autem qua subito sine ratione, sine bonis signis finita est, frē reuertitur. Cui fauces sanguine & interdū & noctu replentur, sic ve neque capitis dolores, neq; praecordiorum, neque tussis, neq; vomitus, neque fibracula praecesserit, huius aut in naribus, aut in faucibus vltus reperi-

c rictus,

dat, proximum est, ut aliqua parte profluvium sanguinis fiat. Si sine caussa quis emacra sit, ne in malum habitum corpus eius recidat, metus est. Si precordia dolent, aut inflammatio gravis est, aut non toto die concocta firmitur urina, cruditatem esse manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio malus est, hi vel capitis doloribus constistantur, vel terram edunt. Qui diu habent faciem pallidam, & tumidam, aut capite, aut visceribus, aut alno laborant. Si in continua febre puera venter nihil reddit, mutaturq; ei color, nec somnus accedit, ploratq; is assidue, metuenda nervorum distentio est. Frequens autem destillatio in corpore tenui longoq;, tabem timendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non descendit alnus, docet aut subitam deiectionem, aut febriculam instare. Vbi pedes turgēt, longę deiectiones sunt. Vbi dolor in imo ventre & in coxis est, aqua inter cutem inflat. Sed hec morbi genus ab ilibus oriri solet. Idē propositum periculum est his, quibus voluntas desidendi est, venter nihil reddit, nisi & agri & duri tumor in pedibus est, idemq; modo dextra modo sinistra parte ventris invicem oritur atque finitur: sed à iocinore id malū proficisci videtur. Eiusdem morbi nota est, ubi circa umbilicum intestina torquentur (σπέρπον Græci nunciant) et xq; dolores manent, et q; neq; tempore, neq; remedijs solvitur. Dolor autem articularum, prout in pedibus, manibus ut, aut alia qualibet parte fit,

rietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est,
 urina neq; caussa apparet, vlcus in vulua est. Urina au-
 tem crassa, ex qua quod desidet album est, signifi-
 cat circa articulos, aut circa viscera dolorem, me-
 tumq; morbi esse. Eadem viridis aut viscerum
 dolorem tumoremq; cum aliquo periculo subesse,
 aut certè corpus integrum non esse testatur. At si
 sanguis aut pus in urina est, vel vesica, vel renis
 exulcerati sunt. Si hac crassa carunculas quasdam
 exiguas quasi capillos habet, aut si bullat, & ma-
 le olet, & interdum quasi barenam, interdum
 quasi sanguinem trahit, dolent autem coxa, quaq;
 inter has, superq; pubem sunt, & accedunt fre-
 quentes ructus, interdum vomitus biliosus, ex-
 tremaq; partes frigesunt, urina crebra cupiditate
 sed magna difficultas est, & quod inde excretum
 est aque simile, vel rufum, vel pallidum est, pau-
 lum tamen in eo lenamenti est, alius vero cum
 multo spiritu redditur, utiq; in renibus vitium
 est. Aut si paulatim distillat, vel si sanguis per
 hanc editur, & in eo quedam cruenta concreta
 sunt, idq; ipsum cum difficultate redditur, &
 circa pubem inferiores partes dolent, in eadem
 vesica vitium est. Calculosi verò his indicijs co-
 gnoscuntur: Difficulter urina redditur, paula-
 timq; interdum etiam sine voluntate distillat.
 Eadem barenosa est, nonnunquam aut sanguis
 aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea
 excernitur. Eamq; quidam promptius recti, qui-
 dam

Calculosi.

his aut lien tumet, aut capitis dolores sunt, quos
 sequitur, aut quadam ante oculos tanquam ima-
 gines obuersentur. At quibus magni lienes sunt,
 his gingiua mala sunt, & os olet, aut sanguis ali-
 qua parte prorumpit. Quorum si nihil euenit, ne-
 cesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigra
 cicatrices fiant. Quibus causa doloris, neq; sensus
 eius est, his mens labat. Si in vëtre[m] sanguis con-
 fluxit, ibi in pus vertitur. Si à coxis, & ab infe-
 rioribus partibus dolor in pectus transit, neq; ul-
 lum signum malum accessit, suppurationis eo lo-
 co periculum est. Quibus sine febre aliqua ex par-
 te dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est, ibi
 Vrina. aliquid suppurat. Vrina quoque quæ in homine
 sano parum liquida est, circa aures futuram ali-
 quam suppurationem esse denuntiat. Hac verò cõ-
 sine febre quoq; vel latentium, vel futurarum re-
 rû notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris
 accessit, atq; etiam aliorum morborum tum signa
 nascuntur. Ergo protinus insania timēda est, ubi
 expeditior alicuius, quàm sani fuit, sermo est: su-
 bita q; loquacitas orta est, & hæ ipsa solito anda-
 cior: aut ubi raro quis & vehementer spirat, ve-
 nas q; concitatas habet, præcordijs duris & tumē-
 tibus. Oculorum quoq; frequens motus, & in ca-
 pitis dolore offusa oculis tenebra, vel nullo dolore
 substante somnus ereptus, continuata q; nocte &
 die vigilia, vel prostratum cõtra consuetudinem
 corpus in ventrem, sic, ut ipsius alui dolor id non
 coegerit:

dam resupinati, maximeq; hi qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemq; extendendo, dolorē lenant. Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea cursu omniq; motu augentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis vicibus implicāt. Fœminæ verò oras naturalium suorum manibus admotis scabere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum adinoverunt, ubi vesica cervicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est. Mulieri gravida sine modo fusa aluius elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est quod intus gerit. Dura mamma sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus, iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit, vel distentio nervorum vel rigor timeri potest. At si à priore parte id evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora venarum, sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit. At si longa tristitia cū longo timore & vigilia est, citra bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis,

lum incumbit, in iunioribus tantum: in senioribus ex eiusmodi morbo quartana frè nascitur. Eadem suppuratio sit, si præcordia dura dolentia ante vigesimum diem hominem non sustulerunt, neq; sanguis ex naribus fluxit, maximeq; in adolescentibus: utiq; si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt, sed cum in inferioribus partibus aliquid abscedit. At si præcordia tumorem mollem habet, neq; habere intra sexaginta dies desinunt, hæretq; per omne id tempus febris, tum in superioribus partibus fit abscessus: ac, si inter ipsa ulcera non fluit: circa aurem erumpit. Cumq; omnis longus tumor ad suppurationem frè spectet, * magis eò tendit is, qui in præcordiis, quàm is, qui infra est. Si lassitudinis etiã sensus in febre est, vel in maxillis, vel in articulis, aliquid abscedit. Interdum quoque urina tenuis & cruda, sic diu fertur, ut alia salutaria signa sint, exq; eo casu, plerunq; infra transactum septimum (quod *ἡμέτερον* Græci vocant) fit abscessus. Dolor autem pulmonis, si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque per sanguinis detractionem, neque per victus rationem finitus est, vomicas aliquas * interdum excitato aut circa vigesimum diem, aut circa * quadragessimum, nonnunquam etiam circa sexagesimum. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem eius partis sensit. Sed hæ vomica modo
à pulm

* aliis,
magis se
tendit

* intus
exci.

* xxx.

coëgerit: item robusto adhuc corpore insolitus dētium stridor insania signa sunt. Si quid etiā abscessit, & antequam suppuraret, in mente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris quoque dolor acutus, cum febre cōtinua, vehementiq; saepe mentem turbat, & ex eo casu iuniores interdum intra septimum diem moriuntur, seniores tardius: quoniam neq; equè magnas febres experiuntur, neq; equè insaniunt, ita sustinent, dum is affectus intus versatur. Suffusa quoq; sanguine mulieris mamma, furorem venturum esse testatur. Quibus autem longæ febres sunt, his abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum sancibus in febre eliditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit, idq; saepe intra septimū diem occidit. Quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui lōgam resolutionem, tormina: Post hæc intestinorum leuitas oritur. Post nimias destillationes, tabes. Post lateris dolores, vitia pulmonū, post hæc, insania. Post magnos firuores corporis, nervorum rigor aut distentio. Vbi caput vulneratum est, delirium. Vbi vigilia torsit, nervorum distentio. Vbi vehementer vena supra vlcera mouentur, sanguinis profluuium erit. Suppuratio verò pluribus morbis excitatur. Nam si lōgæ febres sine dolore, sine manifestâ causa remanent, in aliquā partem id ma-

tur dolere, quamvis id purulentum est, tamen agere facile spirat, facile excreat, morbum ipsum non difficulter fert, potest ei secunda valetudo contingere. Neque inter initia terreri convenit, si protinus sputum mixtum est ruffo quodam & sanguine, dummodo statim edatur. Laterum dolores suppuratione facta, deinde intra quadragessimum diem purgata, finiuntur. Si in iocinore vomica est, & ex ea fitur pus purum & album, salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex suppurationibus vero haec tolerabiles sunt, quae in exteriorem partem feruntur & acuntur. Et ex his quae intus procedunt, haec leniores, quae contra se cutem non afficiunt, eamque & sine dolore esse, & eiusdem coloris, cuius reliquae partes sunt, simunt esse. Pus quoque quaecumque parte erumpit, si est leue, album, & unius coloris, sine ullo metu est, & quo effuso, febris protinus conquieuit, desieruntque urgere cibi fastidium, & potionis desiderium: si quando etiam suppuratio descendit in crura, sputumque eiusdem factum pro ruffo purulentum est, periculi minus est. At in tace eius qui saluus futurus est, sputum esse debet album, aequale totum, eiusdemque coloris, sine pituita, eique etiam simile esse oportet si quid in nares à capite destillat. Longe optimum est febrim omnino non esse: secundum est, tantulum esse, & neque cibum impediat, neque crebram sitim faciat. Alnus in hac valetudine ea tuta est, quae quotidie coacta, eaque convenientia his, quae assumun-

3puri iu-
licatio.

à pulmone, modò à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit, dolo-rem, inflammationemq; concitat, ipsum calidius est: & si in partē suam aliquis decubuit, onera- re eam ex pungere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic depre- hendi potest: Si febris non dimittit, eaq; inter- dit leuior est, noctu increscit, multus sudor ori- tur, cupiditas tussendi est, & penè nihil in tussi excreatur, oculi caui sunt, mala rubent, vena sub lingua in albescent, in manibus sunt adunci un- guis, digiti, maximeq; summi* pallēt, in pedibus tumores sunt, spiritus difficiliter trahitur, cibi fastidius est, pustula toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor, & tussis fuit, & spiritus difficultas, vomica vel ante, vel circa vigesimum diem erumpet. Si serius ista cœperint, necesse est quidem increscant, sed quò minus cito affecerint, eò tardius soluentur. Solent etiam in gravi mor- bo pedes cum digitis unguib; q; nigrescere. Quod si non est mors consecuta, & reliquum corpus in- ualuit, pedes tamen decidunt.

Quæ notæ in quoque morbi genere, vel spem, vel pericula ostendant. CAP. VIII.

Sequitur, ut in quoque morbi genere proprias notas explicem, quæ vel spem, vel periculum ostendant. Ex vesica dolente, si purulenta urina processit, inq; ea leue & album subsedit, metum detrahit. in pulmonis morbo, si sputo ipse lena-

Deiectio
sine vlla
noxa est.

* adsint

nibus pedibusve initiū fieri, deinde à lateribus, pessimum inter hac à capite. Atque in his quoque ea maxime prosunt, quæ per deiectiones excernuntur. Ipsa autem deiectio sine vlla noxa est, quæ sine fibre est, si celeriter desinit, si cōtr.icto ventri nullus motus eius sentitur, si extremam aluum spiritus sequitur. Acrida tormina quidem periculosa non sunt, si sanguis & strigmenta descendūt, dum fitris ceteraq; accessiones huius morbi * absint, adeo ut etiam gravida mulier non solum reseruari possit, sed etiam partum reservare. Prodestq; in hoc morbo, si iam ætate aliquis processit. Contrà intestinorum lenitas facilius à teneris ætatibus depellitur, utique si fieri urina & ali cibo corpus incipit. Eadem ætas prodest & in coxæ dolore, & humerorum, & in omni resolutione nervorum. Ex quibus coxa si sine calore est, si leniter friget, quamvis magnos dolores habet, tamen & facile & mature sanatur, resolutumq; membrum, si nihilominus aliter sanari sanum potest, oris resolutio etiam, alio citâ fitur. Omnisq; deiectio lippienti prodest. At varix ortus, vel per ora venarum subita profusio sanguinis, vel tormina, insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt, vomitu atra bilis solvuntur. Et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones superimit vomitus. Mulier sanguinem vomens

fusis menſtruis liberatur. Quæ menſtruis non pur-
 gatur, ſi ſanguinem ex naribus fudit, omni peri-
 culo vacat. Quæ locis laborat, aut difficulter par-
 tum edit, ſternutamento leuatur. Aſtina quar-
 tana frè brevis eſt. Cui calor & tremor eſt, ſaluti
 delirium eſt. Lienofis bonæ tormina ſunt. Deniq;
 ipſa febris (quod maxime mirum videri poteſt)
 ſæpe præſidio eſt. Nam & præcordiorum dolores,
 ſi ſine inflammatione ſunt, ſinit, & in iocineris
 dolore ſuccurrit, & neruorum diſtentionem rigo-
 remq; (ſi poſtea cæpit) ex toto tollit, & ex diffi-
 cultate vrina morbum tenuioris inteſtiniſ oriū,
 ſi vrinam per calorem mouet, leuat. At dolores
 capitis, quibus oculorum caligo, & rubor cum
 quadam frontis pruriginè accedūt, ſanguinis pro-
 fuſione, vel fortuita, vel etiam petita ſummonen-
 tur. Si capitis ac frontis dolores ex vento, vel fri-
 gore, aut æſtu ſunt, grauedine & ſternutamentis
 finiuntur. Febrem autem ardentem (quam Græci
 * καυστική vocant) ſubitus horror exoluit. Si in καυστική
 febre aures obtuſæ ſunt, ſi ſanguis è naribus flu-
 xit, aut venter reſolutus eſt, illud malum deſinit
 ex toto. Nihil plus aduerſus ſurditatem, quàm
 bilioſa alius poteſt. Quibus in fiſtula vrina uti
 minuti* abſceſſus (quos πυμαία Græci vocant) * apicea
 eſſe cæperunt, iſs, ubi pus ea parte profluxit, ſani-
 tas redditur. Ex quibus cum pleraq; per ſe pro-
 ueniant, ſcite licet inter ea quoque, quæ ars adhi-
 bet, naturam plurimum poſſe. Contra, ſi caput ſe-
 bre

tur, reddit. Corpus id, quod minimè tenue, maximeq; lati pectoris atque setosi est, cuiusq; cartilago exigua, & carnosae est. Super tabem si mulieri quoq; suppressa menstrua fuerunt, & circa pectus atq; scapulas dolor mansit, subitoq; sanguis erumpit, leuari morbus solet. Nam & tussis minuitur, & sitis atq; febricula desinunt. Sed iisdem frè, nisi redit sanguis, vomica erumpit, quae quo cruentior, eo melior est. Aqua autem inter cutem minime terribilis est, qua nullo antecedente morbo caput, deinde quae longo morbo superuenit. Utique si firma viscera sunt, si spiritus facilis, si nullus dolor, si sine calore corpus est, aequaliterq; in extremis partibus macrum est, si venter mollis, si nulla tussis, nulla sitis, si lingua ne per somnum quidem inarescit, si cibi cupiditas est, si venter medicamentis mouetur, si per se excernit mollia, & figurata, si extenuatur, si urina & vini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & morbum facile sustinet. Siquidem in quo omnia haec sunt, is ex toto tutus est: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum verò vitia, ut podagra, chiroagraq; si iuuenes tentarunt, neq; callum induxerunt, solui possunt, maximeq; torminibus leniuntur, & ex quocunque modo venter fluit. Item morbus comitialis ante pubertatem ortus, non aegre finitur, & in quo ab una parte corporis venientis accessionis sensus incipit, optimum est à manibus

Alui iudicatio.

tabe spuzum mixtum purulentum, febris assidu-
 a, quæ & cibi tempora eripit, & siti affligit, in
 corpore tenui periculum subesse testatur. Si quis
 etiâ in eo morbo diutius traxit, ubi capilli fluunt,
 ubi urina quadam arancis similia subsidentia Urina.
 ostendit, atque in his odor fædus est, maximeq;
 ubi post hac orta deiectio est, protinus moritur.
 Vtique si tempus autumnus est, quo ferè, qui cætera
 parte anni traxerunt, resolvuntur. Item pus ex-
 puiisse in hoc morbo, deinde ex toto spuerè desisse,
 mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex
 eo morbo vomica, fistulaq; oriri, quæ non facile
 sanescunt, nisi si multa signa bona valetudinis
 subsequuta sunt. Ex reliquis verò minime facile
 sanantur virgines, aut hæ mulieres, quibus su-
 per tabem menses suppressi sunt. Cui verò sa-
 no subitus dolor capitis ortus est, dein somnus op-
 pressit, sic ut stertat, neque expergiscatur, intra se-
 ptimum diem pereundum est: magis si enim alius
 cita non antecesserit. Si palpebra dormientis non
 coeunt, si album oculorum apparet. Quos tamen
 ita mors sequitur, si id malum non est febre dis-
 cussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo
 cepit, ad sanitatem raro perducitur, utique si
 contraria his quæ suprâ posita sunt subsequun-
 tur, æquè in ea quoque tussis spem tollit. Item si
 sanguis sursum, deorsumq; erupit, & aqua me-
 dium corpus implevit. Quibusdam etiam in hoc
 morbo tumores oriuntur, deinde desinunt, deinde
rursum

bre continēti dolet, neq; quicquam reddit, malum atq; mortiferum est: maximeq; id periculum est pueris à septimo anno ad quartumdecimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus nō fuit, deinde à septimo die capit, & ultra septimum mansit, periculosum est. Quantoq; magis mistos, neq; inter se diductos calores habet, tanto deterius. Et tamen nihil peius est, quàm Sincrum id edi, siue ruffum est, siue cruētum, siue album, siue glutinosum, siue pallidum, siue spumans: nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt tussis, deſtillatio, etiam (quod alias salutem habetur) sternutamentum. Periculosissimum est si hac secuta subita deiectio est. Ferè verò quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa, & asperiora esse consueverunt. Ex iocinore si pus cruentum exit, mortiferum est. At ex supurationibus hæc pessima sunt quæ intus tendunt, sic ut exteriorem quoq; cutem decolorent. Ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpunt, quæ maxima, quæq; planissima sunt. Quod si interrupta quidem vomica, vel pure extrinsecus emisso febris quieuit, aut quamvis quieverit, tamen repetit. Item si sitis est, si cibi fastidium, si ventris liquidus, si pus est lividum, & pallidum, si nihil æger excreat nisi pituitam spumantem, periculum certum est. Atque ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitant, ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores. At in

rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt, quam
 qui supra comprehensi sunt, si attenduntur, sed
 fere fiducia secunda valetudinis opprimuntur.
 Illud iure aliquis mirabitur, quomodo quadam
 simul & affligant nostra corpora, & parte aliquam
 tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem im-
 plevit, siue in magno abscessu multum puris co-
 simul id omne effudisse equè mortiferum est, ac si
 quis sani corporis vulnere factus exanguis es-
 set. Articuli verò qui sic dolent, ut super eos ex callo
 quadam tubercula, innata sint, nunquam liber-
 rantur: quæq; eorum vitia vel in senectute cop-
 runt, vel in senectutem ab adolescentia perma-
 runt, ut aliquando leniri possunt, sic nunquam
 ex toto finiuntur. Morbus quoq; comitialis post
 annum quintum & vigesimum ortus ægè cura-
 tur: multoq; ægrius is, qui post quadregesimum
 annum cepit: adeo ut in ea ætate aliquid in na-
 tura speciei, vix quicquam in medicina sit. In
 eodem morbo si simul totum corpus afficitur, neque
 antè in partibus aliquis venientis mali sensus est,
 sed homo ex improviso concidit, cuiuscunque
 ætatis est, vix sanescit. Si verò aut mens lesa
 aut nervorum facta resolutio, medicina locus non
 est. Deiectionibus quoque si febris accessit,
 inflammatio iocineris, aut precordiorum, aut
 ventris, si immodica sitis, si longius tempus
 alvus varia, si cum dolore est, etiam mortis pe-
 riculum subest, maximeq; si inter hæc tormen-
 ta

vetera esse ceperunt. Isq; morbus maximè pueros absorbet usque ad annum decimum. Cetera etates facilius sustinent. Mulier quoque gravidæ eiusmodi casu rapi potest, atque etiam si ipsa convaluit, partum tamen perdit. Quin etiam tormina ab atra bile orsa mortifera sunt, aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra alvus profluxit, aut intestinorum lenitas. Periculosior est, si frequens deiectio est. Si venter omnibus horis & cum somno, & sine hoc profluit. Si similiter noctu & interdiu. Si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum, & præter id etiam leue, & mali odoris sit: si sitis urget, si post potionem urina non redditur, quod evenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit, si os exulceratur, si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur, si venter est quasi fermentatus, pinguis atq; rugosus, si & cibi cupiditas non est. Inter quæ cum evidens mors sit, multo evidentior est, si iam longum quoque id vitium est, maximeq; si etiam in corpore senili est: si verò in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo atquato durum fieri iecur perniciosissimū est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt, deinde inuersa sunt, vel in aquam inter cutem, vel in intestinorum lenitatem vix ullæ medicinae periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris,

nisi

nisi resolutus est, inter septimum diem occidit. Mulier ex partu, si cum fibre, vehementibus etiā & assiduīs capitis doloribus premitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflammatio est in his partibus, quibus viscera continentur, frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, & in cervices ac scapulas transit, rursusq; in caput reuertitur, aut à capite ad cervices scapulasq; pervenit, perniciosus est, nisi vomitum aliquam excitavit, sic ut pus extussireretur, aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit, aut nisi in capite multa prurigo, totòve corpore pustulae ortae sunt. Aequè magnū malum est, ubi torpor atq; prurigo pervagantur, modò per totū caput, modò in parte, aut sensu alienius ibi quasi frigoris est, eaq; ad summam quoque linguam perveniunt. Et cum in iisdem abscessibus auxilium sit, eò difficilior sanitas est, quò minus saepe sub his malis illi subsequuntur. In coxa verò doloribus si vehemens torpor est, frigescitq; crux & coxa, aliusq; nisi coacta non reddit, idq; quod excernitur mucosum est, iamq; etas eius hominis quadregesimum annum excessit, is morbus erit longissimus, minimeq; annuus, neque finire poterit, nisi aut vere, aut autumno. Difficilis equi curatio est, in eadem etate, ubi humerorum dolor, vel ad manus pervenit, vel ad scapulas tendit, torporemq; & dolorem creat, neque bilis vomitu lenatur. Quacunque verò parte corporis membr

membrum aliquod resolutum est, si neque moveatur, & emacrescit, in pristinum habitum non revertitur, eoq; minus, quo vetustius id vitium est, & quo magis in corpore senili est. Omniq; resolutioni nervorum ad medicinam non idonea tempora sunt, hyems, & autumnus: aliquid sperari potest vere & astate. Isq; morbus mediocris vix sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiã dolor minus medicina pater, qui sursum procedit. Mulieri gravida, si subito mamma emacerunt, abortus periculũ est. Quae neq; peperit, neq; gravida est, si lac habet, à menstruis defecta est. Quartana aestiva brevis, autumnalis sc̃re longa est, maximeq; quae cœpit hyeme appropinquante. Si sanguis profluxit, deinde secuta est dementia cum distentione nervorum, periculum mortis est. Itemq; si medicamenti purgatum, & adhuc inanem nervorum distẽtio oppressit, aut si in magno dolore extrema partes frigent. Neq; is ad vitam redit, qui ex suspendio, spumante ore detractus est. Alvus nigra, sanguini atro similis repentina, siue cum febre, siue etiam sine hac, perniciosa est.

De morborum curationibus.

C A P. I X.

Cognitis indicijs, quae nos vel spe consolentur, vel metu terreant, ad curationes morborum transcendendum est. Ex his quaedam communes sunt, quaedam propriae. Communes, quae pluribus morbis opitulantur. Propria, quae singulis.

f Antè

*Antè de communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non agros solum, sed sanos quoq; sustinent: quædam in aduersa tantum valetudine adhibentur. Omne verò auxilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adijcit, aut euocat, aut reprimit, aut refrigerat, aut calefacit, simulq; aut durat, aut mollit. Quædam non uno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrarijs adiuuât. Demitur materia, sanguinis detracti-
one, cucurbitula, deiectione, vomitu, frictione, gestatione, omniq; exercitatione, corporis abstinen-
tia, sudore. De quibus protinus dicam.*

*De sanguinis detracti-
one per venas. CAP. X.*

*Sanguinem incisa vena mitti, nouum nõ est: sed nullum penè morbū esse, in quo non mit-
tatur, nouum est. Item mitti iunioribus, & sa-
minis vterum non gerentibus, vetus est. In put-
ris verò idem experiri, & in senioribus, & in
gravidis quoq; mulieribus, vetus non est: siqui-
dem antiqui, primam ultimamq; etatem susti-
nere non posse hoc auxilij genus indicabant, per-
suaserantq; sibi mulierem gravidam, quæ ita cu-
rata esset, abortum esse facturâ. Postea verò vsus
ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasq; po-
tiores observationes adhibendas esse, ad quas di-
rigi curantis consilium debeat. Interest enim non
quæ ætas sit, neq; quid in corpore intus geratur,
sed quæ vires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est,
aut si mulier, quæ grávida non est, parum valet,
malè*

male sanguis emittitur. Emoritur enim vis, si qua his supererat, & hoc modo crepta est. At firmus puer, & robustus senex, & gravidamulier valens, tuto curantur. Maxime tamē in his medicus imperitus falli potest, quia ferē minus roboris illis atatibus subest. Mulieriq; pregnantipost curationem quoq; viribus opus est, non tantum ad se, sed etiā ad partum sustinendū. Non quicquid aut intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est, cūm precipua in hoc ars sit, quo nō annos numeret, neq; conceptionem solam videat, sed vires aestimet, & ex eo colligat, possit nec ne superesse, quod vel puerū, vel senem, vel in una muliere duo corpora simul sustineat. Interest enim inter valens corpus, & obesum, inter tenue & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaq; illi detractionem eiusmodi sustinent, celeriusq; ea si nimium est pinguis aliquis affligitur. Ideoq; vis corporis melius ex venis, quā ex ipsa specie aestimatur. Neque enim solum hæc consideranda sunt, sed etiam morbi generes, quod sit. Vtrum superans, an deficiens materia læsit. Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel deest, vel integra est, istud alienum est. At si vel copia sui male habet, vel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, plenaq; venæ tument, sanguinis detractionē requirit. Item viscerū, morbi,

neruorumq; resolutio, & rigor, et distensio, quicquid deniq; fauces difficultate spiritus strāgulat, quicquid subito supprimit vocem, quisquis intolerabilis dolor est, & quaecunq; de causa, ruptum aliquid intus atque collisum est. Item malus corporis habitus, omnesq; acuti morbi, qui modo (ut supra dixi) non infirmitate, sed onere nocent. Fieri tamen potest, ut morbus quidem id desideret, corpus autem vix pati posse videatur. Sed si nulum tamen appareat aliud auxilium, periturusq; sit, qui laborat, nisi temeraria quoq; via fuerit adiutus in hoc statu: boni medici est ostendere, quā nulla spes sine sanguinis detractiōe sit, fateriq; quantus in hac ipsa re sit metus. Et tum demum si exigatur, sanguinem mittere. De quo dubitari in eiusmodi re non oportet. Satius est enim, anceps auxilium experiri, quā nullum. Idq; maximè fieri debet, ubi nervi resoluti sunt. Ubi subito aliquis obmutuit. Ubi angina strangulatur. Ubi prioris febris accessio penè confecit, parēmq; subsequi verisimile est, neque eandē videntur sustinere acri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est. Neq; enim semper concoctiōne res expectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decidit, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit, quamvis paulo antè sumpsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est, ne, si subjederit, corpus affligat. Idemq; etiam in alijs

alijs casibus repentinis, qui strangulabunt, dictū
 erit. At si morbi ratio patiatur, cum demū nulla
 cruditatis* suspēctiōe remanēte id fiet. I deoq; ei * susp
 rei videtur aptissimus aduersa valetudinis dies cione
 secundus aut tertius. Sed ut aliquando etiā pri-
 mo die sanguinē mittere necesse est, si nunquam
 utile post diem quartum est, cum iam spatio ipso
 materia & exhausta est, & corpus corrumpit, ut
 detractio imbecillum id facere possit, non possit
 integrum. Quod si vehemens febris urget, in ipso
 impetu eius sanguinem mittere, hominem ingu-
 lare est. Expectanda ergo remissio est, si non de-
 crescit, sed crescere desit, neq; speratur remissio,
 tunc quoq; quamuis peior, sola tamen occasio non
 omittenda est. Fere etiam ista medicina ubi ne-
 cessaria est, in biduum diuidenda est. Satius est
 enim primum lenare agrum, deinde perpurpare,
 quam simul omni vi effusa fortasse precipitare.
 Quod si in cura quoq; aqua, qua inter cutem est,
 * ita respondet, quanto magis necesse est in san- * ista
 guine respōdeat? Mitti verō is debet, si totius cor-
 poris causa sit, ex brachio: si partis alicuius, ex ea
 ipsa parte, aut certe quā proxima, quia non
 ubiq; mitti potest, sed in temporibus, in brachijs,
 iuxta talos. Neq; ignoro quosdam dicere, quā
 longissime sanguinem inde, ubi laedit, esse mit-
 tendum: sic enim auerti materia cursum: at illo
 modo in idipsum quod grauat, enocari. Sed id-
 ipsum falsum est. Proximum enim locum primo
 f 3 * exhan

exaruit **exhaurit*. Ex ulterioribus autē eatenus sanguis
 sequitur, quatenus emittitur, ubi is suppressus est,
 quia non trahitur, ne venit quidē. Videtur tamē
 usus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio
 potius sanguinem mittendum esse. Si quod in hu-
 mero vitium est, ex altero brachio: credo, quia si
 quid parum cesserit, opportuniore hae partes in-
 iuriæ sunt, quàm quæ iam malè habent. Averti-
 tur quoq; interdum sanguis, ubi alia parte pro-
 rumptus, alia emittitur. Desinit enim fluere quā
 volumus, inde obicētis quæ prohibeant, alio dato
 itinere. Mittere autē sanguinem cum sit expedi-
 tissimū, usum habenti, tū ignaro difficilimū est.
 Lunula enim est vena arterijs, his nervi. Ita si ner-
 vum scalpellus attingit, sequitur nervorū distentio,
 ea quæ hominem crudeliter consumit. At arteria
 incisa neq; coit, neq; sanescit, interdum etiam ut
 sanguis vehementer erumpat, efficit. Ipsius quoq;
 vena, si forte præcisa est, capite comprimantur,
 neq; sanguinē emittunt. At si timide scalpellus
 demittitur, summam cutem lacerat, neq; venam
 incidit. Nonnunquā etiam ea latet, neq; facile re-
 peritur. Ita multa res id difficile inscio faciunt,
 quod perito facilimum est. Incidenda ad medium
 vena est; ex qua cum sanguis erumpit, colorem
 eius, habitumq; oportet attēdere. Nam si is cras-
 sus & niger est, vitiosus est. Ideoq; utiliter effun-
 ditur, si rubet, & pellucet, integer est. Ea q; mis-
 sio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat,
 præ

protinusq; is supprimendus est. Sed id euenire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut aque niger assidue ac primo die profluat. Quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit, supprimendus est. Sēperq; antè finis faciendus est, quàm anima deficiat. Deligandumq; brachium super imposito expresso ex aqua frigida penicillo, * & postero die aduerso medio digito vena friēda, ut recēs coitus eius resoluator, iterumq; sanguinem fundat. Sine autē primo, siue secūdo die sanguis, qui crassus & niger initio fluxerat, & rubere & pellucere cōpit, satis materia detractum est, atque quod superest, sincerum est. Ideoq; protinus brachii deligandū, habēdumq; ita est, donec valens cicatricula sit, qua celerrime in vena cōfirmatur.

Valiāt : & postero die aduerso medio digito, nō autem scalpello, vena scienda.

De sanguinis detractione per cucurbitulas.

C A P. XI.

Cucurbitularum verò duo genera sunt, æneum, & corneum. Aenea altera parte patet, altera clausa est. Cornea altera parte aquē patens, altera foramen habet exiguum. In æneam linamentum ardens conijcitur, ac sic os eius corpori aptatur, imprimiturq;, donec inhaereat. Cornea per se corpori imponitur, deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superq; cera cauum id clausum est, aquē inhaerescit. Vtraq; non ex his tantum materie generibus, sed etiam ex quolibet alio rectè fit. At

f 4 si cetera

si cætera deficerent, caliculus quoq; aut pultarium
 oris compressioris, ei rei commodè aptatur. Vbi
 inhaesit, si concisa antè scalpello cutis est, sangui-
 nem extrahit: si integra est, spiritum. Ergo ubi
 materia quæ intus est lædit, illo modo: ubi infla-
 tio, hoc imponi solet. Vsus autè cucurbitula præ-
 cipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte
 aliqua vitium est, quam exhaustiri ad confirman-
 dam valetudinem satis est. Idq; ipsum testimoniū
 est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro suc-
 curritur ab ea potissimū parte, quæ iam lasa est,
 esse mittendum, quod nemo cucurbitulam diuersæ
 parti imponit, nisi cum profusionem sanguinis co-
 auertit, sed ei ipsi quæ dolet quæq; liberanda est.
 Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis lon-
 gis, * quamuis & ijs iam spatium aliquod acces-
 sit, siue corrupta materia, siue spiritu male habē-
 te. In acutis quoq; quibusdam, si & lenari corpus
 debet, & ex vena sanguinem mitti, vires non
 patiuntur. Idq; auxilium ut minus vehemens,
 ita magis tutum. Neq; unquam periculosum est,
 etiam si in medio febris impetu, etiam si in cru-
 ditate adhibetur. Ideoq; ubi sanguinē mitti opus
 est, si incisa vena, præceps periculum est, aut si in
 parte corporis etiam vitium est, huc potius con-
 fugiendum est. Cum eo tamen, ut sciamus, hic
 ut nullum periculum, ita leuius præsidium esse,
 nec posse vehementi malo, nisi aequè vehemens
 auxilium succurrere.

* alias,
 quamuis
 etiam spa-
 tium

Dietionem autem antiqui varijs medicamentis, crebroq; alui duſtione omnibus ferè morbis moliebantur, dabantq; aut nigrum veratrum aut ſiliculam, aut ſquamam aris, quam *λεπιδόχολον* Graci vocant, aut lactuca marina lac, cuius gutta pani adiecta abunde purgat, aut lac vel aſinum, vel bubulū, vel caprinum. eiq; ſalis paulum adycebant, decoquebantq; id, & ſublatis hiſ, qua coierant, quod quaſi ſerū ſupererat, bibere cogeant. Sed medicamenta ſtomachum ſerè ledunt. Ideoq; omnibus catharticis aloë miſcenda eſt. Alius ſi vehemētius fluit, aut ſapius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in aduerſa valetudine medicamentū eius rei cauſſa rectè datur, niſi ubi is morbus ſine febre eſt. Vt cum veratrum nigrum, aut atra bile vexatis, aut cum triſtitia inſanientibus, aut ijs quorum nervi parte aliqua reſoluti ſunt, datur. At ubi febres ſunt, ſatius eſt eius rei cauſſa cibos, potionesq; aſſumere, qui ſimul & alant, & ventrē molliāt. Suntq; valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio convenit. Plerumque verò alius* potionibus ducēda eſt, quod ab *Aſclepiade* quoq; ſic* temperatum, ut tamen ſervatū ſit, * vituperatum video plerūq; ſeculo noſtro prateriri. Eſt autem ea moderatio, quam is ſecutus videtur, aptiſſima: ut neq; ſape ea medicina tentetur, & tamen ſemel ſumptum vel bis non omittatur. Si caput

graue est: si oculi caligant: si morbus maioris in-
 testini est, quod Græci κῶλον nominant: si in imo
 vêtre, aut in coxa dolores sunt: si in stomachum
 quadam biliosa concurrunt, vel etiam pituita ei
 se, humorve aliquis aqua similis confert: si spiri-
 tus difficiliter redditur: si nihil per se venter ex-
 cernit, utiq; si iuxta quoq; stercus est, & intus
 remanet: aut si stercoris odorem, nihil deiciens,
 ager ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est
 quod excernitur: aut si prima inedia febrem non
 sustulit: aut si sanguinem mitti, cum opus sit,
 vires non patiuntur, tempus ve eius rei præce-
 rit: aut si malum ante morbum aliquis ^{*} potauit:
 aut si is qui saepe vel sponte, vel casu purgatus
 est, subito habet aluum suppressam. Seruanda verò
 illa sunt, ne ante diem tertium ducatur, ne vlla
 cruditate substante, ne in corpore infirmo, diuq;
 in aduersa valetudine exhausto, neve in eo, cui
 satis aluus reddit quotidie, qui ve eam liquidam
 habebit, ne in ipso accessionis impetu, quia quod
 tum insisum est, aluo continetur, regnumq; in
 caput, multo gravior periculum efficit. Prædie verò
 abstinere debet ager, ut aptus tali curationi sit.
 Eodem die ante aliquot horas aquam calidam
 bibere, ut superiores eius partes madescant, tum
^{*} deiciens aluus est, si leui medicina contenti-
 sumus, pura aqua: si paulò valentiori, malsa: si le-
 ni, ex aqua, in qua fenum Græcum, vel pisiانا,
 vel malua decocta sit. Si reprimendi caussa, ex
 verbis,

^{*} portauit

^{*} aliàs
 immit -
 tendam in
 aluum

Verbenis. Acris autem est marina aqua, vel alia sale adiecto, atq; utraq; decocta commodior est. Acrior fit adiecto vel oleo vel nitro, vel melle quoq;. Si acrior est, eo plus extrahit, sed minus facile sustinetur. Id quod infunditur, neq; frigidum esse oportet, neq; calidū, ne alterutro modo ledat. Cum infusum est, quantum fieri potest, continere se in lectulo debet ager, nec primæ cupiditati deiectionis protinus cedere. Ubi necesse est, tum demum* desiderare. Fereq; eo modo dem- *residere
pta materia superioribus partibus leuatis mar-
bum ipsum mollit. Cum verò quoties res coëgit,
desidendo aliquis se exhansit, paulisper debet
conquiescere, & ne vires deficiant, utiq; eo die
cibum assumere: qui plenior an exiguus sit dan-
dus, ex ratione eius accessumis, quæ expectabi-
tur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

De Vomitu.

CAP. XIII.

AT Vomitus, ut in secunda quoq; valetudi-
ne saepe necessarius biliosis est, sic etiam in
his morbis, quos bilis concitavit. Ergo omnibus
qui ante febres horrore & tremore vexantur,
omnibus, qui cholera laborant, omnibus etiam
cum quadam hilaritate insanientibus, & comi-
tati quoq; morbo oppressis, necessarius est. Sed si
acutus morbus est, sicut in cholera, si febris est,
ut inter horrores, asperioribus medicamentis
opus non est, sicut in deiectionibus quoq; supra
dictū est, satisq; est ea vomitus causa sumi, quæ
sanis

sanis quoq; sumenda esse proposui. At ubi longi, valentesq; morbi sine febre sunt, ut comitialis aut insania, veratro quoq; albo utendum est. Id neq; hyeme, neq; æstate recte datur, optime vere, tolerabiliter autumno. Quisquis daturus erit, id agere antè debet, ut accepturi corpus humidum sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper agere prodesse, semper sanis nocere.

De Frictione.

CAP. XIII.

DE Frictione verò & Gestatione adeo multa Asclepiades, tanquam inuentor eius posuit: quod in eo volumine quod communium auxiliorum scripsit, cum trium tantum faceret * alias, mentionem, * huius & equi & gestationis, ut vini scilicet & tet autem neque recentiores viros in his fræ aqua & dare, quæ vel repererunt, vel rectè secuti sunt gestat. & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt, autoribus suis reddere. Neque dubitari potest, quin latius quidem, & dilucidius, & quomodo frictione utendum esset, Asclepiades præceperit, nihil tamen repererit, quod non à vetustissimo autore Hippocrate paucis verbis comprehensum sit, qui dixit, Frictione si vehementius sit, durari corpus: si lenis, molliori: si multum minui: si modica, impleri. Sequitur ergo, ut utendum sit, cum aut astringendum corpus sit, quod fluens est: aut molliendum, quod induratum

induruit : aut dirigendum in eo quod copia nocet : aut alendum id, quod tenuis, & infirmum est. Quas tamen species si quis curiosius aestimet, quod iam ad medicum non pertinet, facile intelliget, omnes ex una causa pendere, qua demit. Nam & astringitur aliquod eo dempto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat : & mollietur eo detracto, quod duriciem creabat : & impletur non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem digestionem quadam relaxatam penetrat. Diversarum verò rerum in modo causa est. Inter unctiorem autem & frictionem, multum interest. Ungi enim, leuiterque pertractari corpus etiam in acutis & recentibus morbis oportet, in remissione tamen & ante cibum. Longa verò frictione uti, neque in acutis morbis, neque incrementibus conuenit, praterquam cum phreneticis somnus ea quaritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, & iam à primo impetu inclinata. Neque ignoro quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse, incrementibus morbis, non cum iam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli, quod duabus de causis necessarium est, ut & quam primum bona valetudo contingat : & ne morbus, qui remanet, iterum, quamuis leui de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus grauis esse quam

quàm fuerit : neq; ideo tamen solui, sed reliquis quibusdam inherere, quas ad motum aliquod auxilium discutit. Sed ut leuata quoque aduersa valetudine rectè frictio adhibetur, sic nunquam adhibenda est fibre increfcente. Verùm si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit, minus certè cum ea remiserit. Eodem autè modo in tutis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus modo est in partibus, aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis longos dolores, ipsius frictio leuat, non in impetu tamen doloris, & membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen sapius aliud perfricandum est, cum aliud dolet, maximeq; cum à summis, aut à medijs partibus corporis euocare materiam volumus, ideoq; extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est. Et si is per infirmus est, potest satis esse quinquagies: si robustior, potest ducenties esse faciendum. Inter utrunque deinde prout vires sunt. Quò fit, ut etiam minus saepe in muliere, quam in viro, minus saepe in puero vel sene, quam in iuvene manus dimouenda sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentiq; frictione opus est. Nam neq; totum corpus infirmari cito per partem potest, & opus est quàm plurimum materia digerì, sine id ipsam membr

membrum, siue per id aliud leuamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, breuior esse debet & lenior, ut tantummodo summam cutem emolliat, quò facilius capax ex recenti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam ægrum esse testatur, ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, ut supra pefui. Sed tunc quoq; unicum in frictione praesidium est, quæ si calorem in cutem euocauit, potest alicui medicina locum facere.

De Gestatione.

CAP. XV.

Gestatio quoque longis etiam & inclinatis morbis aptissima est, utilisq; est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt: & his quibus lenta morborum reliquæ remanent, neq; aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, vehementiq; febre, præcipueq; ardente, ad discutendam eam, gestatione dixit utendum esse. Sed id periculose fit, meliusq; quiete eiusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen experiri uolet, sic experiatur, si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordiis suberit. Et ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, siue in toto, siue in parte est, nisi tamen solis nervis dolentibus: neque unquam in recenti febre, nisi in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt & pro variis cu-



iusque, & pro opibus, ne aut imbecillam hominem nimis digerant, aut humili obsina. Gestationum leuissima est naui, vel in portu, vel in flumine: vehementior in alto mari naui, vel letica, aut scamno: acrior vehiculo. Atque hec ipsa, & intendi & leniri possunt: si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moueri: si ne id quidem est, at certè vni pedi lecti funiculus subiiciendus est, atque ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis, infirmis conueniunt. Valètiora verò his, qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his, qui grauium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent. Quod & in tabe, & in stomachi vitijs, & cum aqua cutem subijci, & interdum in morbo regio fit. Aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamuis diu manent. In quibus affertibus ea quoque genera exercitationum necessaria sunt, quæ cõprehendimus eo loco, quo quædam admodum, ãni, neque firmi homines se gererent, præcipimus.

De Abstinentia.

CAP. XVI.

Abstinentia verò duo genera sunt. Alterum ubi nihil assumit ager. Alterum, ubi non nisi quod oportet. Initia morborum, primum famem, sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi moderationem, ut neq; aliud, quàm expedit, neque eius ipsius nimium sumatur. Neq; enim conuenit

nit iuxta in mediam protinus satietatem esse. Quod si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem facit: quanto inutilius est in corpore etiam agro? Neque ulla res magis adiuvat laborantem, quam tempestiva abstinencia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt, sibiipsis modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cetera illorum arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt, quasi queratur, quid medico liceat, non quid agro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in eius quod assumitur, vel tempore vel modo, vel genere peccatur.

De sudore.

CAP. XVII.

Sudor etiam duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & harena calida, & laconici, & clibani, & quarundam naturalium sudationes, ubi è terra profusus calidus vapor adificio includitur, sicut super Baias in myrtetis habemus. Præter hæc sol quoque, & exercitatio is movetur. Utiliaq; hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isq; digerendus est. Ac nervorum quoque quadam vitia sic optime curantur. Sed cetera infirmis possunt convenire: Sol, & exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, vel initio morbi, vel etiam gravibus morbis tenentur. Cavendum autem est, ne quid horum vel in febre,

vel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. Nam modo discussis febribus initium cibi plenioris, viniq; firmiter valetudini facit: modo febrem ipsam tollit, fereq; adhibetur, ubi summam cutem relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur, Asclepiades audacius. Neque terrere autem ea res, si tempestiva est, debet: & ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est, simul atq; ea uno die non accessit, eo qui proximus est, post tempus accessionis, tuto lauari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quartove die reuertatur, quandoque non accessit, balneum tutum est. Manentibus vero adhuc febribus, si haec sunt lenta, lienesq; iam diu male habent, recte medicina ista tentatur. Cuius tamen, ne praecordia dura sint, neve ea timida, neve lingua aspera sit, neve aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, neve tum febris increpescat. At in his quidem febribus quae certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt, alterum ante horrorem, alterum febre finita. In his vero qui lentis fibrillis diu detinentur, cum aut ex toto recessit accessio, aut si id non solet certe lenita est, iamq; corpus tam integrum est, quam maxime esse in eo genere valetudinis solet: imbecillus homo iturus in balneum, vitare debet, ne ante frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum veni-
 resistere nit, paulisper residere, expeririq; non tempora

astringantur, & an sudor aliquis oriatur. Illud si
 incidit, hoc non secutum est, inutile eo die balneū
 est: perungendus est is leniter, & refrigerendus est,
 vitandumq; omnimodo frigus, & abstinencia
 utendum. At si temporibus integris, primum ibi,
 deinde alibi sudor incipit, fovendum os aqua ca-
 lida, tum in solio desidendum est: atque ibi quoq;
 videndum, num sub primo contactu aqua calida
 summa cutis inhorrescat, quod vix tamen fieri
 potest; si priora recte cesserunt. Certum id autem
 signum inutilis balnei est. Antè verò, an postea,
 quàm in aqua calidam se demittat, aliquis per-
 ungi debeat, ex ratione valetudinis suæ cogno-
 scat. Ferè tamen, nisi ubi nominatim, ut postea
 fiat, id precipietur, moto sudore leniter corpus
 perungendū, deinde in aquam calidam demittē-
 dum est. Atq; hic quoq; habenda viriū ratio est.
 Neq; committendum, ut per aëthum anima defi-
 ciat: sed maturius is aufrendus, curioseq; in ve-
 stimentis inuoluendus est, ut neq; ad eum frigus
 aspiret, & ibi quoq; antequam aliquid assumat,
 insudet. Fomenta quoq; calida sunt, milium, sal-
 herena, quodlibet eorum calefactum, & in lintēū
 cōiectum. Si minore vi opus est, etiam solum lin-
 teum. At si maiore, extincti ritiones, inuolutiq; De his ex-
 panniculis, & sic circumdati. Quinetiam calida tinctis ti-
 oleo replentur viriculi, & in vasa fistilia, ad si- nonibus
 militudinem, quas lenticulas vocant, aqua con- habes infra
 gicitur, & sal sicco linteo excipitur, demitti- lib. 3. c. 12
 turq; Lenticul

turq; in aquam bene calidam, tum super id mercurium, quod fouendum est, collocatur: in utroq; ignem ferraenta duo sunt capitulis paulo latioribus, alterumq; ex his demittitur in eum salem, & aqua super leuiter aspergitur. Vbi frigoris cœpit, ad ignem refertur, & idem in altero fit: deinde inuicem in utroque inter qua descendit fœlius & calidus succus, qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoq; utendum sit, in ipsis morborum generibus dicetur.

Qui cibi, potionēve, aut valentis, aut mediæ aut imbecillæ materiæ sint. CAP. XVIII.

Cum de his dictum sit, qua detrahendo inquant, ad ea veniendum est, qua nos alunt, id est cibum & potionem. Hæc autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundæ valetudinis communia præsidia sunt. Pertinetq; ad rem, omnium proprietates nosse: primum, ut sani sciant, quomodo his utantur: deinde ut ex æquentibus nobis morborum curationem, liceat species rerum, qua assidue necessaria erunt, subijcere. Neque necesse est subinde singulas illas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quæq; ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse. Id valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est. Item omne animal quædrupes

drupes domi natum, omnem grādem feram, quales sunt capra, ceruus, aper, onager: omnem grandem auem, quales sunt anser, & pavo, & grus. Omnes belluas marinas, ex quibus κατ' & est, quaq; his pares sunt. Item mel, & caseum. Quominus mirum est, opus pistorium, valentissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat. In media verò materia, numerari ex oleribus debere ea, quorū radices vel bulbos assumimus. Ex quadrupedibus, leporem. Aues omnes à minimis ad Phœnicopterum: item pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidè ve saliantur. Imbecillissimā verò materiā esse omne olus, & quicquid in cauliculo nascitur, qualis est cucurbita, & cucumis, & capparīs. Omnia poma, oleas, cocbleas, itemq; conchyliā. Sed quamuis hæc ita discreta sunt, tamen etiam quæ sub eadem specie sunt, magna discrimina recipiunt, aliaq; res alia vel valentior est vel infirmior. Siquidem plus alimenti est in carne, quàm in ullo alio. Firmius est triticum, quàm milium, id ipsum quàm ordeum, & ex tritico firmissima siligo, deinde simila, deinde cui nihil ademptum est (quod αὐτὸ πύρον Græci vocant) infirmior est, ex polline infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus verò valentior faba, vel lenticula, quàm pisum. Ex oleribus valentior rapa, napiq; , & omnes bulbi (in quibus cepam quoque & allium numero) quàm pastinaca, vel quæ specialiter, radicula

Cibarius panis.
Varro lib. 4. de ling. Latin. R. 2. dix, inquit.

peregrinū
vocabulū:
sic enim
antiqui
Græci, quē
nunc Ra-
phanum.

* fragilia

dicula appellatur. Item firmior brassica, & bi-
ta, & porrum, quàm lactuca, vel cucurbita, vel
asparagus. At ex fructibus surculorum valentior
res vna; ficus, nuces, palmula, quàm quæ poma
proprie nominantur. Atque ex his ipsis firmiora
quæ succosa, quàm quæ* frigida sunt. Itemq; ex
his avibus, quæ in media specie sunt, valentior es,
quæ pedibus, quàm quæ volatu magis nititur. &
ex his quæ volatu fidunt, firmiores sunt, quæ grā-
diores aves, quàm quæ minuta sunt, ut ficedula
& turdus. Atq; ea quoq; quæ in aqua degunt, le-
uiorem cibum præstant, quàm quæ natandi scien-
tiam non habent. Inter domesticas verò quadru-
pedes, levisima suilla est, gravissima bubala.
Itemq; ex feris quo maius quodque animal, eo ro-
busior ex eo cibus est. Pisciumq; eorum, qui ex me-
dia materia sunt, quibus maxime vivimus: tamē
gravissimū sunt, ex quibus salsamēta quoque fieri
possunt, qualis Lacertus est, deinde qui quam-
vis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata, cor-
mus, scarus, oculata: tum pleni post quos etiam
leviores, lupi, mulliq; & post hos omnes saxa-
tiles. Neq; verò in generibus rerum tantum-
modo discrimen est, sed etiam in ipsis, quod &
aetate fit, & membro, & solo, & cælo, & ha-
bitu. Nam quadrupes animal omne si lactans
est, minus alimentum præstat. Item quo tenerior
pullus cohortalis est. In piscibus quoque media
aetas, quæ nondum summam magnitudinem im-
plevit.

pleuit. Deinde ex eodem sue ungula, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hædove, cum petiolis totum caput aliquanto, quam cætera membra, leviora sunt, adeo ut in media materia poni possint. Ex avibus, colla ala've recte infirmis annumerantur. Quod ad solum verò pertinet, frumentum quoq; valentius est collinum, quam canipestre. Lenior piscis inter saxa editus, quam in barena: lenior in barena, quam in limo. Quò sit, ut ex stagno, vel lacu, vel flumine eadem genera graviora sint. Leniorq; qui in alto, quam qui in vado vixit. Omne etiam ferum animal domestico lenius: & quodcumq; humido cælo, quam quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quam macra, recetia, quam salsa, nova quam vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iurulenta, quam assa: magis assa, quam *frixæ. Ovum durum valentissima materia est, molle vel sorbile, imbecillissima. Cumq; panificia *elixæ omnia firmissima sint, elota tamen quadam generis frumeti, ut alica, ὄψυζα, ptisana, vel ex hisdem facta sorbitio, vel pulticula, & aqua quoque madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potionibus verò quacumq; ex frumeto facta est, itemq; lac, mulsum, de frutum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magna vetustatis, valētissimi generis est. At acetum, & id vinum, quod paucorum annorum, vel ansterum, vel lene est, in media materia est. Ideoq; infirm

infirmis nunquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est: firmitorq; ex frumento potio est, quò firmitus fuit ipsum frumentum: firmitior ex eo vino, quod bono solo, quàm quod tenui, quodq; temperato cælo, quàm quod aut nimis humido, aut nimis secco, nimiumq; aut frigido, aut calido natū est. Malsum quò plus mellis habet, defrutum quo magis incoctum est, passum quo ex sicciore uva est, eo valentius est. Aqua leuissima pluuialis est, deinde fontana, tum ex flumine, tum ex puteo, post hæc ex niue, aut glacie, grauior his ex lacu, grauissima ex palude. Facilis etiam & necessaria cognitio est naturā eius requirentibus. Nam leuis pondere apparet, & ex his quæ pondere pares sunt, eo melior quæq; est, quo celerius & calefit, & frigescit, quoq; celerius ex ea legumina percoquuntur. Ferè verò sequitur, ut quo valentior quæq; materia est, eo minus facile concoquatur, sed si concocta est, plus alat. Itaque utendum est materia genere pro viribus, modusq; omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus rebus infirmis opus est. Mediocriter firmos mediā materia optime sustinet: & robustis apta validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex leuioribus potest, magis in his, quæ valentissimæ sunt, temperare sibi debet.

Quæ natura ac Proprietas cuiusque rei sit, quæ
virescitur.

CAP.

XIX

Neque

NEquae hac sola discrimina sunt, sed etiam aliae res boni succi, aliae mali sunt, quas *ἰσχυλὰς*, vel *κακοχυλὰς* Graeci vocant. Aliae lenes aliae acres, aliae crassiores pituitam in nobis faciunt, aliae tenuiorem, aliae idoneae sunt stomacho, aliae alienae sunt. Itemq; aliae inflant, aliae ab hoc absunt, aliae calefaciunt, aliae refrigerant, aliae facile in stomacho accedunt, aliae non facile intus corrumpuntur, aliae mouent album, aliae supprimunt, aliae citant urinam, aliae tardant. Quaedam somnum mouent, quaedam sensus excitant. Qua omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud aliter, vel corpori, vel valetudini conuenit.

Quae res boni succi sint.

CAP. XX.

Boni succi sunt, triticum, siligo, alica, oryza, amyllum. Item & lenes sunt & stomacho aptae & calefaciunt, tragus, ptisana, lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aues, quae ex media materia sunt. Ex maioribus quoque haec, quas supra nominauimus. Medij inter teneros durosq; pisces, ut mullus & lupus, verna, lactuca, urtica, malua, cucumis, cucurbita, ouum sorbile, portulaca, cochlea, palmula. Ex pomis quodcumq; neq; acerbum neq; acidum est. Vinum dulce vel lene, passum, defrutum, olea quae ex his duobus in alterutro seruata sunt, vulua, rostra, *trunculiq;. In summa omnis pinguis caro, *ventriculiq; omnis glutinosa, omne iecur.

Quæ res mali succi sint.

CAP. XXI.

Mali verò succi sunt milium, panicum, ordeum, legumina, caro domestica per macra, omniq; caro salsa, omne salsamentum, garum, vetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi, bulbi, brassica, magisq; etiam cyma eius, asparagus, beta, cucumis, porrum, crucea, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, fœniculum, cumminum, anisum, lapathum, sinapi, & allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunq; acidum vel acerbū est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, pisces, quoq; saxatiles, omnesq; qui ex tenerissimo genere sunt, aut hi qui rursus nimium duri, virosiq; sunt, ut frere quæstagna, lacus, limosi ve rivi ferunt, qui ve in miriam magnitudinem excesserunt.

Quæ res lenes, quæve acres sint.

CAP. XXII.

Lenes autem sunt, sorbitiones, pultricular, laganum, amyllum, ptisana, pinguis caro, & quacunque glutinosa est. Quod si frere quidem in omni, quæ domestica sit, præcipue tamen in ungulis, trunculisq; suum, in petiolis, capitulisq; hædorum, & vitulorum, & agnorum, omnibusq; cerebellis. Item si qui proprie bulbi nominantur, lac, defrutum, passum, nuclei pinci. Acria sunt omnia nimis austera, omnia acida, omnia salsa, & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item alium, cepa, crucea, ruta, nasturtium, cucu-

Petiolis, id est, parvis pedibus: à Catone petioli, in de Re rusticæ, appellati.

mis

mis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radicula, intubus, thymum, lactuca, maximaq; olerum pars.

Quæ res crassiores, quæve tenuiorem pituitam faciant.

CAP. XXIII.

Crassiores autem pituitam faciunt, oua sorbilia, alica, oryza, amyllum, ptisana, lac, bulbi, omniaq; sive glutinosa. Extenuant eandem omnia salsa, atq; acris, & acida.

Quæ res stomacho idoneæ sint.

CAP. XXIII.

Stomacho autem aptissima sunt, quacumq; assæta sunt, etiam quæ acida sunt, quæq; contrita sale modico sunt. Item panis sine fermento, & elota alica, vel oryza, vel ptisana, omnis avis, omnis venatio, atq; utraq; vel assa, vel elixa. Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex cæteris sumitur, macrum potius, quam pingue. Ex sue ungula, rostra, aures, * vuluaq; steriles. Ex oleribus * vulua. intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, sifer. sterilesq; Ex pomis cerasium, morum, sorbum, pirum fragile, quale crustulinum, vel neuianum est. Item pira, quæ reponuntur tarentina atq; signina. Malum orbiculatum, aut scandianum, vel amerinũ, vel coroncum, vel punicum. Vux ex olla, molleum, palmula, nuclei, pinci, olea alba ex duramuria, eadem aceto intincta, vel nigra, quæ in arbore bene permaturuerunt, vel quæ in passõ, defructove seruata sunt. Vinum austerrum, licet iam asperum sit, item resinaturn. Duri ex media materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpura, cochlea:

*chlea: cibi, potionesq; vel frigida vel feruentes;
absinthium.*

Quæ res alienæ stomacho sint. CAP. XXV.

A Lienæ verò stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, omnia iurulenta, prædulcia, omnia pingua, sorbitio, panis fermentatus, itemq; vel ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices olerum, & quodcunque olus ex oleo garôve estur, mel, mulsum, defrutum, passum, lac, omnis caseus, vna recens, sicus & viridis & arida, legumina omnia quæq; inflare cõsueverunt; item thymum, nepeta, saturcia, hyssopum, nasturtium, lappathum, lapsana, iuglandes. Ex his autem intelligi potest, non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse.

Quæ inflant, aut inflammationem leuent.

CAP. XXVI.

I Nflant autem omnia ferè legumina, omnia pingua, omnia dulcia, omnia iurulenta, mulsum, atq; etiam id vinum, cui nihil adhuc etati accessit. Ex oleribus alliû, cepa, brassica, omnesq; radices, excepto sisere & pastinaca, bulbi, ficus etiam arida, sed magis virides, vna recentes, nucees omnes, exceptis nucleis pineis, lac, omnisq; caseus, quicquid deinde subcrudum aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchylijs, onis vel mollibus, vel sorbilibus, vino vetere. Feniculum
verò

verò & anethum inflationes etiam leuant.

Quæ res aut calefaciant, aut refrigerent.

CAP. XXVII.

AT calefaciunt piper, sal, caro omnis iurulenta, allium, cepa, ficus arida, salsamentum, vinum, & quo meracius est, eo magis. Refrigerat olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca. Item coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira fragilia, caro elixa, præcipueq; acetum, siue cibus ex eo, siue potlo assumitur.

Quæ res intus facile vitientur, vel minime corrumpantur.

CAP. XXVIII.

Facile autem intus corrumpuntur, panis fermentatus, & quisquis alius quàm ex tritico est, lac, mel, ideoq; * lactaria atq; omne pistoriũ * lactati opus, teneri pisces, ostrea, olera, caseus, & recens, & vetus, crassa vel tenera caro, vinum dulce, mulsum, de frutum, passum, quicquid deinde vel iurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue. At minime intus vitiantur, panis sine fermento; aues, & ea potius duriores, aurati pisces: neque solum aurata pura, aut scarus, sed etiam loligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisq; dura caro, eademq; aptior est, si macra, si salsa est, omniaq; salsamenta, cochlea, murices, purpure, vinum austerrum, vel resinatum.

Quæ res aluum moueant. CAP. XXIX.

AT aluum mouent, panis fermentatus, magisq; si cibarius vel hordeaceus est, brassica,

si suberuda est, lactuca, anethum, nasturtiū, cymum, urtica, portulaca, radícula, capparis, allium, cepa, malua, lappathū, beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, uua, omnia mitia, sius etiā arida, sed magis viridis, uua recentes, pingues, minuta aues cochlea, garum, salsamenta, ostrea, pelorides, ecchini, muscoli, & omnes fere cōchula, maximeq; ius earum, saxatiles, & omnes teneri pisces, sepiarum atrementum, si qua caro assumitur pinguis eadem, vel inrulēta, vel elixa, aues, quae natant, laetitia mel crudum, lac, * lacturia omnia, mulsum, vinū dulce, vel salsum, aqua tenera, omnia tepida, dulcia, pingua, elixa, inrulenta, salsa, diluta.

Quae res aluum astringant. CAP. XXX

Panis. **C**ontra astringunt, panis ex siligine, vel ex simila, magis si sine fermento est, magis etiā si vstus est, intenditurq; vis eius etiam si bis coquitur. Pulicula vel ex alica, vel ex panico, vel ex nilio, itemq; ex iisdem sorbitio, & magis si bac antè fricta sunt. Lenticula, cui vel beta, vel intrabus, vel ambubeia vel plantago adiecta est, maximeq; etiam, si illa antè fricta est, per se etiam intrabus, vel ex plantagine vel ambubeia fricta, munita olera, brassica his decocta, dura oua, maximeq; si assa sunt, minuta aues, merula, palumbus, maximeq; si in posca decoctus est, graues omnes aues, quae magis currunt, quam volant: lepus, caprea, tecur ex his quae seuum habent, maximeq; bubulum, ac seuum ipsum, castus, qui vehementior est

rustate fit, vel ea mutatione quam in caseo trans-
marino videmus, aut si recens est ex melle, mûl-
sove decoctus. Item mel coctum, pira immatura,
sorba, magisq; ea, quæ terminalia vocantur, mala
cydonia, & punica, olea vel alba vel permatura,
myrta, palmula, purpura, murices, vinum, resi-
natum vel asperum, item meracum, ocetum, mul-
sum quod infirbuit, item defrutum, passum, aqua
vel tepida, vel perfrigida, dura, id est ea quæ tar-
de putrescit, ideoq; pluvia potissimum, omnia
dura, macra, austera, aspera, tosta, & in eadem
carne assa potius quàm elixa.

Quæ res urinam movent. CAP. XXXI.

Vrinam autem movent, quæcunq; in horto
nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta,
anethum, ocymum, menta, hyssopum, anesum, co-
riandrum, nasturtium, cruca, saniculum. Præter
hec asparagus, capparis, nepeta, thymum, satu-
rcia, lapsana, pastinaca, magisq; agrestis, radicu-
la, siser, cepa. Ex venatione maxime lepus, vinū
tenue, piper & rotundum & longum, sinapi, ab-
simbium, nuclei pinei.

Quæ res somnum moueant aut sensus excitent.

CAP. XXXII.

Somno verò aptum est papauer, lactuca, ma-
ximèq; æstiva, cuius cauliculus iam lacte re-
pletus est, morum, porrum. Sensus excitant nepe-
ta, thymum, satursia, hyssopum, præcipueq; pule-
gium, ruta & cepa.

Quæ res corpus aut erodant aut reprimât, aut res
frigeret, aut calefaciant, aut durêt, aut emolliât.

CAP. XXXIII.

EVocare verò materiam multa admodū pos-
sunt. Sed ea quæ ex peregrinis medicamentis
maxime constant, alijsq; magis quàm quibus ra-
tione victus succurritur, opitulantur, in præsenti-
tia differam. Ponam ea vero, quæ prompta, & his
morbis (de quibus protinus dicturus sum) apertè
corpus erodunt, & sic ex eo, quod mali est, extrahunt.
Habent autem hanc facultatem semina cro-
ca, nasturtij, radicle, præcipuè tamen omnium
sinapi. Salis quoq; & sici eadem vis est. Leni-
verò simul & reprimunt & molliunt lana succi-
da* ex aceto vel vino, cui oleum adiectū est, con-
trita palmula, fursures in salsa aqua, vel aceto
decocti. At simul reprimunt, & refrigerant, her-
ba muralis, parthenium, vel perdicium appellant,
serpillum, pulegium, ocymum, herba sanguinalis,
quam Græci πορὺρον vocant, portulaca, papa-
veris folia, capreoliq; vitium, coriandri folia, hy-
scyamus, muscus, siser, apium, solanum, quicquid
σπόχρον Græci vocât, brassica folia, intubus, plan-
tago, saniculi semen, contrita pira vel mala, præ-
cipueq; cydonia, lenticula, aqua frigida, maximeq;
pluvialis, vinum, acetum, & ex horum aliquo
magis, madens vel panis, vel farina, vel spargis,
vel cinis, vel lana succida, vel etiam linteolum,
creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, resina,
accrè

* vel ace-
to vel vi-
no, quo o-
leum adi.

Herba san-
guinalis.

acerbum oleum, verbenarum contusa cum teneris caulibus folia, cuius generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hedera, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt cocta mala cydonia, malicorium, aqua calida, in qua verbenae cocta sunt, quas supra proposui, pulvis vel ex fecce vini, vel ex myrti folijs, amarae nuges. Calefacit verò ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex farris, siue hordei, siue trui, vel lolij, vel milij, vel panici, vel lenticulae vel fabae, vel lupini, vel lini, vel sèni graci, ubi ea deferebunt, calidaq; imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quam ex aqua cocta. Praeterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iuncta oleo, magisq; si vetus est, sal, nitrum, git, piper, quinquefolium, fereq; quae vehementer & reprimunt, & refrigerant. Durant quae calefaciunt & digerunt, & emolliunt. Praecipueq; ad emolliendum potest cataplasma ex lini vel sèni graci semine. His autem omnibus & simplicibus & permixtis variè medici utuntur ut magis quid quisq; persuasit sibi appareat, quam quid euidenter comperit.

LIBER III

De morborum generibus.

CAP. I.



PROVISIS omnibus, quæ pertinent ad uniuersa genera morborum, ad singulorum curationes veniam. Hos autem in duas species Græci diuiserunt, aliosq; ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Ideoq; quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdem alij inter acutos, alij inter longos retulerunt. Ex quo plura eorum genera esse manifestum est. Quidam enim breues utiq; sunt, qui cito vel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub quibus neq; sanitas in propinquo, neq; exitium est. Tertiumq; genus eorum est, qui modo acuti, modo longi sunt. Idq; non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est, sed in alijs quoq; fit. Atq; etiam præter hoc, quartum est, quod neq; acutum dici potest, quia non perimit: neq; utiq; longum, quia si occurritur, facile sanatur. Ego cum de singulis dicam, cuius quisq; generis sit, indicabo. Diuidam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, & eos qui oriuntur in partibus. Incipiam à prioribus, pauca de omnibus præfatus. In nullo quidẽ morbo minus fortuna sibi vendicare, quam
 * fortuna ars potest, utpote cum repugnant: * natura, nihil medicina proficiat. Magis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis, quam

quam in longis. Hic enim breue spatium est, intra quod si quod auxilium non profuit, ager extinguitur. Ibi & deliberationi & mutationi remedium tempus patet, adeò ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens ager sine illius vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quò vetustior est, longus autem quò recentior, eò facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet, quòd non omnibus agris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit, ut alia atq; alia summi autores, quasi sola vendicauerint, prout eniq; cesserant. Oportet itaq; ubi aliquid non respondit, non tanti putare autorem; quanti agrum, & experiri aliud atq; aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis citò mutetur, quòd nihil prodest: in longis, quos tempus ut facit, sit etiam soluit, non statim condemnatur, si quid non statim profuit. Minus verò removeatur, si quid paulum saltem inuat, quia profectus tempore expletur.

Quomodo morbi cognoscantur, & an incrementum, an consistant, an minuantur: & quæ ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.

CAP. II.

Protinus autem inter initia scire facile est, quis acutus morbus, quis longus sit: non in his solis in quibus semper ita se habet, sed in his quoq; in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones & dolores graves urgent,

acutus morbus est. Vbi lenti dolores, l nt ve fe-
 bres sunt, & spatia inter accessiones porriguntur,
 acceduntq; ea signa, qu  in priore volumine ex-
 posita sunt, longum hunc futurum esse manife-
 stum est. Videndum etiam est, morbus an incre-
 scat, an consistat, an minuat, quia quadam re-
 media incrementibus morbis, plura inclinantibus
 conueniunt. Ea q; qu  decrecentibus apta sunt,
 ubi acutus imrescens urget, in remissionibus po-
 tius experienda sunt. Incrementum autem morbus,
 dum grauiore dolores accessionesq; veniunt, haq;
 & ant  qu  proxima reuertuntur, & postea
 desinunt. Atq; in longis quoq; morbis etiam tales
 notas non habentibus, scire licet incrementum, si so-
 mnus incertus est, si deterior concoctio, si f diore
 deiectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si
 percurrit corpus frigus aut calor, si idem magis
 pallet. Ea ver  qu  contraria his sunt, dec-
 dentis eius nota sunt. Pr ter hac in acutis morbis
 serius ager alendus est, nec nisi iam inclinatis, et
 prim  dempta materia impetum frangat. In lon-
 gi maturius, ut sustinere spatium* affecturi ma-
 li possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed
 in parte est, magis tamen ad rem pertinet vim
 totius corporis molliri, qu  propria partes ag-
 sanentur. Multum etiam interest, ab initio quis
 recte curatus sit, an perperam, quia curatio minus
 bis prodest, in quibus assidue frustra fuit. Si
 quis temere habitus, adhuc integris viribus vi-
 uit,

uit, admota curatione momento restituitur. Sed cum ab his caperim, quæ notas quasdam futura aduersæ valetudinis exhibent, curationum quoque principium ab animaduersione eiusdem temporis faciam. Igitur si quid ex his quæ proposita sunt, incidit, omnium optima sunt, quies, & abstinencia. Si quid bibendum, aqua. Idq; interdum uno die fieri satis est. Interdum, si terrentia manent, biduo. proximeq; abstinentiam sumendus est cibus exiguus, bibenda aqua, postera die etiam vinum, deinde inuicem alternis diebus, modò aqua, modò vinum, donec omnis causa metus finiatur. Per hac enim sæpe instans grauis morbus discutitur. Plurimiq; falluntur, dum se primo die protinus sublaturus languorem, aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut vomitu, aut sudationibus, aut vino sperant. Non quo non interdum id incidat, aut non decipiat, sed quò sapius fallat, solaq; abstinentia sine ullo periculo medeatur. Cum præsertim etiam modo terroris moderari liceat, & si leuiora indicia fuerint, satis sit à vino tantum abstinere: quod subtractum, plus quam si cibo aliquid dematur, adiuvat: si paulo grauiora, facile sit, non aquam tantum bibere, sed etiam cibo carnem subtrahere. Interdum panis quoq; minus quàm pro consuetudine assumere, humidoq; cibo esse contentum, & olerè potissimum. Satisq; sit tum ex toto à cibo, à vino, ab omni motu corporis abstinere, cum vehe-

mentes nota terruerunt. Neque dubium est quin vix quisquam, qui non dissimulauit, sed per hæc mature morbo occurrit, agrotet.

De Febrilium generibus.

C A P. III.

ATq; hæc quidem sanis faciendæ sunt, tantum causam metuentibus. sequitur verò curatio febriliū, quod & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus est. Ex his una quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Intet- dum etiam longiore circuitu quædam redeunt, sed id raro euenit. In prioribus & morbi sunt, & medicina. At quartana quidē simpliciores sunt. Incipiunt frè ab horrore, deinde calor erumpit; finitaq; febre biduum integrum est, ita quarto die reuertitur. Tertianariū verò duo genera sunt. Alterum eodem modo quo quartana & inci- piens & desinens, illo tantum interposito discri- mine; quod unum diem præstat integrum, tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem die reuertitur, ex octo autem & qua- draginta horis, frè sex & triginta per acci- sionem occupat, interdū etiam vel minus vel plus, neq; ex toto in remissione desistit, sed tantum le- nius est. Id genus pleriq; medici hemitritæon ap- pellant. Quotidiana verò varia sunt, & multi- plices. Alia enim protinus à calore incipiunt, alia

Frigus. à frigore, alia ab horrore. Frigus voco, ubi extre-
mitates partes membrorum inalgescunt: horrore, ubi
totum

totum corpus intremis. Rursus alia sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas: alia sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quadam reliquia remaneant, donec altera accessio accedat, ac saepe alia vix quicquam, aut nihil remittat, sed ita ut continuent. Deinde alia feruorem ingentem habent, alia tolerabilem, alia quotidie pares sunt, alia impares, atque inuicem altero die leniores, altero vehementiores, alia tempore eodem postridie reuertuntur, alia vel serius vel celerius, alia diem noctemq; accessionem & decessionem implent, alia minus, alia plus, alia cum decedunt sudorem mouent, alia non mouent: atq; alias per sudorem ad integritatem venit, alias corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam, modo singula singulis diebus sunt, modo binae, pluresve concurrunt. Ex quo saepe evenit, ut quotidie plures accessiones, remissionesq; sint. Sic tamen ut unaquaq; alicui priori respondeat. Interdum vero accessiones quoq; confunduntur, sic ut notari neq; tempora earum: neq; spatia possint. Neq; verum est, quod dicitur a quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. Facilior enim semper curatio foret, si hoc verum esset. Sed quod euidentes caussa faciunt, facere etiam abdita possunt. Neque de re, sed de verbo controuersiam mouet. Qui cum aliter aliterq; in eodem morbo si bres accedant, non easde inordinate

b 4 redire,

redire, sed alias, aliasq; subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiam si verè diceretur. Tempora quoq; remissionum modò liberalia, modò vix vlla sunt.

De curationū diuersis generibus. CAP. IIII.

ET febrrium quidem ratio maxime talis est. Curationū verò diuersa genera sunt, prout autores aliqui habent. Asclepiades officium esse medici dicit, ut tutò, ut celeriter, ut incundè curret. Id notum est, sed ferè periculosa esse nimium, & festinatio & voluptas solet. Qua verò moderatione utendū sit, ut quātum fieri potest omnia ista cōtingant, prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandū erit. Et ante omnia queritur, primis diebus ager qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionē moliebantur, eò quòd cruditatē maxime horrebāt: deinde eam materiam, qua ledere videbatur, ducēdo sapius aluum subtrahebant. Asclepiades medicamenta sustulit, aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. Febre verò ipsa precipuè se ad eius remediū uti professus est. Conuellendas enim vires agri putauit, luce, vigilia, siti ingēti: sic, ut ne es quidē primis, diebus elui sineret. Quo magis falluntur, qui per omnia incūdā eius disciplinam esse contendunt.* His enim vlterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuria subscripsit: primis verò tortoris vicē exhibuit. Ego autem medica-
mento

* Et is
nim

mentorum dari portiones, & alium duci non nisi
 raro debere, concedo. Et id non ideo tamen agen-
 dum, ut agri vires conuellantur, existimo: quoniã
 ex imbecillitate summum periculum est. Minui
 ergo tantam materiã superantem oportet, quæ
 naturaliter * digeritur, ubi nihil noui accedit. * detra-
 Itaq; abstinendus à cibo primis diebus est, in luce hatur
 habendus ager, nisi infirmus interdum est, quoniã
 corpus ista quoq; digerit, isq; cubare quàm maxi-
 mo cõclauì debet. Quod ad sitim verò somnumq;
 pertinet, moderandum est, ut interdum vigilet: no-
 ctu, si potest, conquiescat: ac neq; potet, neque ni-
 mium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi
 & siccum est, & ipsi sœtet, quamuis id tempus
 aptum potioni non sit. Commodeq; Erasistratus
 dixit, sepe inferiore parte humorem non requiren-
 te, os & fauces requirere, neq; ad rem male habe-
 ri agrũ pertinere. Ac primò quidem sic tenendus
 est. Optimum verò medicamentum est, opportunè
 cibus datus, qui quãdo primũ dari debeat, qua-
 ritur. Pleriq; ex antiquis tarde dabãt, sepe quin-
 to die, sepe sexto, & id fortasse vel in Asia, vel
 in Aegypto cœli ratio patitur. Asclepiades ubi
 agrũ triduo per omnia fatigarat, quarto die cibo
 destinabat. At Themison nuper, non quãdo ex-
 pisset febris, sed quando desisset, aut certè lenata
 esset, considerabat, & ab illo tempore expectato
 die tertio, si non accesserat febris, statim: si acces-
 serat, ubi ea vel desierat, vel si assidue inhere-
 bat,

bat, si certè se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum utiq; perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto, potest post unam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale cælum, qua ætas, quod tēpus anni. Minimeq; in rebus multum inter se differentibus, quod intermittendū non est, perpetuum esse præceptum temporis potest. In morbo qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est, itemq; eo cælo, quo magis digerit. Ob quam causam in Africa, nullo die ager abstinere recte videtur. Maturius etiā puero, quàm iuueni, æstate, quàm hyeme dari debet. Vnū illud & semper & ubiq; seruandum est, ut agri vires subinde assidens medicus inspiciat, & quamdiu supererunt, abstinencia pugnet: si imbecillitatem vereri ceperit, cibo subueniat. Id enim eius officium est, ut agrum neq; supernacua materia oneret, neq; imbecillitatem* fume perdat. Idq; apud Erasistratum quoq; inuenio, qui quamuis parum docuit, quādo venter, quando corpus ipsum exinaniretur, dicēdo tamē hac esse visenda, & tum cibum dandum, cum corpori deberetur: satis ostendit, dum vires supercessent, dari non oportere: ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest ab uno medico multos non posse curari, cumq; (si artifex est) idoneū esse, qui nō multum

* fami
prodac

ab agro recidit. Sed qui quasi serviunt, quoniam
 is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea
 precepta, quae sedulitatem non exigunt, ut in hac
 ipsa re. Facile est enim dies, vel accessiones nu-
 merare his quoque, qui agrum rari vident. ille assi-
 deat necesse est, qui quod solum opus est, visurus
 est, quando nix imbecillus futurus sit, nisi ci-
 bum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi
 dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem
 alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam an-
 tiqui potissimum impares sequebantur, eosque,
 tanquam tunc de agris indicaretur, propriis
 nominabant. Hi erant dies tertius, quintus, septi-
 mus, nonus, undecimus, quartusdecimus, unus
 & vigesimus, ita ut summa potentia septimo,
 deinde quartodecimo, deinde uni & vigesimo
 daretur. Igitur sic agros nutriebant, ut dierum im-
 parium accessiones expectarent, deinde postea
 cibum quasi levioribus accessionibus instantibus
 darent, adeo ut Hippocrates, si alio die febris de-
 sisset, recidivam timere sit solitus. Id Asclepia-
 des iure ut vanum repudians, neque in ullo die,
 quia par, imparve esset, his vel maius, vel minus
 periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies
 pares sunt, & opportunius post earum accessiones
 cibus datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo,
 dierum ratio mutatur, sitque grauior, qui remissior
 esse consueverat, atque ipse quartusdecimus par est,
 in quo esse magnam vim antiqui fatebantur. Quia
 cum

Dies impa-
res.

cum octanum primi naturā habere contenderēt, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octanum, neq; decimū, neq; duodecimum diem sumendum: quasi potentio-
 tiorem. Plus enim tribuebant nono & undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab undecimo non ad tertium decimū, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem, ei quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse gravissimum. Ita illo quoq; autore in die pari & gravior febris esse potest, & certa futuri nota. Atq; idem alio loco quartū quemq; diem, ut in utrumq; efficacissimum apprehēdit, id est, quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum, in quo & ab impari ad paris rationem transit: & ne hoc quidem propositum conservavit, cum à septimo die undecimus, nō quartus, sed quintus sit: adeo apparet quacūq; ratione ad numerum respeximus, nihil rationis sub illo quidē autore reperiri. Verū in his quidē antiquos tunc celebres admodū Pythagorici numeri sefellunt, cum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his conieclare, quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet, scire, tūm ne oporteat dari, cum iam bene venæ conquieverunt, aut etiā num in mentibus reliquis febris. Antiqui enim quā integerrimis corporibus alimentū offerebant. Asclepiades inclin

sed si octa-
 nus primi
 naturā ha-
 bet: unde-
 cimus quar-
 tus, non
 quintus e-
 rit.

inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhaerente. In quo * vanam rationem secutus est, non * unam quò non sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur altera accessio: sed quò scilicet quàm sanissimo dari debeat. Minus enim corrumpitur quod integro corporis infertur. Neq; tamen * verum est, quod Themisoni videbatur, si duabus horis integer futurus esset ager, satius esse tunc dare, ut ab integro corpore potissimum diducere-
 tur. Nam si diduci tā celeriter posset, id esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non praestet, satius esse principia cibi à decedente febre quam reliquias ab incipiente excipi, ita, si longius tempus secundum est, quàm integerrimo dandus est: si breue, etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco verò integritas est, eodem est remissio, * si qua
 maxime in febre cōtinua potest esse. At hic quoq; queritur, utrum tot hora expectanda sint, quot febrem habuerunt, an satis sit, primam partē earum prateriri, ut agris incundius insidat, quibus interdum non vacat. Tutissimū est autem, ante totius accessionis tempus praterire, quamvis ubi longa febris fuit, potest indulgeri agro maturius, dum tamen antè minime pars dimidia prateratur. Idq; non in ea sola febre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus ita seruandum est.

De febrium speciebus, & singularum curationibus: & primo, quando cibus febricitantibus dandus sit.

C A P. V.

HAS

HÆc magis per omnia genera febrium perpetua sunt, nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit, eaq; vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex æstu, aliãve simili re fuit, sic ut interior nulla causa metum fecerit, postero die cum tempus accessionis ita transyt, ut nihil monerit, cibus dari potest. At si ex alto calor venit, & gravitas vel capitis vel precordiorum secuta est, neq; apparet quid corpus confuderit, quamvis unam accessionem secuta integritas est, tamẽ quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: & ubi accessionis tempus præterit, cibus dādus est, sed exiguus, quia quartana quoq; timeri potest. Et die quarto denuum, si corpus integrum est, et cum fiducia utendum. Si verò postero, tertiove, aut quarto die secuta febris est, scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumq; quarum & certus circuitus est, & finis integer, & quia liberaliter quæta tempora sunt, expeditior ratio est: de quibus suo loco dicam. Nunc vero eas explicabo, quæ quotidie urgent. Igitur tertio quoq; die cibus agro commodissime datur, ut alter fibrem minuatur, alter viribus subueniat. Sed his dari debet, si quotidiana febris est, quæ ex toto desinat, simul atq; corpus integrũ factum est. Si quamvis non accessiones, febres tamẽ iunguntur, & quotidie quidẽ increſcunt, sed sine integritate tamẽ revolvunt, cum corpus ita se habet, ut maior remissio non

vō expectetur. Si altero die gravior, altero lenior
 accessio est, post graviorē. Ferè verò graviorē ac-
 cessionē lenior nox sequitur: quò fit, ut graviorē
 accessionē nox quoq; tristior antecedit. At si cō-
 tinuatur febris, neq; lenior unquā fit, & dari ci-
 bum necesse est, quādo dari debeat, magna quidē
 dissensio est. Quidā, quia ferè remissius matutinū
 tempus agris est, tunc putant dandū. Quod si re-
 spondet, non quia mane est, sed quia remissio est
 agris, dari debet. Si verò ne tunc quidem vlla re-
 quies agris est, hoc ipso peius id tempus est, quòd
 cum sua natura melius esse debeat, morbi vitio
 non est, simulq; insequitur tēpus meridianum: à
 quo cum omnis ager ferè peior fiat, timeri potest,
 ne ille magis etiā, quā ex cōsuetudine vrgeatur.
 Igitur alij vespere tali agro cibum dant. Sed cum
 eo tempore ferè pessimi sint, qui agrotant, verē-
 dum est, ne si quid tunc mouerimus, fiat aliquid
 asperius. Ob hac ad mediā noctem decurro, id est
 finito iam grauissimò tempore, eodēq; longissimē
 distante, secuturis verò antelucanis horis, quibus
 omnes ferè maximē dormiunt: deinde matutino
 tempore, quod natura sua lenissimū est. Si verò Febres
 febres vage sunt, quia verendum est, ne cibū sta- gx.
 tim subsequatur, quādo cūq; quis ex accessione
 lenatus est, * tunc debet assumere. At si plures * hum
 accessiones eodem die veniunt, considerare oportet,
 pares ne per omnia sint, (quod vix fieri po-
 test) an impares. Si per omnia pares sunt, post
eam

eam potius accessionē cibus dari debet, quæ non inter meridiem & Vesperem desinit. Si impares sunt, considerandum est, quo distent. Nam si altera granior, altera lenior est, post graviorē dari debet: si altera longior, altera breuior, post longiorem: si altera granior, altera longior est, considerandū est, utra magis affligat, illa vi, an hac tempore, & post eam dādus est. Sed planè plurimum interest, quanta, qualesq; inter eas remissiones sint. Nam si post alteram fibrē motio manet, post alteram integrum corpus est: integro corpore, cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet, sed alterum tamen longius tempus remissionis est, id potius eligendum est, adeo ut ubi accessiones continuantur, protinus inclinata priore dandus cibus sit. Etenim perpetuum est, ad quod omne cōsiliūm dirigi potest, cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere, & hoc saluo, dare quàm integerrimo corpori. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones servabitur. Sed cum sit aptissimum tercio quoq; die cibum dare, tamen si corpus infirmum est, quotidie dādus est: multoq; magis si continentes febres sunt remissione sunt, quanto magis corpus affligunt, aut si dua pluresve accessiones eodem die veniunt. Quæ res efficit, ut & à primo die protinus cibus dari quotidie debeat, si protinus venia conciderint: & sapius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud

tamen in his seruandum est, ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum vero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur, scire licet, optimum cibo tempus esse fibre finita: deinde cum decessio eius consistit: tertium si necesse est, quandocumque decedit, cetera omnia periculosa esse. Si tamē propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistente iā incremento febris aliquid offerre, quā inrescente. Satius esse instāte, quā incipiente: cum eo tamen, ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque Hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem, seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam mali affectus interueniunt. Cum vero semper agros securos agere conueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent, tum precipuē, ubi cibum sumpserunt. atque si qua sunt, quae exspectatura eorum animos sunt, optimum est, * ea dum agro- * ea dum agrotant eorum notitia subtrahere. Si id fieri non potest, sustinere tamen post cibum usque somni tempus, & cum experrecti sunt, tum exponere. agrotantium titia

Quando potiones febricitantibus dari expediat.

CAP. VI.

SED de cibo facilius quidem cum agris ratio est, quorum saepe stomachus humi respuit, etiam si mens concupiscit. De potione vero in-

gens

gens pugna est, eoq; magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit, & tum maxime aquam exigit, cū illa periculosissima est. Sed docēdus ager est, ubi febris conquieverit, protinus sitim quoq; quieturam, longioremq; accessionem fore, si quod ei datū fuerit alimentum. Ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necessè est tamen quāto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinēt, tanto magis agris in potione, quā in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet, nisi subito sic venæ conciderunt, ut cibus quoq; dari debeat. Secundo verò, ceterisq; etiam, quibus cibus nō dabitur, tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heracleide Tarētino dictum ratione caret, ubi aut bilis agrū, aut cruditas male habet expedire quoque per medicas potiones misceri nouam materiam corrupta. Illud videndum est, ut qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoque: ubi sine illo datur, deligatur, aut eum ærum dormire cupimus. Quod fere sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus, nimius humor alienus sit, tū præcipuè esse faminis, quæ ex partu in febres insederunt. Sed cū tempora cibo portioniq; febris & remissionis ratio det, non est expeditissimum scire quando ager febricitet, quādo melior sit, quādo deficiat. Sine quibus dispensari illa nō possunt. Venis enim maxime credimus salutissima rei, quia sæpe ista leniores, celerioresve sunt,

sunt, & etate & sexu, & corporum natura. Et
 plerunq; satis sano corpore, si stomachus infirmus
 est, nonnunquam etiam incipiente febre subeunt
 & quiescunt, ut imbecillus is videri possit, cui fa-
 cile laturo gravis instat accessio. Contrà saepe eas
 concitat, & resoluit, sol & balneum, & exercita-
 tio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affe-
 ctus, adeo, ut cum primum medicus venit, solici-
 tudo acri dubitantis quomodo ille se habere vi-
 deatur, eas moueat. Ob quam causam periti me-
 dici est, non protinus ut venit apprehendere manu Officium
 brachium, sed primum residere hilari vultu, per- medici.
 cunctariq; quemadmodum se habeat, & si quis
 eius metus est, eum probabili sermone lenire, tum
 deinde eius corpori manum adinouere. Quas venas
 autem conspectus medici mouet, quàm facile mille
 res turbant. Altera res est, cui credimus calor,
 aque fallax. Nam hic quoq; excitatur aestu, labo-
 re, somno, metu, sollicitudine. Igitur intueri quide
 etiam ista oportet. Sed his non omnia credere, ac
 protinus quidem scire non febricitare eum, cuius
 vena naturaliter ordinata sunt, teporq; talis est,
 qualis esse sanis solet. Non protinus autem sub calo-
 re motuq; febrem sese concipere, sed ita, si summa
 quoq; arida inaequaliter cutis est, si calor & in
 fronte est, & ex ^{*}imis praecordiis oritur, si spiritus ^{*} intim
 ex naribus cum firuore prorumpit, si color aut ru-
 bore, aut pallore nouo mutatus est, si oculi graues,
 & aut persicci, aut subhumidi sunt, si sudor cum
fit,

sit, inaequalis est, si vena nō aquis intervallis mo-
 nentur. Ob quam causam medicus neq; in tene-
 bris, neq; à capite agri debet residere, sed illustri
 loco adversus eū, ut omnes notas ex vultu quoq;
 cubantis perspiciat. Ubi verò febris fuit, atq; de-
 crevit, expectari oportet num tempora, partés ve
 corporis alia paulum madescant, quæ sudorē ven-
 turum esse testentur. Ac si qua nota est, tunc de-
 mum dare potui calidam aquam, cuius salubris
 effectus est, si sudorē per omnia mēbra diffundit.
 Huius autem rei caussa continere ager sub veste
 satis multa manus debet, eademq; crura, pedesq;
 contegere, quæ male pleriq; agros in ipso impetu
 febris, pessimeq; ubi ardens ea est, male habent. Si
 sudare corpus cœpit, linteū tepescere oportet, pau-
 latimq; singula membra detergere. At ubi sudor
 • omnis finitus est, aut si in nō venit, ubi quàm ma-
 xime potuit, idoneus esse cibo ager videtur, sub
 veste leniter unguendus est, tū detergendus, deinde
 ei cibus dandus. Cibus autē febricitantibus huma-
 dus est aptissimus, aut humori certe quàm proxi-
 mus. utiq; ex materia quàm lenissima, maximèq;
 sorbitio: eaq; si magna fibres fuerūt, quàm tenuis-
 sima esse debet. Atel quoq; despumatum huic rectè
 adijcitur, quo corpus magis nutriatur: sed id, si
 stomachum offendit, supernacuum est, sicut ipsa
 quoq; sorbitio. Dari verò in vicē eius potest, vel
 intrita ex aqua calida, vel alica elota, si firmus
 est stomachus: & cōpressa aluus ex aqua multa: si
 vel

vel ille languet, vel hac profluit, ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est: secundo verò aliquid adijci potest, ex eodem tamen genere materiae vel olus, vel conchylium, vel pomum. Et dum si bres quidē increſcunt, hic solus idoneus cibus est. Vbi verò aut desinunt, aut leuantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adijciendum verò aliquid ex mediis, ratione habita subinde & virium hominis & morbi. Ponēdi verò agro varij cibi (sicut Aſclepiades praecepit) tum demum sunt, ubi fastidio vrgetur, neq; satis vires sufficiunt, ut paulum ex singulis degustando famem vitet. At si neq; vis neq; cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus ager est, ne plus assumat, quàm cōcoquat. Neq; verū est, quod ab eo dicitur, facilius cōcoqui cibos varios: eduntur enim facilius, ad conuersionem autem materiae, genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores, ut neq; increſcente morbo tutum est agrū cibo impleri, sed ubi inclinata iam in melius valetudo est. Sūt aliae quoq; observationes in febribus necessariae, atq; id quoq; videndum est, quod quidam solum precipiūt, an astrictum corpus sit, an profluat: quorū alterum strāgulat quod continet, alterum digerit. Nam si astrictū est, ducenda aluus est, mouenda vrina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborū sanguinē etiā misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famē, sitim,

vigiliam, prodest. Utile est etiam inducere in balneum, prius demittere in solium, tñ ungere, iterum ad solium redire, multaq; aqua fovere inguina, interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere, uti cibo rarius & serius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximeq; oleribus, qualia sunt, lapathum, urtica, malua, vel iure etiam concharum, muscutorumve, aut locustarum, neq; danda caro, nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc ultra quam sitis coget. Poteritq; à balneo etiam pinguius aut dulcius dari vinum, poterit semel aut bis interponi Gracum salsum. Contra verò si corpus profluat, sudor coercendus, quieti adhibenda erit, tenebris, somnoq; quandocunque volet utendum, non nisi levi gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subveniendum. Nā si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decrevit, liberaliter oportet aquam tepidā potui dare, & vomere cogere, nisi aut fauces, aut praecordia, aut latus dolet, aut vetus morbus est. Si verò sudor exercet, durāda cutis est vel nitro, vel sale, quae cum oleo miscentur. At si levius id vitium est, oleo corpus unguendum est: si vehementius, rosa vel melino, vel myrteo, cui vinum austerum sit adiectum. Quisquis autem fluore ager est, cum venit in balneum, prius ungendus, deinde in solium demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoq; , quam calida aqua melius utetur. ubi

ad cibum ventum est, dari debet is valens, frigidus, siccus, simplex, qui quàm minime corrumpi possit panis tostus, caro ossa, vinum asperum, vel certè subausterum. Si venter profluit, calidum: si sudores nocent, vomitusq; sunt, frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant.

C A P.

V I I.

DEsiderat etiam propriam animadversionem in febribus pestilentia casus. In hanc minime utile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere alium. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimum est, precipueq; si cum dolore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut leuata est, vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quàm in ijs morbis, ducere in balneum opus est, vinum calidum & meracius dare, & omnia glutinosa. Inter quæ quoq; carnem generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate rapienda sunt. Quod si puer est qui laborat, neq; tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit, siti ei, utendum est, ducenda alium, vel aqua, vel ptisana cremore, tum demum is leuibus cibis nutriendus. Et ex toto, non sic pueri, ut viri curari debent. Ergo, ut in alio quoq; genere morborum, parcius in his agendum est. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere alium, non cruciare vigilia, fameve, aut nimia siti, non vino curare satis conuenit. Vomitus post febrem elicien-

dus est, deinde dandus cibus ex lenissimis, tum is
 dormiat: postero quoq; die si febris manet, absti-
 neatur. Tertio ad similem cibum redeat. Dadaq;
 opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam
 abstinentiam ciboq; opportunos, obmissis ceteris
 nutriatur. Si vero ardēs febris extorret, nulla me-
 dicamenti danda potio est, sed in ipsis accessioni-
 bus, oleo & aqua refrigerandus est, quæ miscenda
 manu sunt donec albescāt, & conclavi tenendus,
 quò multum & purum aërem trahere possit, neq;
 multis vestimentis stranguendus, sed admodum
 leuibus tantum velatus est. Possunt etiam super
 stomachū imponi folia vitis in aqua frigida tin-
 cta. Ac ne siti quidē nimia vexandus est, alendus
 maturius est, id est, à die tertio, & ante cibum ipsis-
 dem perungendus. Si pituita in stomacho coit, in-
 clinata iā accessione, vomere cogendus est, & tunc
 dandum frigidum olus, aut pomum ex his quæ
 stomacho conveniunt. Si succus manet stomachus
 protinus vel ptisana, vel alica, vel oryza cremat
 dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum
 vero in summo incremento morbus est, utiq; non
 ante diem quartum magna siti antecedente, fri-
 gida aqua copiose praestanda est, ut bibat etiam
 ultra satietatem: & cum iam venter & praeor-
 dia ultra modū repleta, satisq; refrigerata sunt,
 vomere debet. Quidā ne vomitum quidē exigat,
 sed ipsa aqua frigida tantū ad satietatē data pro
 medicamento videntur. Vbi utrumlibet factum
 est,

est, multa veste operiendus est, & collocandus ut dormiat. Fir:q; post'ongam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infr:ctum calorem plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur, idq; presentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus prater ardorem, nulli dolores, nullus prae cordiorum tumor, nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, nō ulcus, non deiectio, non profluvium alui fuit. Si quis autem in huiusmodi febre leuiter tussit, is neq; vehementi siti conflictatur, neq; bibere aquam frigidam debet, sed eo modo curandus est, quo in ceteris febribus praecipitur.

Curatio semitertianae febris, quae hemitritaeos dicitur.

C A P. VIII.

AT ubi id genus tertiana est, quod hemitritaeon Medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunq; frequentiores accessiones, decessionesq;, ut aliud morbi genus videri possit: porrigitq; febris inter horas vigintiquatuor & triginta sex, ut quod idē est, non idem esse videatur. Et magnopere necessariū est, neq; dari cibū, nisi in ea remissione, quae vera est: & ubi ea venit, protinus dari, plurimiq; sub alterutro curantis errore subito moriuntur: ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet, tum dari cibum, qui neq; incitet febre, & tamen longū eius spatium sustineat.

Curatio lentularum febrium, C A P. IX.

Nonnunquam etiam lenta febres sine ulla remissione corpus tenent, ac neq; cibo, neq; ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet. Fortasse enim curationi opportunior fiet. Sape igitur ex aqua frigida, cui oleū sit adiectum, corpus eius pertractandum est, quoniā interdum sic evenit, ut horror oriatur, & fiat initium quoddā novi motus, exq; eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiā remissio. In his frictio quoq; ex oleo & sale salubris videtur. At si diu frigus est & torpor, & inactio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cū cibo vinum bene dilutū. Intenditur enim saepe ex eo febris, & maior ortus calor, simul & priora mala tollit, & spē remissionis in ea curatione ostendit. Neq; hercules ista curatio noua est, qua nunc quidā traditos sibi egros (qui sub cautiōribus medicis traherantur) interdum contrarijs remedijs sanant. Siquidem apud antiquos quoq; ante Herophilum & Erasistratū, maximeq; post Hippocratē fuit * *ωίτη* quidā, qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis et stimētis operiebat, ut simul calorem ingentē, sitimq; excitaret. Deinde ubi paulum remiati cœperat febris aquā frigidā potui dabat: ac si mouerat, sudorē, explicuisse se agrū iudicabat, si nō mouerat, plus etiā aqua frigida ingerebat, & tum mouere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat, protinus suillā assam, & vinū homini dabat. Si non
libe

* Petro

liberauerat, decoquebat aquā sale adiecto, eamq;
 bibere cogebat, ut mouendo ventrem purgaret. Et
 intra hac omnis eius medicina erat. Ea q; nō mi-
 nus grata fuit his, quos Hippocratis successores nō
 refecerāt, quā nunc est his quos Hierophili, vel
 Erasistrati amuli, diu tractos non expedierunt.
 Neq; ideo tamen non est temeraria ista medicina,
 quia plures, si protinus à principiis excepit, inte-
 reunt. Sed cum eadem omnibus conuenire nō pos-
 sint, ferè quos ratio nō restituit, temeritas adin-
 uat. Ideoq; eiusmodi medici melius alienos agros,
 quā suos nutriūt. Sed est circūspecti quoq; homi-
 nis, & nouare interdum, & augete morbum, &
 febres accendere, quia curationem ubi id quod est
 non recipit, potest recipere id quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, & præ-
 cordiorum inflammationem, & ariditatem,
 & scabritiem linguæ.

CAP. X.

Considerandum etiam est febrēsne sola sint,
 an alia his quoque mala accedant: id est,
 num caput doleat, num lingua aspera, num præ-
 cordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, rosam
 cum aceto miscere oportet, & in id ingerere, de-
 inde habere duo pitacia, qua latitudinem frontis
 longitudinemq; aquent. Ex his inuicem alterum
 in aceto & rosa habere, alterū in fronte, aut in-
 tinentam ijsdem lanam succidam imponere. Si ace-
 tum offendit, pura rosa utendum est. Si rosa ipsa
 laedit, oleo acerbo: si ista parum inuant, teri potest
 vel

vel iris arida, vel nuces amara, vel qualibet herba ex refrigerantibus. Quorum quidlibet ex aceto impositum dolorē minuit, sed magis aliud in alio. Iuvat etiam panis cum papauere iniectus, vel cū rosa, cerussa, spumāve argenti. Olfacere quoq; vel serpillum, vel anethum non alienum est. At si in prae cordijs inflammatio & dolor est, primò superimponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint, plus eò materia concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit, tunc demum ad calida & humida veniendum est, ne ea qua remanserint, discentiant. Nota verò inflammationis sunt quatuor, rubor & tumor, cū calore & dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febrem nullā sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendū est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neq; inflammatio, neq; febris, sed tantum prae cordioru dolor est, protinus calidis & siccis fomentis vi licet. Si verò lingua sicca est, & scabra, detergenda primum penicillo est ex aqua calida. Deinde ungenda mistis inter se rosa & melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulq; succescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deteresa est, ungi rosa debet, cui cera sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem praecedat.

CAP. XI.

Solet etiā ante febres esse frigus, idq; vel molestissimum morbi genus est. Ubi id expectatur,
omni

omni potione prohibendus ager est. Hæc enim paulo antè data multum mali adijcit. Item maturius vèste multa tegendus est : admonenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fomenta, sic, ne statim vehementissimi calores incipiant sed paulatim increſcant. Perfricanda quoq; ea partes manibus unctis ex veteri oleo sunt, eiq; adijciendum aliquid ex calefacientibus. Contentiq; medici quidam una frictione etiam ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissionibus, nonnulli tres aut quatuor sorbitionis cyathos, etiamnum ultra manente febre, dant. Deinde, ea bene finita, reficiunt stomachum cibo frigido, & leni. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum cibui ſemel, & poſt fibrẽ datus prodeſt. Sed curioſe perſpiciendum eſt, ne tempus remiſſionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoq; genere valetudinis iam minui febris videtur, & ruruſus intenditur. Itaq; ei remiſſioni credendum eſt, qua etiã immoratur, & iactationem fetoremq; quendam oris (quem ἔρπ Græci vocant) minuit. Illud ſatis conuenit, ſi quotidie pares acceſſiones ſunt, quotidie paruum cibum dandum: ſi impares, poſt grauiorem cibum poſt leuiorem, aquam mulſam.

Curatio horroꝝ in febribus. CAP. XII.

Horror autem eas ſirẽ febres antecedit, quæ certum habent circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoq; tutiſſima ſunt * maximè quæ cura
tiones admittit. Nam ubi incerta tempora ſunt,
neq;

* ma
meq;

neq; alui ductio, neq; balneum, neq; virum, neq; medicamentum aliud recte datur. Incertum est enim quando febris ventura sit: ita fieri potest, ut si subito venerit, summa in eo perniciēs sit, quod auxilij causa sit inuentum. Nihilq; aliud fieri potest, quam ut primis diebus bene abſtineat ager, deinde sub decessu febris eius, qua grauiſſima est, cibum ſumat. At ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tētantur, quia facilius proponere nobis & acceſſionum & deceſſionum vices poſſumus. In his autem cum veterauerunt, utilis ſames non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est, deinde diuidenda curatio est, & antè horror, tum febris diſcutienda. Igitur cū primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidā aquam, ſubſalſam, & vomere eum cogere. Nam ſerò talis horror ab his oritur, quæ biliōſa in ſtomacho reſederunt. Item faciendū est, ſi proximo quoq; circuitu aquē ceſſit. Sæpe enim ſic diſcutitur. Iamq; quod genus febris ſit, ſcire licet. Itaq; ſub expeſtatione proxima acceſſionis, qua inſtare tertia poteſt, deducendus in balneum est, dandaq; opera est, ut per tempus horroris in ſolio ſit. Si ibi quoq; ſenſerit, nihilominus idem ſub expeſtatione acceſſionis quarta faciat, ſiquidem eo quoq; modo ſæpe id diſcutitur: ſi nec balneum quidem profuit, ante acceſſionem alliū edat, aut bibat calidam aquam cum pipere, ſiquidem ea quoque aſſumpta calorem mouent, qui horrorem

non

non admittit. Deinde eo modo, quo in frigore præceptum est, antequàm inhorrescere possit, operiatur. Fomentisq; protinus validioribus totum corpus circumdare cōuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis & titionibus. Si nihilominus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur, cui aquæ ex calefacientibus aliquid sit adiectum, adhibeaturq; frictio, quantum is sustinere poterit, maximeq; in manibus & pedibus, & spiritum ipse contineat, neq; desistendum est etiam si horror est. Sape enim pertinacia iuuāis, malum corpus vincit. Si quid euomuit, danda aqua tepida, iterumq; vomere cogendus est, utendumq; eisdem est, donec horror finiat. Sed præter hæc, ducenda alius est, si tardius horror quiescet: siquidem id quoq; exonerato corpori prodest. Ultima quoq; post hæc auxilia sunt, gestatio & frictio. Cibis autem in eiusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem aluum præstet, caro glutinosa, vinum cum dabitur austerum.

Curatio quotidianæ febris. CAP. XIII.

Hæc ad omnes circuitus febrium pertinet: discernenda tamen singula sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidiana est, tri-duo primo magnopere abstinere oportet, tum cibis altero quoq; die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum & vinum, magisq; si bore sublato hæc superest.

Curat

Si tertiana verè, quæ ex toto intermittit, aut quartana est, medijs diebus & ambulationibus uti oportet, alijsq; exercitationibus et unctiōnibus. Quidā ex antiquioribus medicis Cleophantus, in hoc genere morborum, multo ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod quamvis plerq; eius viri præcepta secutus est Aesclepiades, recte tamen præterijt. Est enim anceps. Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit aluum duci oportere, quinto post horrorem vomitum elicere, deinde post febrem (sicut illi mos erat) adhuc calidis dare cibum, & vinum. Sexto die in lectulo detineri. Sic enim fere, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse verisimile est. Tutius tamen est ut ipso ordine utamur. Tria remedia, vomitus, alui ductiōnis, vini potus per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare, nec vinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si verò primis diebus discussus morbus non est, inciditq; in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se cōtineat, post febrem perfricetur, tum cibo assumpto bibat aquam: postero die, quo cibo vacat & ab exercitatione unctiōneq;, aquæ tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si verò imbecillitas urgebit, & post febrem vinum, & medio die paulum cibi debet assumere.

Curatio quartanæ febris.

CAP. XV.

EAdem in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tarde admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaq; desijt, eodem die, & postero tertioq; continere se debet, & aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere, biduo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem. Si quarto die cum horrore febris reuertitur, vomere, sicut antè præceptum est: deinde post febrem modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero tertioq; die abstinere, aqua tantummodo calida (si sitiet) assumpta: septimo die balneo frigus prævenire, abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si sitiet: ac tum ita* septimo die balneo frigus prævenire: si febris redierit, ducere alvum: ubi ex eo corpus conquieverit, inunctiōe vehementer perfricari, eodem modo sumere cibum, & vinum biduo proximo se abstinere, frictione servata: decimo die rursus balneum experiri: & si postea febris accessit, æquè perfricari, vinum copiosius bibere: ac si proximum est, quies tot dierum, ut abstergentia cum cæteris qua præcipiuntur, febrem tollant. Si verò nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus. Idq; agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quomodus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducenda

k

alvum

alium, deinde abstinendū vsq; in septimū diem
 dixit. Quod ut sustinere aliquis possit, tamē etiā
 febre liberatus vix refectiōni valebit. Adeo si fe-
 bris sapius accesserit, concidet. Igitur si tertio de-
 cimo die morbus remanebit, balneū neq; ante fe-
 brem, neq; post eam tentandum erit, nisi interdū
 iam horrore discusso. Horror ipse per eadem quæ
 supra præscripta sunt, expugnandus. Deinde post
 febrem oportebit ungi, & vehementer perfricari,
 cibum & validum & fortiter assumere, vino vi-
 quantum libebit, postero die cum satis quieverit,
 ambulare, exerceri, ungi, perfricari fortiter, cibū
 accipere sine vino. Tertio die abstinere. Quo die
 vero febrem expectabit, antè surgere, & exerceri:
 dariq; operam non oportet, ut in ipsam exerci-
 tationem tempus febris incurrat. Sic enim sæpe
 illa discutitur. At si in opere occupavit, tum de-
 mum se recipere. In eiusmodi valetudine medica-
 menta sunt, oleū, frictio, exercitatio, cibus, vinū.
 Si venter astrictus est, solvendus est. Sed hæc fa-
 cile validiores faciunt, si imbecillitas occupavit,
 pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem
 sustinet, adhibenda tamen frictio est: si hæc quoq;
 vehemens onerat, intra quietem, & unctiōem,
 & cibum sistendum est, dandaq; opera est, ne qua
 cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam
 quartana nemunē ingulat, sed si ex ea facta quo-
 tidiana est, in malis ager est. Quod tamen nisi
 culpa vel agri vel curantis* nonnunquam fit:
 Curat

Curatio duarum quartanarum. CAP. XVI.

A Tsi dua quartanae sunt, neq; ha, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt, aut ex toto quiescere opus est: aut si id diffuile est, leuiter ambulare, considerare diligēter inuolutis pedibus et capite. Quoties febris accessit & desyt, cibū modicum sumere & vinum: reliquo tempore nisi imbecillitas urget, abstinere. Aut si dua febres penè iunguntur, post utranq; cibum sumere. Deinde vacuo tēpore & moueri aliquid, & post uentionem cibo uti. Cū verò vetus quartana raro, nisi vere soluatur, utiq; eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudiniē impediat. Prodestq; in vetere quartana mutare subinde victus genus, à vino ad aquam, ab aqua ad vinum, à lenibus cibis ad acres, ab acris ad lenes transire, esse radicē, deinde vomere, inrēve pulli gallinacci ventrem resolvere, oleum ad frictiones adycere, calefacientia ante accessionem sorbere, vel aceti cyathos duos, vel unum synapis, cū tribus Graci vini sa'si, vel mista paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myrrham. Per hac enim similiq; corpus agitandum est: ut moueatur ex eo statu quo detinetur. Si febris quieuit, diu meminisse eius diei conuenit, eoq; vitare frigus, calorē, cruditatem, lassitudinē. Facile enim reuertitur, nisi à sano quoq; aliquandiu timetur.

Curatio quotidianæ febris, quæ ex quartana facta sit.

CAP. XVII.

k i At

AT si ex quartana quotidiana facta est, cum id vitio inciderit, per biduum abstinere oportet, frictione uti, aquam tantummodo vesperi potui dare, tertio die saepe sit, ne febris accedat, sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus: at si manet, per biduum abstinencia, quanta maxime imperari corpori potest, frictione quotidie utendum est.

De tribus insaniz generibus, & primo de eius curacione, quæ à Grecis *φρενιτις* dicitur.

CAP. XVIII.

ET fibrinum quidem ratio exposita est. Super sunt verò alij corporis affectus, qui huic superueniunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt, protinus iungam. Incipiam ab insania, primamq; huius ipsius partem aggrediar, quæ & acuta, & in febre est, Greci *φρενιτις* appellent. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione agros desipere, & loqui aliena. Quod non quidē leue est, neq; incidere potest, nisi in febre vehementi, non tamen equè pestiferum est. Nā plerumq; breue esse consuevit, leuatoq; accessionis impetu, protinus mens redit. Neq; id genus morbi remedium aliud desiderat, quàm quod in

Phrenitis. curanda febre præceptum est. Phrenitis verò tum demū est, cum continua dementia esse incipit, aut cum ager quamuis adhuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit: perfecta est, ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt.

Sunt. Siquidem ex Phreneticis alij bilares, alij tristes sunt, alij facilius continentur, & intra verba desipiunt, alij cōsurgunt, & violenter quadā manu faciunt: atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu peccant, alij etiā artes adhibent, summamq; spem sanitatis in captandis maiorū operū occasionibus præbent, sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos qui intra verba desipiunt, aut leuiter etiam manu peccāt, onerare asperioribus coercitionibus supernacuum est. Eos verò, qui violentius se gerunt, vincere conuenit, ne vel alteri vel sibi noceant. Neq; credendū est, si victus aliquis, dum leuari vinculis cupit, sanū iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur, quoniam is dolis insanientis est. Ferè verò antiqui tales agros in tenebris habebant, eò quòd eis cōtrarium esset exterreri, & ad quietē animi tenebras ipsas conferre aliquid indicabāt. At Asclepiades, tanquā tenebris ipsis terrentibus, in lumine habendos esse dixit: neutrum tamen perpetuū est. Alium enim lux, alium tenebra magis turbant, reperiunturq; in quibus nullum discrimen deprehendi vel hoc, vel illo modo possit. Optimū itaq; est utrunq; experiri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce, eum qui lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, ager si vires habet, loco lucido, si non habet, obscuro continendus est. Remedia verò adhibere, ubi maxime furor urget, supernacuum est: simul enim fibrus quoq; increscit. Itaq;

k 3 tum

tum nihil nisi continendus ager est. Ubi verò res patitur, festinanter subueniendū est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinem mitti, ac si trucidentur: rationē hanc secutus, quod neq; insania esset, nisi febre intenta: neq; sanguis, nisi in remissione eius rectē mitteretur. Sed ipse in his somnū multa frictione quæsiuit, cum & intentio febris somnum impediāt, & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaq; hoc quoq; auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo rectē sunt, aliās omittenda. Et continuata quoq; febris habet tempora, quibus etsi non remittit, non tamen crescit. Estq; hoc, ut non optimū, ^{tempus} sic tamen secundum remediū * genus. Quod si vires agri patientur, sanguis quoq; mitti debet. Nec minus deliberari potest, an alius ducēda sit, tum interposito die convenit caput ad cutem tondere, deinde aqua fovere, in qua verbenæ aliqua decoctæ sint, vel ex reprimentibus: aut prius fovere, deinde tondere & iterū fovere, ac novissime rosā caput naresq; implere, offerre etiam naribus rutā, ex aceto contritam, mouere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quæ tamen faciendæ sunt in his, quibus vires non desunt. Si verò imbecillitas est, rosā tantum caput, adiecto serpyllō, similiq; aliquo madefaciendum est. Viles etiam in quibuscunq; viribus herbae duæ sunt, Solanum & Muralis, simul ex utraq; succo expresso caput impleatur, cum se febris remiserit, frictione utend

utendum est, parcius tamen in his, qui nimis hilares, quàm in his qui nimis tristes sunt. Aduersus omnium autem sic insanientium animos, gerere se pro cuiusq; natura necessarium est. Quorundam enim vani metus lenandi sunt, sicut in homine praediuite famem timente * accidit, cui subinde falsa hereditates nuntiabantur. Quorundam audacia coercenda est, sicut in his fit, in quibus continendis plaga quoq; adhibentur. Quorundam etiam intempestiuus risus & obiurgatione & minis prohibendus est. Quorundam discutienda tristes cogitationes, ad quod Symphonia, & cymbala, strepitusq; prosuunt. Sapius tamen assentiendum, quam repugnandum est, paulatimq; & non euidenter ab his, quae stultè dicuntur, ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiam elicienda ipsius intentio, ut fit in hominibus studiosis literarum, quibus liber legitur, aut rectè, si delectantur, aut perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando enim, conuertere animum incipiunt. Quinetià recitare, si quae meminèrunt, cogendi sunt. Ad cibum quoq; quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt. Omnibus verò sic affectis, somnus & difficilis, & praecipue necessarius est. Sub hoc enim pleriq; sanescunt. Prodest ad id, atq; etiam ad mentem ipsam componendam, crocinum vnguetum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilât hi, quidam somnũ molliuntur, potui

dando aquam, in qua papauer, aut hyoscyamos decocta sit: alij mandragora mala puluino subijciunt, alij vel amomū, vel lycamini lacrymā fronti inducūt. Hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum Graci morum lycaminum appellant, mori nulla lacryma est. Sic verò significatur lacryma arboris in Aegypto nascentis, quam ibi morosycon appellant. Plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fonnent. Asclepiades ea supernacua esse dixit, quod compellunt in lethargum saepe* conuerterent. Precipit autem ut primo die à cibo, potione, somno abstineretur, vespere ei daretur potui aqua, tunc frictio adinoueretur lenis, ita ut ne manū quidem qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde die iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio* ex aqua, rursusq; frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut illo confitente nimia frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demū illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, qua hūc quoq; necessaria est, ne quē obdormire volumus, excitare postea non possimus. Confert etiā aliquid ad somnum* Sila- Georgius nus iuxta cadens, vel gestatio post cibum & noctu, maximeq; suspēsi lecti motus. Neq; alienum est, si neq; sanguis antè missus est, neq; mens constat, neq; somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam

*saluens
Georgius
al. Sila-
ū pro ri-
o expo-
it.

bitulam admonere. Quæ quia leuat morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoq; adhibenda. Nam neq; implendus ager est, ne insaniat, neq; ieiunio utiq; vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeq; sorbitione, potione aqua mulsa, cuius ternos cyathos bis hyeme, quater astate dedisse satis est. Alterum genus insania est, quod spatium longius recipit, quia frè sine fibre incipit, leues deinde fibrículas excitat, & consistit in tristitia, quam videtur bilis atra contrahere. In hac utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinentia, secunda per album veratrum vomitumq; purgatio, post utrumlibet adhibenda bis die frictio est. Si magis valet, frequens etiã exercitatio. In ieiunio vomitus, cibus sine vino dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet etiã ex infirmissima dari posse, dum ne ea sola quis utatur, valentissima tantummodo esse remouenda. Præter hac seruanda alius est quam tenebrima, remouendi terrores, & potius bona spes asserenda, querenda delectatio ex fibulis ludisq;, quibus maximè capi sanus assueuerat. Laudanda si qua sunt ipsius opera, & ante oculos eius ponenda. Leniter obiurganda vana tristitia. Subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ sollicitat, cur non potius letitia, quàm solitudinis causa sit. Si febris quoq; accessit, sicut alia febres curanda est,

Tertium insania genus est ex his longissimum, adeo ut vitam ipsam nō impediat, quod robusti corporis esse cōsuevit. Huius autem ipsius species duae sunt. Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, qualem insaniētem Aiacem vel Orestem poëtarum fabulae ferunt: quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes an hilares sint. In tristitia nigrum veratrū deiectionis causā, in hilaritate album, ad vomitū excitantū dari debet. Idq; si in potione non accepit, pani adijciendum est, quo facilius fallat. Nā si bene se purgauerit, ex magna parte morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum veratrum, parum profecerit, interposito tēpore iterum dari debet. Neq; ignorare oportet, leuiorem esse morbum cum visu, quā serio insanientium. Illud quoq; perpetuum in omnibus morbis, ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est, ventrē eius antè soluendum esse: ubi à superiore, comprimēdum. Si verò consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est. Cogendus est & attendere, & ediscere aliquid, & meminisse. Sic enim fiet, ut paulatim metu cogatur considerare quid faciat. Subito etiam terreri & expauescere, in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animū vehementer perturbat. Potest enim quadam fieri mutatio, cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. In-

terest

terest etiam si ipse sine causa subinde rideat, an
maestus, dimissusq; sit. Nam dementis hilaritas
terroribus his (de quibus supra dixi) melius cu-
ratur. Si nimia tristitia est, prodest levis, sed mul-
ta bis die frictio. Itē per caput aqua frigida infu-
sa, demissumq; corpus in aquā & oleū. Illa com-
munia sunt, insaniētes vehementer exerceri de-
bere: multa frictione vi, neq; pingue carnē, neq;
vinū assumere, cibis vi post purgationē ex me-
dia materia quā leuissimus. Non oportere esse
vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos aut
contemnant, aut negligant, mutare debere regio-
nes, etsi mens redit, annua peregrinatione esse ia-
tandos. Raro, sed aliquando tamen, ex metu de-
lyrium nascitur. Quod genus insaniētium specie
similiq; victus genere curandum est, praterquam
quod in hoc insania genere solo recte vinū datur.

Cardiaci morbi curatio.

CAP. XIX.

Hic morbo praeipue contrarium est id ge-
nus, quod Cardiacū à Grecis nominatur,
quamvis saepe ad eum phrenetici transseunt. Si-
quidem mens in illis labat, in hoc constat. Id au-
tē nihil aliud est, quā nimia imbecillitas cor-
poris, quod stomacho languēte, immodico sudore
digeretur. Licetq; protinus scire id esse, ubi vena-
rum exigui, imbecilliq; pulsus sunt. Sudor autē
supra consuetudinem, & modo & tempore, ex
toto thorace & cervicibus, atq; etiam capite pro-
rumpit, pedibus tantummodo & cruribus siccio-
ribus

ribus atq; frigētibus. At ubi id morbi genus est, curatio prima est, supra præcordia imponere qua reprimant cataplasmata: secundo, sudorem prohibere. Id præstat acerbum oleum vel rosa, vel melinum aut myrticum. Quorum aliquo corpus leuiter perungendum, ceratumq; ex aliquo horū tum imponendum est. Si sudor vincit, delinēdus homo est, vel gypso vel argenti spuma, vel cimo- lia creta, vel etiam subinde horum puluere respergendus. Idem præstat pulvis ex contritis ari- di myrti vel rubi folijs, aut ex austeri, & boni vini arida fece. Pluraq; similia sunt, qua si de- sunt, satis utilis est quilibet ex via pulvis inie- ctus. Super hac verò quo munus corpus insudet, leui veste debet esse contactus, loco non calido, fe- nestris patentibus, sic, ut perflatus quoq; aliquis accedat. Tertiū auxiliū est imbecillitati iacentis, vina ciboq; succurrere. Cibus non multus quidē, sed sape tamē nocte ac die dandus est, ut nutriat, neq; oneret. Is esse debet ex infimissima mate- ria, & stomacho aptus. Nisi autem necesse est, ad vinum festinare non oportet. Si verendum est ne deficiat, tum & intrita ex hoc, & hoc ipsum au- sterum quidē, sed tamen tenue meracum. Egeli- dum subinde & liberaliter dandū est adiecta po- lenta, si modo is ager parū cibi assumit. Idq; vinū esse debet, neq; nullarū virium, neq; ingentium: recteq; tota die ac nocte, vel tres heminas ager bi- bet. Si vastius corpus est, plus etiā. Si cibum non accipit,

accipit, perunctum antè perfundere aqua frigida
 conuenit, & tum dare. Quòd si stomachus reso-
 lutus parum continet, & ante cibum & post eum
 sponte vomere oportet, rursusq; post vomitum,
 cibum sumere. Si ne id quidem manserit sorbere
 vini cyathū, interpositaq; hora sumere alterum:
 si id quoq; stomachus reddiderit, totum corpus
 bulbis contritis superillinendū est. Qui ubi ina-
 ruerunt, efficiunt, ut vinum in stomacho conti-
 neatur, exq; eo toti corpori calor, venisq; vis re-
 deat. Vltimum auxiliū est, in aluum ptisana vel
 alica cremorem ex inferioribus partibus* indere, * inijce
 siquidem id quoq; vires tuctur. Neque alienum
 est, naribus quoq; aëstuantis admonere, quod re-
 ficiat, id est rosam, & vinum. Et si qua in extre-
 mis partibus frigent, vnctis & calidis manibus
 fouere. Per qua si consequi potuimus, ut & sudo-
 ris impetus minuatur, & vita prorogetur, inci-
 pit iam tempus ipsum esse presidio. Ubi in tuto
 esse videtur, verendum est tamē, ne ad eandem
 imbecillitatem citò recidat. Itaque vino tantum
 remoto, quotidie validiorem cibum debet assu-
 mere, donec satis virium corpori redeat.

De Lethargo, & eius curatione. CAP. XX,

Alter quoque morbus est, aliter phrenetico
 contrarius. In illo difficilis somnus, prom-
 pta ad omnem audaciā mens est: at in hoc mar-
 cor, & inexpugnabilis penè dormiendi necessi-
 tas, (ληθαργον Græci nominant) atq; id quoq;
 genus

genus acutū est, & nisi succurritur, celeriter iugulat. Hos agros quidam subinde excitare nituntur, ad motis his, per quæ sternutamenta euocantur, & his, quæ odore sædo mouent, qualis est pix cruda, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam galbanum intēdunt, aut pilos, aut cornu cernuum. Si id non est, quodlibet aliud. Hac enim cū comburūtur, odorem sædum mouent. Tharrias verò quidam accessione esse id malum dixit, leuāq; cū ea decessit. Itaq; eos qui subinde excitant sine usu, male habere. Interest autem in decessione expergiscatur ager, an cū febris non leuetur, aut lenata quoq; ea somnus urgeat. Nam si expergiscitur, adhibere ei ut sopito superuacuum est. Neq; enim vigilando melior sit, sed per se, si melior est, vigilat. Si verò continēs ei somnus est, utiq; excitādu est, sed his tēporibus quibus febris leuissima est, ut & excernat aliquid, & sumat. Excitat autē validissimè repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaq; perunctū oleo multo corpus tribus aut quatuor amphoris totum per caput persundendū est. Sed hoc utemur, si equalis agro spiritus erit, si mollia præcordia. Sin aliter hæc erūt, ea potiora, quæ supra comprehēsa sunt. Et quod ad somnum quidē pertinet, cōmodissima hæc ratio est. Medendi autē caus̃sa caput radendum, deinde postea fouendū est aqua, in qua laurus aut ruta decocta sit. Altero die imponendū

*lum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut
 Luri bacca, aut hedera cum rosa & aceto. Praci-
 pueq; proficit & ad excitandum hominem nari-
 bus admotum, & ad morbum ipsum depellendum
 capiti fronti ve impositum sinapi. Gestatio etiam
 in hoc morbo prodest, maximiq; opportune cibus
 datus, id est in remissione, quanta maxime inue-
 niri poterit. Aptissima autem sorbitio est, donec
 morbus decrescere incipiat: sic, ut si quotidie gra-
 vis accessio est, hac quotidie detur. Si alternis,
 post graviorē sorbitio, post leniorem, mulsa aqua.
 Vinum quoq; cum tempestino cibo datum, non
 mediocriter adjuvat. Quod si post longas febres
 eiusmodi torpor corpori accessit, cetera eadē ser-
 vanda sunt. Ante accessionem autem tribus qua-
 tuorve horis castoreum (si venter astrictus est)
 mixtum cum scamonea: si nō est, per se ipsum cum
 aqua dandum est. Si praecordia mollia sunt, cibus
 utendum est plenioribus. Si dura, in iisdem sor-
 bitionibus subsistendum, imponendumq; est pra-
 cordijs, quod simul & reprimat, & emolliat.*

*De Aqua inter cutem, hoc est Hydropico
 morbo.*

C A P. XXI.

SEd hic quidem acutus est morbus. Longus
 vero fieri potest eorum, quos aqua inter cu-
 tem male habet, nisi primis diebus discussus est;
 vñ quoniam Graeci vocāt. Atq; eius tres species sunt.
 Nam modo ventre vehementer intento, creber
 inus ex motu spiritus sonus est. Modo corpus
 in aqua

inaequale est, tumoribus aliter aliterq; per totū id
 orientibus. Modò intus in unū aqua cōtrahitur,
 & moto corpore ita mouetur, ut impetus eius
 conspici possit. Primum τυμπανίτης, secundum
 λευκοφλεγματίας vel ὑποσάπια, tertium
 ἀσκίτης Græci nominant. Cōmunis tamen omnīū
 est humoris nimia abundātia, ob quam ne vlce-
 ra quidem in his agris facile sanescunt. Sape ve-
 rò hoc malum per se incipit. Sape alteri vetustō
 morbo, maximeq; quartana superuenit. Facilius
 in seruis, quā in liberis tollitur, quia cū desi-
 deret famē, sitim, mille alia tedia, longamq; pa-
 tientia, promptius his succurritur, qui facile co-
 gūtur, quā quibus inutilis libertas est. Sed ne hi
 quidē, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare
 nō possunt, ad salutē perducuntur. Ideoq; non
 ignobilis medicus, Chrysippi discipulus, apud An-
 tigonū regem, amicum quendam eius nota intē-
 perantia, mediocriter eo morbo implicitum ne-
 gavit posse sanari. Cumq; alter medicus Epirotes
 Philippus se sanaturū polliceretur, respōdit illum
 ad morbum agri respicere, se ad animum. Neq;
 eum res fefellit. Ille enim cū summa diligentia
 nō medici tantūmodo, sed etiā regis custodiretur,
 tamē malagmata sua deuorando, bibendoq; suā
 urinā in exitium se precipitauit. Inter initia ta-
 mē non difficilima curatio est, si imperata sunt
 corpori, quies, sitis, inedia. At si malū inuetera-
 uerit, nō sine magna molestia discutitur Metro-
 dorum

dorum tamen Epicuri discipulum referunt, cum hoc morbo tentaretur, n. q; equo animo frret necessariam sitim, ubi diu abstinnerat, bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur quicquid receptum est, multum radio demit: si a stomacho retentum est, morbum auget. Ideoq; in quolibet tentandum non est. Sed si febris quoq; est, hac in primis submonenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre ager est, tum demum ad ea veniendum est, quae ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoq; quaecunq; species est, si nodum nimis occupauit, iisdem auxilijs opus est. Multum ambulandum, currendu. * aliquid quando est. Superiores maxime partes sic perfri-canda, ut spiritum ipse contineat, euocandus est sudor non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusq; alijs, maximeq; viiles naturales & sic a sudationes sunt, quales super Baias habemus in myrtetis: balneum atque omnis humor alienus est. Ieiunio recte catapotia dantur facila ex absinthij duabus, myrrha tertia parte. Cibius esse debet ex media quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat, optimaq; est, quae urinam mouet. Sed id ipsum tamen molliori cibo, quem medicamento melius est. Si tamen res coget, * ex his aliquid, quae id praestent, erit decoquendum, eaq; aqua potui dada. Videntur autem hanc facultatem habere iris, nardum, crocum,

crocum, cinamum, amomum, casta, myrrha, balsamum, galbanum, ladanum, ananthe, panace, cardamomum, hebenus, cupressi semen, oua tyminia, quàm rapidae ægyptiacæ Græci nominant: abrotanum, rose folia, acornum, amara nuxes, tragogianum, styrax, costum, iunci quadrati, & rotundi semen, illud cyperon, χοῖρον hoc Græci vocant. Quæ quoties posuero, non quæ hic nascuntur, sed quæ inter aromata afferuntur, significabo. Primum tamen quæ leuissima ex his sunt, id est rose folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque utile est & auferum, sed quàm tenuissimū. Commodum est etiam lino quotidie ventrem metiri, & quæ comprehendit aluum, notam imponere, postero die videre, si plenius corpus sit, an extenuetur. Id enim quod tenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est metiri & portionem eius & urinam. Nam si plus humoris excernitur, quàm assumitur, ita denum secunda valetudinis spes est. Asclepiades in eo, qui ex quartana in hydropa deciderat, se abstinencia bidui & frictione usum, tertio die iam & febre & aqua liberato, cibum & vinum dedisse, memoria prodit. Haftenus communiter de omni specie dici potest. Si vehementius malum est, diducenda ratio curandi est. Ergo si inflammatio & ex ea dolor creber est, utilis quotidianus aut alterno quoque die post cibum vomitus est. Fomentis succis, calidūque utendū est. Si per hac dolor non finitur, necessaria sunt sine ferro

ferro cucurbitula. Si ne per has quidē tormentum tollitur, incidenda cutis est, & tum bis utendum. Ultimum auxiliū est, si cucurbitula nihil profuerunt, per aluum infundere copiose aquam calidā, eamq; recipere. Quinetiam quotidie ter quaterve opus est vi frictione vehementi, cum oleo & quibusdā calefacientibus. Sed in hac frictione à ventre abstinendum est. Imponendum verò in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat, ferramentisq; candentibus pluribus locis venter exulcerandus est, & seruanda ulcera diutius. Utiliter etiā scilla cocta delinitur cutis, sed diu post has inflammationes abstinendum est ab omniibus instantibus. At si id vitium est, cui leuophlegmatias nomen est, eas partes qua tumēt, subycere soli oportet, sed non nimium, ne fibracula incidat: si is vehementior est, caput relandum est, utendumq; frictione mad. saltis tantum manibus aqua, cui sal & nitrum & olei paulum sit adiectum, sic ut aut pueriles, aut muliebres manus adhibeātur, quo mollior earum tactus sit. Idq; si vires patiuntur, ante meridiem tota hora, post meridiem semihora fieri oportet. Utilia etiam sunt cataplasmata, qua reprimunt, maximeq; si corpora teneriora sunt. Incidendum quoq; est super talum quatuor serē digitis ex parte interiore, qua per aliquot dies frequens humor firatur, atq; ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Conuatiendumq; multa gestatione corpus est: atq; ubi indulta vulneribus ci-

cicatrices sunt, adijciendum & exercitationibus est, & cibis, donec corpus ad pristinum habitum revertatur. Cibus valens esse debet, & lutinosus maximeq; caro. Vinum (si per stomachum licet) dulcius. Sed ita, ut invicē biduo triduove, modò aqua, modò id bibatur. Prodest etiam lactuca marina (quæ grandis iuxta mare nascitur) semen, cum aqua potui datum. Si valens est qui id accipit, ei scilla cocta (sicut supra dixi) delinitur. Antoresq; multi sunt inflatis vesicis pulsandos tumores esse. Si vero id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur, ambulare, sed magis modicè oportet, malagma quod digerat impositum habere, idq; ipsum super imposito triplici panno, friscia non nimium tamen vehementer astringere. Quod à Tharria profectum, servatum esse à pluribus video. Si iecur aut lienem affectum esse manifestum est, ficum pinguem còtusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia venter non siccatur, sed humor nihilominus abundat, celeriore via succurrere, ut is per ventrem ipsum emittatur. Neq; ignoro Erasistrato displicuisse hæc curandi viam. Morbum enim hunc iocinoris putavit. Ideoq; ita illum esse sanandū, frustra q; aquā emitti, quæ vitiatò illo subinde nascatur. Sed primū non huius visceris unius hoc vitium est. Nam splene affecto, & in totius corporis malo habitu sit: deinde, ut inde cæperit, tamen aqua nisi emittitur, quæ contra naturam ibi subsistit,

&

& iocineri & ceteris* interioribus partibus, no- *inferio
cet. Conuenitq; corpus nihilominus esse curadum. ribus
Neq; enim sanat emissus humor, sed medicina lo-
cum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne
illud quidem in controuersiam venit, quin non
omnes in hoc morbo sic curari possint, sed iuvenes
robusti, qui vel ex toto carent fibre, vel certè satis
liberales intermissiones habēt. Nam quorum sto-
machus corruptus est, quēve ex atra bile huc deci-
derunt, quiq; malum corporis habitum habent,
idonei huic curationi nō sunt. Cibus autē quo die
primum humor emissus est, supernacuus est, nisi si
vires desunt. Insequētib; diebus & his vinum
meracius quidē, sed non ita multum dari debet,
paulatimq; euocandus ager est ad exercitationes,
frictiones, solē, sudationes, nauigationes, & ido-
neos cibos, donec ex toto cōualeſcat. Balneū rarum
res amat, frequentiore in ieiunio vomitum. Si
aestas est, in mare natare cōmodū est. Vbi cōualuit
aliquis, diu tamen alienus ei veneris vsus est.

De Tabē, & eius speciebus, & curationibus.

C A P. XXII.

Dlutius saepe & periculosius Tabes eos ma-
le habet, quos inuasit. Atq; huius quoque
plures species sunt. Una est, qua corpus non ali-
tur, & naturaliter semper aliquibus decedenti-
bus, nullis verò in eorū locū subuenientibus, summa
macies oritur, & nisi occurratur, tollit. atq; p-
pīa hanc Græci vocant. Ea duabus fieri de
l 3 causis

causis incidere consuevit. Aut enim nimio timore aliquis minus, aut auaritia nimia plus quam debet, assumit : ita vel quod deest, infirmat : vel quod superat, corrumpitur. Altera species est, quam Græci *κακῆξία* appellant, ubi malus corporis habitus est, ideoq; omnia alimenta corrumpuntur. Quod ferè fit cum longo morbo vitata corpora, etiam si illo vacant, refectiōnem tamen non accipiunt, aut cum malis medicamentis corpus affectum est, aut cum diu necessaria defuerant, aut cum inusitados et inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquidve simile incidit. Huic præter talem illud quoq; nonnunquam accidere solet, ut per assiduas pustulas aut ulcera summa cutis exasperetur, vel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, longeq; periculosissima species, quam Græci *φθίσις* nominauerunt. Oritur ferè à capite, inde in pulmonem destillat: huic exulceratio accedit, ex hac febricula levis fit, quæ etiam cum quieuit, tamē & repetit. Frequens tussis est, tus excreatur, interdū cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est, mali odoris est. Itaq; qui de morbo dubitant, hac nota utuntur. Cum hac genera tabis sint, animaduvertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. Deinde, si tantummodo non ali corpus apparet, causam eius attendere : & si cibi minus aliquis quam debet, assumit, adycere, sed paulatim, ne si corpus insuetū, subita multitudine onerauerit, concoctionem impediat. Si vero

plus

plus iusto quis assumere, solitus est, abstinere uno die, deinde ab exiguo cibo incipere, quotidie ady- cere, donec ad iustum modū perveniat. Præter hæc convenit ambulare locis quàm minime frigidis, sole vitato, per manus quoq; exerceri. Si infir- mior est, gestari, vngi, perfricari, si potest, maximè per seipsum, sæpius eodem die, & ante cibum & post eum sic, ut interdum oleo quadam ady- cian- tur calefacientia, donec insudet. Prodestq; ieiunio prehẽdere per multas partes cutem, & attrahere, ut relaxetur, aut imposita resina & abducta sub- inde idem facere. Utile est etiam interdum bal- neum, sed post cibum exiguum. Atq; in ipso solio recte cibi aliquid assumitur, aut si sine hoc frietio fuit, post eam protinus. Cibi vero esse debent ex his, qui facile concoquuntur, qui maxime alunt. Ergo vini quoq; sed austeri necessarius usus est, movenda urina. At si malus corporis habitus est, primū abstinendum est, deinde alvus ducenda, tū paulatim cibi dandi, adiectis exercitationibus, unctiõibus, frictiõibus. Utilius his frequẽs bal- neum est, sed ieiunis etiam usq; ad sudorem. Cibus vero opus est copiosis, varijs, boni succi, quiq; etiā minus facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est, sed pau- latim quotidieq; pluribus diebus, cū eo, ut cætera quoq; eodẽ modo serventur. Quod si mali plus est, & vera phthisis est, inter initia protinus occurre- re necessarium est. Neq; enim facile is morbus cum

inueterauerit, euincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, cæli mutatione, sic, ut densius quàm id est, ex quo discedit ager, petatur. ideoq; aptissimè Alexandriam ex Italia itur. Ferèq; id posse inter principia corpus pati debet, cū hic morbus etate firmissima maximè oriatur, id est ab anno duodecimo ad annum quintū & trigésimum. Si id imbecillitas non sinit, naue tamen non longe gestari commodissimum est. Si navigationem aliqua res prohibet, lætica, vel alio modo corpus dimouendum est, tum à negotijs abstinendum est, omnibusq; rebus, qua sollicitare animum possunt, somno indulgendum, cauēda destillationes, ne si quid cura lenaret, exasperent, & ob id vitanda cruditas, simulq; sol & frigus. Os obtegendum, fauces velanda, tussicula suis remedijs finienda, & quàm diu quidē febricula incurSAT, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuus cibus medendū. Eoq; tēpore bibenda aqua. Lac quoq; , quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sitis, siue præcordia tument, siue biliosa urina est, siue sanguis fluxit, pro veneno est, in phthysi tamen, sicut in omnibus longis difficilibusq; febribus, recte dari potest. Quod si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit, recurrēdum est ad modicas exercitationes, maximèq; ambulationes, itē lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer, ut allium, porrum, idq; ipsum ex aceto, vel

ex eodem intubus, ocymum, lactuca. Dein lenis, ut sorbitio ex ptisana, vel ex alica, vel ex amylo, lacte adiecto. Idem oryza quoq; & si nihil aliud est, sibi prae stat. Tum inuicem, modo his cibus, modo illis utendum est. Adijciendaq; quadam ex media materia, praecipueq; vel ex aprugna, cerebellum, vel pisciculus, & his similia. Farina etiam cum seuo ouillo, caprinove mista, deinde incocta, pro medicamento est. Vinum assumi debet, lene austerrum. Haellenus non magna mole pugnatur. Si vehementior noxa est, ac neq; febricula neque tussis quiescit, tenuariq; corpus apparet, validioribus auxilijs opus est. Exulcerandus est ferro candenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammas utranq; item sub imis ossibus scapularum (quas ὠμοπλάται Graci vocant) sic, ne sanescere ulcera sinamus, nisi tussi finita. Cui per se quoque medendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterq; die vehementer extrema partes perfricanda, thorax leui manu pertrahendus, post cibum intermittenda hora, & perfricanda crura, brachiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est ager in solum, in quo sit aqua calida, & oleum: ceteris diebus bibenda aqua, tum & vinum: si tussis non est potui frigidum dandum: si aestas est, egelidum. Utile est etiam cibos in remissionibus quotidie dari, frictions, gestationesq; similiter adhiberi. * itemq; acria quarto aut quinto die sumere, interdum herbam sanguinalem acria

* eadem

ex aceto vel plantaginem esse. Medicamentum etiam est, vel plantaginis succus per se, vel marrubium ex melle cōcoctum, ita ut illius cyathus sorbeatur, huius cochleare pluri paulatim delingatur, vel inter se misa & incocta resina terebinthina pars similia, butyri & mellis pars altera. Precipua tamen ex his omnibus sunt victus, vehiculum, & navis, & sorbitio. Alius vita vitanda est. Vomitus in hoc morbo si frequens est, perniciosus est, maximeq; sanguinis. Qui melius scilicet esse capit, adicere debet exercitationes, frictiones, cibos deinde, ipse se, suppresso spiritu, perfricare, diu abstinere à vino, balneo, venere.

De Comitialis morbi curationibus. C. A. XXIII.

INter notissimos morbos est etiam is, qui Comitialis, vel maior nominatur. Homo subito concidit, ex ore spuma mouentur, deinde interposito tempore ad se redit, & per seipsum consurgit. Id genus saepius viros quam feminas occupat, ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, & vita non periculosum. Interdum tamen cum recens est, hominem consumit, & saepe cum, si remedia non sustulerunt, in pueris veneris, in puellis mēstruorum initium tollit: modo cum dislentione membrorum aut nervorum prolabitur aliquis, modo sine illa quidem. Hos quoque iisdem, quibus lethargicos excitare conentur, quod admodum superuacuum est, & quia ne lethargicus quidem his sanatur, & quis cum

cum possit isle nunquam expergisci, atq; ita fame interire, hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utiq; sanguis mitti debet. Si accessit, non utiq; mittendus est, nisi alia quoq; horrentur. Necessarium autem est ducere alvum, vel nigro veratro purgare, vel utrumq; facere, si vires patiuntur: tunc caput tondere, oleoq; & aceto perungere, cibum post die tertium, simulcum transit hora, qua concidit, dare. Neq; sorbitiones autem his, aliq; molles, & faciles cibi, neq; caro, minimeq; suilla convenit, sed media materia. Nam & viribus opus est, & cruditates cauenda sunt, cum quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaq; calefacientia: item, frigus, vinum, venerem, loci precipitis conspectum, omniumq; terrentium, vomitum, lassitudinē, sollicitudines, negotia omnia. Vbi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & inuicem alterum quēq; eadem hora cibi seruata, donec quatuordecim dies transeant. Quos ubi morb⁹ excessit, acuti vim deposuit. At si manet, curandus iam ut longus est. Quod si non quo die primum id incidit, medicus accessit, sed is qui cadere consuevit, ei traditus est, protinus eo genere victus * habito, qui supra comprehensus est, ex- * dabitur petendus est dies, quo prolabatur, utendumq; tum vel sanguinis missione, vel duetione alui, vel nigro veratro, sicut praeceptum est. Insequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui, vitatis omnib

omnibus, quæ cavenda dixi, nutriendus. Si per
 hac morbus finitus non fuerit, confugiendum erit
 ad album veratrum, ac ter quoq; aut quater eo
 utendum, non ita multis interpositis diebus: sic
 tamen, ne iterum unquam sumat, nisi conciderit.
 Medijs autem diebus vires eius erunt nutriendæ,
 quibusdam, præter ea quæ scripta sunt, adiectis.
 Ubi mane expervectus est, corpus eius leniter ex
 oleo vetere, cum capite (excepto ventre) permul-
 ceatur, tum ambulatione quàm maxime longa et
 recta viatur: post ambulationem loco tepido ve-
 hementer & diu, ac non minus ducenties, nisi in-
 firmus erit, perfricetur: deinde per caput multa
 aqua frigida perfundatur, paulum cibi assumat,
 conquiescat, rursus ante noctem ambulatione vi-
 tur, iterum vehementer perfricetur, sic ut neque
 venter, neq; caput contingatur, post hac cœnet, in-
 terpositisq; tribus aut quatuor diebus, vino aut al-
 tero acria assumat. Si ne per hac quidem fuerit li-
 beratus, caput radatur, ungatur oleo vetere, ad-
 iecto aceto & nitro, perfundatur aqua salsa, bibat
 ieiunus ex aqua castoreum, nulla aqua nisi deco-
 cta potionis causa viatur. * Quidam iugulati gla-
 diatoris calido sanguine epoto, tali morbo sese li-
 berarunt. Apud quos miserum auxilium, tolera-
 bile miserius malum fecit. Quod ad medicum ve-
 rò pertinet, ultimum est iuxta talum, ex utroque
 crure paulum sanguinis mittere, occipitium inci-
 dere, & cucurbitulas admonere, ferro candente in

occipitio quoq; & infrà, quæ summæ vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus humor euadat. Quibus si finitum malum non fuerit, propè est, ut perpetuum sit. Ad lenandum id tantummodo utendum crit exercitatione multa, frictione, cibisq; his, qui suprâ comprehensi sunt, præcipueq; vitanda omnia qua ne fierent, excepimus.

De Regu morbi curatione. CAP. XXIII.

A Equè notus est morbus, quem interdum Arquatum, inter cùm Regiū nominât, Quem Hippocrates ait, si post septimū diem febricitante agro supervenit, tutū esse, mollibus tantummodo præcordijs substantibus. Diocles ex toto, si post febrem oritur etiam prodesse. si post hunc febris, occidere. Color autem eum morbum detegit maxime oculorum, in quibus quod album esse debet, fit luteum. Soletq; accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum dextra parte durities & ubi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorūq; resolutio, atq; ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit. Primo die abstinerè agrū oportet, secundo ducere alium, tum si febris est, eam victus genere discutere. Si non est, scamoneā potui dare, vel cum aqua betam albam cōtritā, vel cum aqua mulsā nuces amaras, absinthium, anisum, sic, ut pars huius minima sit. Asclepiades aquam quoq; salsam, & quidam per biduū purgationis

gationis caussa bibere cogebat, ijs quæ urinâ mouent reiectis. Quidam superioribus omiſſis, per hæc & per eos cibos, qui extenuant, idem ſe conſequi dicunt. Ego ubiq; ſi ſatis virum eſt, validiora, ſi parum, imbecillia auxilia præſiro. Si purgatio fuit, poſt eam triduo, primo modicè ciuū oportet aſſumere ex media materia, & vinum bibere græcum, ſaluſum, ut reſolutio ventris maneat, tunc altero triduo validiores cibos, & carnis quoq; aliquid eſſe, intra æquam manere, deinde ad ſuperius genus victus reuerti, cui eo, ut magis ſatietur, omiſſo græco vino bibere integri aſterum: atq; ita per hæc variare, ut interdum acres quoq; cibos interpomat, interdum ad ſaluſum vinum redeat. Per omne verò tempus utendum eſt exercitatione, frictione, ſi hyems eſt, balneo, ſi æſtas, frigidis natationibus, lecto etiã & conclauis cultiore claſſo loco vi, ludis, laſciuiis, per quæ mens exhilaretur. Ob quæ regiũ morbus dictus videtur. Malagma quoq; quod digerat, ſuper præcordia datum prodeſt, vel arida ibi ficus impoſita, ſi iecur aut lienus affectus eſt.

De Elephantiz curatione. CAP. XXV.

Ignotus autem penè in Italia, frequentiffimus in quibusdam regionibus iſ morbus eſt, quem ἰλιπαντία Græci vocant, iſq; longis annumeratur. Totum corpus afficitur, ita ut oſſa quoq; vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrasq; tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa cu-

tis inaequaliter crassa, tenuis, dura, mollisq; quas squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, os, sura, pedes intumescunt. Vbi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusq; sub tumore conduntur, fibracula oritur, qua facile tot molis obrutum hominem consumit. Protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet, aut nigro veratro venter solui, adhibenda tui quanta sustineri potest, inedia est, paulum deinde vires reficienda, & ducenda aluus: post hac, ubi corpus leuatum est, utendum est exercitatione, praecipueq; cursu, sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus euocandus, frictio, adhibenda, moderandumq; inter hac, ut vires conseruentur, balneum rari esse debet. Cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine insatibus. Vinum praterquam primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago, & illita, tueri optime videtur.

De Attonitis, & eorum curatione. CAP. XXVI.

Attonitos quoq; raro videmus, quorum & corpus & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis, interdum morbo, ἀπονίαξις hunc Graci appellant. His sanguis mittendus est. Veratro quoque albo, vel alui ductione utendum. Tum adhibenda frictiones, & ex media materia minime pingues cibi, quidam etiam acres, & à vino abstinendum.

De resolutione nervorum, quae Apoplexia vel παράλυσις dicitur. CAP. XXVII.

At

AT resolutio nervorum, frequens ubiq; mortuus
 est. Sed interdum tota corpori, interdum
 partes infestat. Veteres autores illud ἀνωμαλία
 hoc Paralysis nominaverunt. Nunc utrunq; Pa-
 ralysis appellari video. Solent autē qui per omnia
 membra vehementer resoluti sunt, celeriter rati,
 ac si correcti non sunt, diutius quidem vivunt, sed
 rarò tamen ad sanitatem perveniunt, & plerunq;
 miserum spiritum trahunt, memoria quoq; amissa.
 In partibus verò nunquā acutus, saepe longus,
 ferè sanabilis morbus est. Si omnia membra vehe-
 menter resoluta sunt, sanguinis detractio vel occi-
 dit, vel liberat. Alio d curationis genere, vix un-
 quam sanitatem restituit, saepe mortem tantum
 differt, vitam interim infestat. Post sanguinis mis-
 sionem, si non redit, & motus & mens, nihil spei
 superest. Si redit, sanitas quoq; prospicitur. At
 ubi pars resoluta est, * proderit malo corporis, vel
 sanguis missus, vel alius ducta. Cetera eadem in
 utroq; casu facienda sunt. Siquidem vitare pre-
 cipue convenit frigus, paulatimq; ad exercitati-
 ones revertendum est, sic, ut ingrediatur ipse protri-
 nus, si potest. Si id crurum imbecillitas prohibet,
 vel gestetur, vel motu lecti concutiat, tum id
 membrum, quod deficiet, si potest, per se, si minus,
 per alium moveatur, & vi quadam ad consuetu-
 dinem suam redeat. Prodest etiā * torpentis mem-
 bri summam cutē exasperasse, vel urticis caesam,
 vel imposito sinapi, sic ut ubi rubere cæperit cor-
 pus,

*proni-
det

*torpētis
bus mem-
bris

pus,

pus, hac remoueantur. Scilla quoq; contrita, bul-
biq; contriti cum thure rectè imponuntur. Neque
alienum est, resina cutem tertio quoq; die diutius
vellere, pluribus etiam locis, aliquando sine ferro
cucurbitulas ad mouere. Vnctioni verò aptissimū
est vetus oleum, vel nitrū aceto & oleo mistum.
Quinetiam fouere aqua calida marina, vel si ea
non est, tamen salsa magnopere necessarium est.
At si quo loco vel naturales, vel etiā manu facta
tales natationes sunt, ijs potissimū utendum est,
precipueq; in his agitanda membra, quæ maxime
deficiunt. Si id non est, balneū tamen prodest. Ci-
bus esse debet ex media materia, maximeq; ex ve-
natione: potio sine vino aqua calida. Si tamen vi-
tus morbus est, interponi, quarto vel quinto die
purgationis causa vinum Græcum, salsum pro-
dest. Post cenā utilis vomitus est. Interdum verò
etiam nervorum dolor oriri solet. In hoc casu non
oportet vomere, non medicamentis urinam moue-
re, non sine exercitatione sudores, ut quidam præ-
cipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. In lectu-
lo leniter satis diu corpus perficiādum est, deinde
retento spiritu, ab ipsa exercitatione potius supe-
riores partes mouenda, balneo raro utendum, mi-
randum subinde peregrinationibus cælum. Si do-
lor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perun-
genda est, deinde innolucnda, & subiicienda pru-
na lenis, & sulphur, atq; ita id suffumigandum,
idq; aliquandiu faciendum. Sed ieiunio, cum bene

* impe-
ditur

iam concoxerit, cucurbitula quoq; sepe dolēti parti admovenda sunt, pulsandusq; leniter inflatis vesicis bubulis is locus est. Utile est etiam serum miscere cum hyoscyani & urtica contritis seminibus, sic, ut omnium par modus sit, idq; imponere, fouere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Utriculi quoq; rectē imponuntur aqua calida repleti, aut bitumen cum bordeacea farina mixtum, atque in ipso potissimum dolore utendum gestatione vehementi est, quod in alijs doloribus pessimū est. Tremor autem nervorum aequē vomitu, medicamentisq; urinam mouentibus* intenditur. Inimica etiam habet balnea, assasq; sudationes. Bibenda aqua est, acri ambulatione utēdum, item unctio-nibus, frictionibusq; maxime per seipsum, pila, similibusq; superiores partes dimouenda, cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni utiq; studeatur. Secundum cibum curis abstinendum. Rarissima venere utendum est. Si quando quis in eam prolapsus est, tum oleo leniter dinq; in leñulo perfricari manibus puerilibus potius, quàm virilibus debet. Suppurationes autem, quæ in aliqua interiori parte oriuntur, ubi nota fuerint, primum id agere oportet per ea cataplasmata qua reprimunt, ne coitus inutilis materia fiat. Deinde, si hac victa sunt, per ea malignata qua digerunt, dissipentur. Quod si consecuti non sumus, sequitur ut euocetur, deinde ut maturescat, omnis tunc vomica finis est, ut rumpatur. Indiciūmq; est,

est, pus vel alno, vel ore redditum: sed nihil facere oportet, quominus quicquid est puris excedat. Utendum maxime sorbitionibus est, & aqua calida. Vbi pus fieri desyt, transeundum ad faciles quidem, sed tamen validiores & frigidos cibos, frigidamq; aquam, sic ut ab egelidis tamen initium fiat, primoq; cum melle quadam edenda, ut nuclei pinei, vel Græcæ nuces, vel auellane. Postea sub-
 mouendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est succus assumptus, vel porri, vel marrubij, et omni cibo porrum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus, quæ non afficiuntur, frictionibus, item ambulationibus lenibus. Vitandumq; erit, ne vellutando, vel currendo, vel alia ratione sanescentia ulcera exasperetur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoq; omnimodo cauendus sanguinis vomitus est.

LIBER IIII.

De humani corporis interioribus sedibus.

CAP. I.



ACTENVS reperiuntur ea genera morborum, quæ in totis corporibus ita sunt, ut ijs certæ sedes assignari non possint. Nunc de hjs dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi curationesq; in noti-

tiam venient, si prius eorum sedes breuiter ostendero. Caput igitur eaq; quæ in ore sunt, nō lingua tantummodo, palatoq; terminantur, sed etiā quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraq; circa guttur vena grandes, quæ opætytides nominantur, itemq; arteria (quas parotidas vocant) sursum procedentes ultra aures feruntur. Atq; in ipsis cervicibus glandula posita sunt, quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt. Alterum asperam arteriam nominant, alterum stomachum. Arteria exterior ad pulmonem: Stomachus interior ad ventriculum fertur. Illa spiritum, hic cibum recipit: à quibus cū diversa via sint, quæ coeunt, exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est; quæ cum spiramus attollitur, cum cibum potionemq; assumimus, arteriam elaudit. Ipsa autē arteria, dura, & cartilagineosa in gutture assurgit, ceteris partibus residet. Constat ex circulis quibusdam compositis ad imaginem earum vertebrarum, quæ in spina sunt: ita tamē ut ex parte exteriorē aspera, ex interiorē stomachi modo levis sit, eaq; descendens ad præcordia cum pulmone cōmittitur. Is spongiosus, ideoq; spiritus capax & à tergo spina ipsi iunctus in duas fibras vngula bubula modo, diniditur. Huic cor annexum est, natura musculosum in pectore, sub sinisterrime mamma situm, duosq; quasi ventriculos habet. At sub corde atque pulmone transversum ex valida membrana septum est, quod

à præ

à præcordijs uterū diducit æquè nervosum, multis etiam venis per id discurrentibus à superiore parte, non solum intestina, sed iecur quoque lienemq; discernit. Hac viscera proxima sed infr.è tamen posita dextra sinistraq; sunt. Iecur a dextra parte sub præcordijs ab ipso septo ortum, intrinsecus cavum, extrinsecus gibbum, quod prominens leuiter ventriculo insidet, & in quatuor fibras diuiditur. Ex inferiore vero parte ei sel inhaeret, at lienis sinistra eidem septo, sed intestino innexus est, natura mollis & rarus, lōgitudinis, crassitudinisq; modica, isq; paulum à costarum regione in uterum excedēs ex maxima parte sub his conditur, atq; hæc quidem iuncta sunt. Renes. Stoma-
 Renes verò diuersi, qui lumbis sub imis coxis inhaerent à parte earum resimi, ab altera rotundi, qui & venosi sunt, & ventriculos habent, & tunicis super conteguntur. Ac viscerum quidem hæc sedes sunt. chus. Stomachus verò, qui intestinorū principium est, nervosus à septima spinæ vertebra incipit, ac circa præcordia, cum ventriculo committitur. Ventric-
 Ventriculus autem, qui receptaculum cibi est, constat ex duobus tergoribus, isq; inter lienem & iecur positus est, utroque ex his paulum super eum ingrediente. Sumiq; etiam membranula tennes, per quas inter se tria ista con- lus. nectuntur, iungunturq; ei septo, quod trāuersum esse supra posui. Inde ima ventriculi pars paulum in dexteriorē partem conuersa, in summum
 m 3 intest

intestinum coarctatur. Hanc iuncturam *πυλωρον* Græci vocant, quoniam porta modo in inferiores partes, ea qua excreturi sumus, emittit. Ab ea ieiunum intestinum incipit, nō ita implicitum: cui tale vocabulum est, quia nunquam quod accipit, continet: sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenue intestinum est, in sinus vehementer implicitum. Orbes verò eius per membranas singuli cū inferioribus connectuntur, qui in dexteriolem partē conuersi, & e regione dexterioris coxa finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transuerso committitur, quod a dextra parte incipiens, in sinisteriore peruium & longum est, in dexteriolem non est, ideoq; cæcum nominatur. At id quod peruium est, late fusum atq; sinuatū, minusq; quam superiora intestina nervosum, ab utraq; parte huc atq; illuc volutum, magis tamen sinisteriores inferioresq; partes tenens, contingit iccur atq; ventriculum. Deinde cum quibusdam membranulis à sinistro rene venientibus iungitur, atq; hinc dextra recurvatum in imo dirigitur quæ excrevit, ideoq; id ibi rectum intestinum nominatur. Contegit verò uniuersa hac, omentum ex
 *interiore parte leue & strictū, ex superiore mollior. Cui adeps quoq; innascitur, qua sensu, sicut cerebri quoq;, & medulla, caret. At à renibus singule vena colore alba ad vesicam firmitur, & ex tūgat Græci vocāt, quod per eas inde descendentem

viri

urinam in vesicam destillare concipiunt. Vesica autē in ipso sinu nervosa & duplex, cernice plena atq; caruosa, iungitur per venas cum intestino: eoq; osse, quod pubi subest. Ipsa soluta atq; liberior est, aliter in viris atque in feminis posita. Nam in viris iuxta rectum intestinū est potius in sinistram partem inclinata. In feminis super genitale earum posita est, superq; elapsa ab ipsa vulua sustinetur. Tū in masculis iter urina spatiosius, & compressius à cernice huius descendit ad colem. In feminis brevius & plenius super vulua cernicem se ostendit. Vulua autem in virginibus quidem admodum exigua est. In mulieribus verò, nisi ubi gravida sunt, nō multo maior, quam ut manu comprehendatur. Ea recta continuataq; cernice (quem canalem vocant) Canalis. contra mediam alvum orsa, inde paulū ad dexteriores coxam conuertitur, deinde super rectum intestinū progressa illis femina latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas & pubem imo ventre posita sunt, à quibus ac pube abdomen sursum versus ad praeordia pervenit, ab exteriori parte evidenti cute, ab interiori laevi membrana inclusum, quae omento iungitur, pectus & autem à Gracis nominatur.

De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: & primò de eius dolore, deinde de morbo, qui circa faciem nascitur, tum de linguae resolutione, postremò de distillatione, ac grauedine.

CAP. II.

m 4

HIS

His veluti in conspectum quendam (quatenus scire curanti necessariū est) adductis, remedia singularum laborantium partium exequar, orsus à capite: sub quo nomine nunc significo eam partē, quę capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si quis similis est, alias erit explicandus. In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est, quē *κεφαλαία* Graci vocāt. Cuius nota sunt horror, calidus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic ut vox supprimatur, vel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maximè circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neq; gravis, neq; periculosa, per hominis ætatem est. Interdū gravior dolor, sed brevis, neq; tamen mortiferus, qui vel vino, vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut sole contrahitur. Hiq; oēs dolores modo in febre, modo sine hac sunt, modo in toto capite, modo in parte, interdū sic, ut oris quoq; proximam partē excruciet. Præter hæc etiā unum invenitur genus, quod potest locū esse, ubi humor cutem inflat, eaq; intumescit, & prementi digito cedit, id *πονίφαλον* Graci appellat. Ex his, id quod secundo loco positū est, dum leve est, qua sit ratione curandū dixi, cum persequerer ea, qua sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberēt. Quæ verò auxilia sint capitis, ubi cum febre dolor est, eo loco

explici

explicitum est, quo febrim curatio exposita est.
 Nunc de ceteris dicendū: Ex quibus id quod acutū est, & id quod supra consuetudinem intenditur, idq; quod ex subita caussa: et si non pestiferum, tamen vehemens est, primam curationem habet qua sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, supernacū est. Satiusq; est abstinere à cibo, si fieri potest, etiā à potione. Si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor remanet, aluum ducere, sternutamenta euocare, nihil assumere, nisi aquā. Sape enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit, utiq; si ex vino vel cruditate origo est. Si verò in his auxilij parum est, conderi oportet ad cutē: deinde considerandum est, qua caussa dolorem excitavit: si calor, aqua frigida multa perfundere caput expediat, spongiam concavā imponere subinde in aqua frigida expressam, ungere rosa & aceto, vel potius his tinctam lanam succidā imponere, aliaq; refrigerantia cataplasmata. Ac si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida maritima, vel certè salsa, aut in qua laurus decocta sit, tum caput vehementer perfricare, deinde calido oleo implere, veste velare. Quidam etiam id devinciunt. Alij cernicalibus vestimentisq; onerant, & sic lenantur, alios calida cataplasmata adiuuāt. Ergo etiam ubi caussa incognita est, videre oportet, refrigerantia magis, an calefacientia leniant, & his vii, quæ experimentum approbarit. At si

parum caussa discernitur, perfundere caput primum aqua calida, siut supra præceptum est, vel salsa, vel ex lauro decocta, tum frigida posca. Illa in omni vetusto capitis dolore communia sunt, sternutamenta excitare, inferiores partes vehementer perfricare, gargarizare his, qua salinam mouet, cucurbitulas temporibus & occipitio ad-mouere, sanguinem ex naribus detrahere, resina subinde tempora peruellere, & imposito sinapi exulcerare ea qua male habet, ante linteolo subiecto, ne vehementer arrodatur: candentibus firramenti ubi dolor est, ulcera excitare, cibum per modicum cum aqua sumere: ubi lenatus est dolor in balneo ire, ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si discessus ex toto dolor est, etiam ad vinum reuerti, sed postea semper antequam quicquam aliud, aquam bibere. Dissimile est id genus quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessariū est. Deinde imponere sinapi, sic ut exulceret. Si id profuit parum* profuit, scalpello vendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur, insudet, vehementer perfricetur, cibus, potionibusq; utatur, urinam præcipue mouentibus.

De morbo qui circa faciem nascitur, quem
 Graeci *νοτινὴ πρὸς ὀφθαλμὸν* vocant.

Circa faciem verò morbus innascitur, quem
 Graeci *νοτινὴ πρὸς ὀφθαλμὸν* nominant. Is cum
 acuta ferè febre oritur. Os cum motu quodā per-
 uertitur,

vertitur, ideoq; nihil aliud est, quàm distentio oris. Accedit crebra coloris in facie totoq; corpore mutatio. Somnus in promptu est. In hoc sanguinem mittere, optimum est. Si finitum eo malum non est, ducere aluum: si ne sic quidem discussum est, albo veratro vomitum mouere: prater hac necessarium est vitare solum, lassitudinem, vinum. Sed si discussum his non est, utendum est cursu, frictione, in eo quod laesum est, leni & multa, in reliquis partibus breuiore, sed vehemēti: prodest etiam mouere sternutamenta, caput radere, idq; perfundere aqua calida, vel marina, vel certè salsa, sic ut ei quoq; sulphur adijciatur. post perfusionem iterum perfricari, sinapi manducare, eodemq; tempore affrictis oris partibus ceratum, integris idem sinapi, donec arrodat, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

De resolutione linguæ.

AT si lingua resoluta est, quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic ut sermo hominis non explicetur, oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepeta decocta sit, aquam bibere, caput & os & ea quæ sub mento sunt, & cernicè vehementer perfricare, lasere linguam ipsam linere, manducare quæ sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam, magna vi luctari, ut verba exprimantur, exerceri retento spiritu, caput sæpe aqua frigida perfundere, nonnunquam multam esse radiculi, deinde vomere.

De.

Destillat autem humor ex capite interdum in nares, quod leue est: interdum in fauces, quod peius est: interdum etiam in pulmonem, quod pessimum est. Si in nares distillat, tenuis per has pituita profluit, caput leuiter dolet, grauitas eius sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, tussiculam mouet. Si in pulmonem, prater sternutamenta & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, aestus, biliosa vrina. Aliud autem (quamuis nō multum distans malum) Grauedo est. Hac nares claudit, vocem obtūdīt, tussim siccam mouet, sub eadem salsa est salina, sonant aures: vena mouentur in capite, turbida vrina est. Hac omnia cognoscit Hippocrates nominat. Nunc video apud Græcos in grauedine hoc nomen seruari, destillationes κατὰ ἄγρυς appellari. Hac autē & breuia, etsi neglecta sunt, longa esse consueuerunt. Nihil perisurum est, nisi quod pulmonē exulcerauit. Vbi aliquid eiusmodi sensimus, protinus abstinere à sole, balneo, vino, venere debemus. Inter quæ uentilatione, & assueto cibo nihilominus uti licet, ambulatione tantū acri, sed tēta utendū est, & post eā caput atq; os supra quinquagies perficiendū. Raroq; fit, ut si biduo, vel certe triduo nobis temperauerimus, id ut in nō leuetur. Quo lenato, si in destillatione crassi facta pituita est, vel in grauedine nares magis patent, balneo utendū est, multaq;

taq; aqua prius calida, post egelida fouendum os, caputq; deinde cum cibo pleniore vinum bibendum. At si aque tenax die quarto pituita est, vel nares aque clausæ videntur, assumendum est, vinum aminum, austereum, deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum & ad consuetudinẽ reuertendum est. Neq; tamẽ illis ipsis diebus, quibus aliqua omittẽda sunt, expedit tanquã agros agere, sed cetera omnia quasi sanis faciẽda sunt, præterquam si diutius aliquẽ & vehementius ista sollicitare cõsueuerunt. Huic enim quadam curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces destillauit, præter ea quæ supra retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, perfricanda vehementer inferiores partes, leuior frictio adhibẽda thoraci erit, leuior capiti, demẽda assueti cibo pars dimidia, sumenda oua, amyllum, similiaq; , quæ pituitam faciunt crassiorẽ. Siti quanta maxime sustineri potest, pugnandum est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoq; usus est, adyiciẽdus est cibo pisciculus, aut caro, sic tamen ne protinus iustus modus cibi sumatur. Vino meraco copiosius utendum est. At si in pulmonẽ quoq; destillat, multoq; magis & ambulatione, & frictione opus est, eademq; adhibita ratione in cibis, si non satis illi proficiunt, acrioribus utendũ est, magis somno indulgẽdum, abstinentumq; à negotijs omnibus aliquãdo, sed serius, & balneis tentandũ. In grauedine autem primo

primo die quiescere, neq; esse, neq; bibere, caput
 velare, fauces lana circūdare, postero die surgere,
 diu abstinere à potione, aut si res coëgerit, nō ultra
 heminā aquæ assumere. Tercio die panis non^{* it.}
^{* tam} multum ex parte interiore cum pisciculo, velle-
 ni carne sumere, aquā bibere. Si quis sibi tempe-
 rare non potuerit, quo minus pleniore victu utatur,
 vomere. Vbi in balneū ventū est, multa aqua
 calida caput & os fouere vsq; ad sudorem, tum
 ad vinū redire: post quæ vix fieri potest, ut idem
 incommodum maneat. Sed si manserit, vādum
 erit cibus frigidus, aridis, leuibus, humore quā mi-
 nimo, seruatis frictiōib⁹, exercitationibusq; quæ
 in omni tali genere valetudinis necessariae sunt.

De ceruicis morbis. curationibusq;. CAP. III.

A Capite transitus ad ceruicem est, quæ gra-
 uibus admodum morbis obnoxia est. Neq;
 tamen alius importunior, acutiorq; morbus est,
 quā is qui quodam rigore neruorū, modo caput
 scapulis, modo mētum pectori annectit, modo re-
 ctam & immobilem ceruicem intendit. Priorem
 Greci *ἀπιδότορον*, insequentem *ἐμπροδότορον*,
 vltimum *τίταρον* appellat, quævis minus sub-
 tiliter, quidam indiscretis hie nominibus utūtur.
 Et sæpe intra quartum diem tollūt. Si hunc euas-
 erunt sine periculo sunt. Omnia eadem ratione
 curantur, idq; conuenit. Sed Asclepiades utique
 mittendum sanguinem credidit. Quod quidā vi-
 tandum esse dixerunt, eò quod maxime tum cor-
 pus

pus calore egeret, isq; esset in sanguine. Verum hoc quidē falsum est. Neq; enim natura sanguinis est, ut vtiq; caleat, sed ex his, quæ in homine sunt, is celerrime vel calefcit, vel refrigescit. Mitti verò nec ne debeat, ex his intelligi potest quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Vtique autem recte datur castoreū, & cum hoc piper vel laser. Deinde opus est fomento humido & calido. Itaq; pleriq; aqua calida multa ceruices subinde perfundunt. Id in præsentia lenat, sed opportuniores nervos frigore reddit. Quod vtiq; vitandum est. Vtilius igitur est cerato liquido primum ceruicem perūgere, deinde admoovere vesicas bubulas, vel utriculos oleo calido repletos, vel ex farina calidum cataplasma, vel piper rotundum cum fæco contusum. Vtilissimum tamen est humido sale fouere. Quod quomodo fieret, iam ostēdi. Vbi eorum aliquid factum est, admoovere ad ignem, vel si æstas est, in sole, ægrum oportet, maximeq; oleo vetere, si id non est, Syriaco, si ne id quidē est, adipe quā vetustissima ceruicem, & scapulas, & spinas perfricare. Fricōtio cū omnibus in homine vertebis utilis sit, tum ijs præcipuè, quæ in collo sunt. Ergo die nocteq;, interpositis tamē quibusdam temporibus, hoc remedio utendum est. Dum id intermittitur, imponendū malagma aliquod ex calefcientibus. Cauendū verò præcipuè frigus. Ideoq; in eo conclavi, in quo cubabit ager, ignis cōtinuus esse debebit, maximeq;
tempore

tempore antelucano, quo præcipuè frigus intēditur. Neq; inutile erit, caput attōsum habere, idq; irino vel cyprimo calido madefacere, & superimposito pileo velare, nonnunquā etiam in calidum oleum totum descēdere, vel in aquam calidam, in qua sæuum græcum decoctum sit, & adiecta olei pars tertia. Alnus quoq; ducta sæpe superiores partes resoluit. Si verò etiam vehementius dolor creuit, admonenda cernicibus cucurbitule sunt, sic, ut cutis incidatur, eadē aut ferreamentis, aut sinapi adurenda. Vbi lenatus est dolor, moneriq; cernix cœpit, scire licet cedere remedijs morbum. Sed diu vitandus cibus, quisquis mandēdus est. Sorbitionibus utendū, itemq; ovis sorbilibus, aut à pullis mollibus ius aliquod assumendum. Id si bene processerit, iamq; ex toto recte se habere cervices videbuntur, incipiendū erit à pulticula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam panis mandendus, quàm vinum gustandum. Siquidem huius vsus præcipue periculosus, ideoq; in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus. & primum de Angina. deinde de Difficultate spirandi, ultimo de Tussi.

CAP. IIII.

VT hoc autem morbi genus circa totam cernicem, sic alterū aquè pestiferum acutumq; in faucibus esse consuevit. Noſtri Anginam vocant, apud Græcos nomen prout species est. Interdum enim neq; rubor, neq; tumor ullus apparet,

ret, sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra solvantur, id $\sigma\omega\acute{\alpha}\gamma\chi\lambda\omega$ vocant. Interdum lingua faucesq; cū rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultusq; est, id $\acute{\omega}\varsigma \sigma\omega\acute{\alpha}\gamma\chi\chi$ vocatur. Illa communia sunt, eger non cibum deuorare, non potionē potest, spiritus eius includitur. Leuius est, vbi tumor tantūmodo, & rubor est, catēda non sequuntur, id $\pi\alpha\rho\alpha\sigma \sigma\omega\acute{\alpha}\gamma\chi\lambda\omega$ appellant. Quicquid est, si vires patiuntur, sanguis mitlēdus est, si non abundat, secundum est ducere aluiū. Cucurbitula quoq; rectē sub mento, & circa fauces admonetur, ut id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fomentis humidis. Nam $\mu\alpha$ spiritum elidunt. Ergo ad mouere spongias oportet, quæ melius in calidum oleum, quàm in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusq; est hic quoque salis calidi succus. Tum commodum est hyssopū, vel nepeta, vel thymum, vel absinthium, vel etiam saxifures, aut ficus aridas, aut mulsam aquā decoquere, eaq; gargarizare: post hac, palatum ungere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est, polline etiā piperis id rectē respergitur. Si per hac parum proficitur, vltimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, & in palato citra vñā, vel eas venas, quæ sub lingua sunt, ut per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si nō fuerit ager adiutus, scire licet, modo vñlum esse. Si verò huius morbus lenatus est, iamq; fauces, &

cibum & spiritum capiunt, facilius ad bonam valetudinē recursus est. At interdum natura quosq; adiuvat, si ex angustiore sede vitium transit in latiore. Itaq; rubore & tumore in praecordijs orto, scire licet fauces liberari. Quicquid autem eas lenauit, incipiendum est ab humidis, maximeq; aqua mulsa decocta, deinde assumendi molles & non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum habitum reuertatur. Vulgò audio, si quis pullum hirundinis ederit, angina toto anno non periclitari, seruatumq; cum ex sale, cum is morbus erget, comburi, carbonemq; eius contritū in aquam mulsam (qua potui datur) infricari, & prodesse. Id cum idoneos autores ex populo habeat, neque habere quicquam periculi possit, quamuis in monumentis medicorum non legerim, tamen insequendum huic operi meo credidi.

De difficultate spirandi.

Et etiam circa fauces malum, quod apud Græcos aliud atq; aliud nomen habet, prout se intēdit. Omne in difficultate spirandi consistit. Sed hac dum modica est, neq; ex toto strangulat, δύσπνοια appellatur. Cū vehemētior est, ut spirare ager sine sono & anhelatione nō possit, ἐξάνια. Cū accessit id quoq;, ne nisi reuera ceruice spiritus trahatur, ἀπὸ τοῦ τοῦ τοῦ. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi. Duo insequentia acuta esse consueverunt. His communia sunt, quod propter angustias, per quas spiritus euadit, sibilu elicit, dolet

dolor in pectore praecordijq; est, interdum etiam in scapulis, isq; modo decedit, modo reuertitur, ad hac tussicula accidit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet in sanguinis detractione. Neque id satis est, sed lacte quoq; venter solucendus est. Liquanda aliis, interdum etiam ducenda, quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem etiam in lecto sublimiter habendum est, thorax fomentis, cataplasmatisq; calidis, aut siccis, aut etiam humidis adiuvandus est, & postea vel malagma superimponendum, vel certe ceratum ex cyprino vel irino unguento. Sumenda deinde ieiuno potui mulsa aqua, cui qua vel hyssopus cocta, vel contrita capparis radix sit. Datur etiam vtiliter, aut nitram, aut nasturtium, allium frictum, deinde contritum & cum melle mistum, simulq; coquantur mel, galbanum, resina terebinthina, & ubi coierunt, ex his quod fibra magnitudinem habet, quotidie sub lingua liquatur, aut sulphuris ignem non experti* pondo & quadrans, abrotani podo in vini cyatho teruntur, idq; tepidum sorbetur. Est etiam non vana opinio vulpinum iecur, ubi siccum & aridum factum est, contundi oportere, polentamq; ex eo potioni aspersi, vel eiusdem pulmonem quam retentissimum assum, sed sine ferro coctum, edendum esse. Prater hac sorbitionibus, & lenibus cibis utendum est, interdum vino tenui austerum, nonnunquam comitu. Prosumt etiam quacumq; urinam augent, sed nihil magis quam ambulatio lenta

*podo de
narii &
quadrans,
abrotani
podo den
arii in vino

Aesclepiades.

penè usq; ad lassitudinem, frictio multa, præcipuè inferiorum partium, vel in sole, vel ad ignem, & per seipsum, & per alios, usq; ad sudorè. In interiore verò faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac pleriq; extrinsecus cataplasmatibus calidis, fomentisq; humidis utuntur. Volunt etiam vaporem calidum ore recipi, per quem molliores alijs partes eas fieri dicunt, opportunioreq; vitio ià harenti. Sed si bene sic vitari morbus potest, tuta illa præsidia. Si metus eius est, superuacua sunt. Utiq; autem perfricare fauces periculosum est: exulcerat enim, neq; utilia sunt, quæ urinae mouenda sunt apta, quia possunt dum transeunt, ibi quoque pituitam extenuare, quam suppressi melius est. Aesclepiades multarum rerum, quas ipsi quoq; secuti sumus, autor bonus, acetum ait quam acerrimum esse sorbendū: hoc enim sine ulla noxa cōprimi vlcera. Sed id suppressere sanguinē potest, vlcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei lycium est, quod idem quoq; aquè probat, vel porri, vel marrubij succus, vel nucis Græcæ cū tragacantho contrita, & cum passō mista, vel lini semen contritum, & cū dulci vino mistum. Exercitatio quoq; ambulandi, currēdiq; necessaria est. Frictio à pectore vehemēs toti inferiori parti adhibēda. Cibi verò esse debent, neq; nimium acres, neque asperi, mel, lenticula, tragum, lai, ptisana, pinguis quoq; caro, præcipueq; porrum, & quicquid cum hoc mistum est. Potionis quam minimam

num esse conuenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua malum cydoneum, pa'mulaue decocta sunt. Gargarizationes quoque lenes: sin ha parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neq; acutum est, & potest esse non longum, curationem tamen maturam, ne uehementer & diu ledat, desiderat.

De Tussi.

Tussis verò fit propter faucium exulcerationem molesta est, quæ multis modis contrahitur. Itaq; illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoq; male habere, & vix cum vetus facta est eliditur, ac modò arida est, modò pituita citat. Oportet hyssopum altero quoq; die bibere, spiritu retento currere, sed minime in puluere, ac lectione uti uehementi, quæ primo impeditur à tussi, post eam vincit, tum ambulare, deinde per minus quoq; exerceri, & pectus diu perfricare. Post hac quam pinguisima ficus uncias tres supra prunas incoltae, esse. Præter hac si humida est, prosunt frictions valida, cum quibusdam calefacientibus, sic, ut caput quoq; siccu uehementer perfricetur. Itẽ cucurbitula pectori admota, sinapi ex parte exteriori faucibus impositu, donec leniter exulceret, potio ex mēta, nucibusq; Gracis et amylo, primæq; assumptus panis aridus, deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum ea uehementissime urget, adiunat vini austeri cyathus assumptus, dū ne amplius id interposito

tempore aliquo, quàm ter aut quater fiat. Item laseris quàm optimi paulum deuorare opus est, porri vel marrubij succum assumere, scillâ delingere, acetum ex ea, vel certe acre sorbere, aut cum spica alij contriti duos vini cyathos. Utilis etiam in omni tussi est peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, natationes. Cibus interdum mollis, ut malua, ut vrtica: interdum acer, ut lac cu alio coctum, sorbitiones quibus laser sit adiectum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit, ouum sorbile sulphure adiecto, potus primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus hac, alijs vinum. Magis terreri potest aliquis, cum sanguinem expuit. Sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit enim modo ex gingiuis, modo ex ore, & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere, sine gingivarum ullo vitio, ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atque interdum sanguis profluit, interdum simul aqua quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is a summis faucibus fitur, modo exulcerata ea parte, modo non exulcerata, sed aut ore vene alicuius adaper-to, aut tuberculis quibusdam natis, ex his sanguine erumpente. Quod ubi incidit, neq; laedit potio aut cibus, neque quicquam aut ex ulcere excreatur. Aliquando gutture & arterijs exulceratis, frequens tussis, sanguinem quoque extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut

ex pectore, aut ex latere, aut iocinore firatur. Sæpe scamina, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expunt, autoresq; medici fuerunt, vel exesa parte aliqua sanguinem exire, vel rupta, vel ore alicuius vena patefacto. Primâ δὲ ἀπορροήν, secundam ἐκφυρῶν ἀπορροήν, tertiam ἀναρροήν appellant. Ultima minimè nocet, prima gravissimè. Ac sæpe quidem evenit, ut sanguinè pus sequatur, interdū autem qui sanguinè ipsum suppressit, satis ad valetudinem proficit. Sed si secuta ulcera sunt, si pus, si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia & periculosa genera morborum sunt. Si verò sanguis tantum fluit, expeditius & remedium & finis est. Neq; ignorari oportet, eis quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæ, aut postè cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocri profluuium, idq; per urinam redditum, ipsam quoq; lèssitudinem solvere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit: si tamen in eius urina nihil nonabit. Neq; vomitum huius asserere periculum, etiam cū repetit, si antè confirmare & implere corpus licuit: & ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neque tussim aut calorem mouet. Hac pertinent ad uniuersum. Nunc ad ea loca quæ proposui veniam. Si ex gingivis exit, portulacam manducasse satis est: si ex ore, continuasse comerum vinum: si id parum

proficit, acetum: si inter hæc quoq; graviter erumpit (quia consumere hominem potest) conumodissimum est, impetum eius admota occipitio cucurbitula, sic ut entis quoq; incidatur, auertere. Si id mulieri, cui menstrua non fiuntur, evenit, eandem cucurbitulam incisus inguinibus eius admonere. At si ex faucibus, interioribusve partibus processit, & metus maior est, & cura maior adhibenda: sanguis mittendus est, & si nihilominus ex ore processit, iterum tertioq; & quotidie paulum aliquid, protinus autem debet sorbere vel acetum, vel etiam cum thure plâtaginis aut porti succum, inponendaq; extrinsecus supra id quod dolet lana succida ex aceto est, & id sponsia subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoq; & femora, brachiaq; pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo non prodesse, ut etiam inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe commode respondere experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est, sed sat est infra inguina & super talos, summosq; humeros, etiam brachia. Tum si febris urget, danda est sorbitio, & potui aqua, in qua aliquid ex his qua aluum astringunt, decoctum sit: ac si abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, & molle quoque ovum dari potest potui vel idem quod supra scriptum est, vel vinum dulce, vel aqua frigida: sed sic bibendum erit, ut sciamus huic morbo suum prodesse: præter hæc
necess

necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput huius quoque cubantis sublime esse debet, recteq; tendetur. Facies saepe aqua frigida fovenda est. At inimica sunt vinum, balneum, Venus, in cibo oleum, acriora omnia, item calida fomenta, conclave calidū & inclusum, multa vestimenta corpori iniecta, etiam fricationes, ubi bene etiam sanguis conquieuit. Tum verò incipiendum est à brachijs, cruribusq; , à thorace abstinendum. In hoc casu per hyemem locis maritimis, per aestatem mediterraneis, opus est.

De stomachi morbis, & curationibus.

C A P. V.

Faucibus subest stomachus, in quo plura longa vitia incidere consueverunt. Nam modo ingens calor, modo infestio, hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit. Interdum pituita, interdum bilis oritur, frequentissimumq; est eius malum, quo resolvitur, neq; ulla re magis aut afficitur, aut corpus afficit. Ut diversa autem vitia eius, sic etiam remedia sunt. Ubi exæstuat, aceto cum rosa extrinsecus subinde fovendus est, imponendusq; pulvis cū oleo, & ea cataplasmata, qua simul & reprimunt, & molliunt. Potui (nisi quid obstat) gelida aqua prestanda. Si infestio est, prosunt admoda cucurbitula: neq; incidere cutē necesse est: prosunt sicca & calida fomenta, sed non vehemensissima. Interponēda abstinētia est. Utilis in huiusmodio potio est absinthij aut hyssopi aut rana.

Exercitatio primo leni, deinde maior adhibenda est, maximèq; qua superiores partes moueat. Quod genus in omnibus stomachi vitijs aptissimum est. Post exercitationem opus est vntione, frictione, balneo quoq; nonnunquam, sed rarius, interdum alui ductione. Cibis deinde calidis, neq; inflatibus, eodemq; modo calidis potionibus, primo aque, post, ubi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoq; in omnibus stomachi vitijs precipiendum est, ut quo modo se quisq; ager rescecit, eo ut sanus utatur. Nā redit huic imbecillitas sua, nisi isdem defendatur bona valetudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est, quam serò tumor & dolor sequitur, prima sunt quies & abstinentia, lana sulphurata circumdata, in ieiunio absinthii. Si ardor stomachum urget, aceto cum rosa subinde fouendus est, deinde cibis quidem utendum est modicis. Imponenda verò extrinsecus quæ simul & reprimunt & molliunt: deinde his detrictis, utendum calidis ex farina cataplasmatibus, quæ reliquias digerit. Interdum alui ductenda. Adhibenda exercitatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem serò facienda sunt, quæ in sancibus exulceratis precepta sunt. Exercitatio, frictio infiriorum partium adhibenda. Adhibendi leues & glutinosi cibi, sed citra satietatem. Omnia acria atque acida remouenda. Vino, si febris non est, dulci: aut si id inflat, certe leni utendum, sed neq;

prefrig

præfrigido, neq; nimis calido. Si verò pituita stomachus impletur, necessarius modò in ieiunio, modò post cibum vomitus est. Utilis exercitatio, gestatio, nauigatio, frictio. Nihil edendum, bibendumq; nisi calidum, vitatù tantum his, qua pituitam contrahere consuerunt. Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi, qui sic tentantur, interpositis quibusdà diebus hanc (& quidem quod pessimum est) atram vomere. His rectè aluus ducitur, potiones ex absinthio dantur: necessaria gestatio, nauigatio, & (si fieri potest) ex nausea vomitus, vitanda cruditas, sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinum austèrum. Vulgatissimum verò pessimumq; stomachi vitium est resolutio, id est cum cibi non tenax est, soletq; desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones exercitationesq; superioris partis necessaria. Item vnctiones, frictionesq; hinc perfundi frigida, atq; in eadem natàre, canalibus eiusdem subicere etiam stomachum ipsum, et magis etiam à scapulis, id quod contra stomachum est. Consistere in frigidis, medicatisq; fontibus, quales cutiliarum * subcutiliarumq; sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius disticulter coquuntur, quam facile vitiantur. Ergo plerique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neq; auem, neque venationem, neq; piscem dari debere, nisi

* Gymbria
narumq;

De aquis
cutibus Pl
nius lib. 2
cap. 95. it
lib. 31. ca 2
& 6. de nat
dem & V
trou. lib. 8
cap. 3.

gen

generis durioris. Potui quidem aptissimum est vinum frigidum, vel ceriè bene calidum meracius, potissimum Rheticum, vel Allobrogicum, aliudve, quod & austerrum & resina cõditum est. Si id non est, quàm asperrimus, maximeq; Signinus. Si cibus non cõtinetur, danda aqua, & eliciendus plenior vomitus est, iterumq; dandus cibus, & tum admonenda duobus intra stomachi digitis cucurbitula, ibiq; duabus aut tribus horis cõtinenda sunt. Si simul & vomitus & dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, vel sponsia ex aceto, vel cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda verò non diu, sed vehemèter brachia, & crura, & calcificiunda. Si plus doloris est, infra præcordia quatuor digitis cucurbitula utendum est, protinus dandus panis ex posca frigida. Si non continuit, post vomitum lene aliquid ex his, quæ non aliena stomacho sint. Si ne id quidem tenuit, singuli cyathi vini singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est radicule succus, valentius acidi punici mali, cum pari modo succi, qui ex dulci punico malo est, adiecto etiam intubi succo & menta, sed huius minima parte, quibus tantundem, quantum in his omnibus est, aqua frigida quamoptime miscetur. Id enim plus quam vinum ad comprimendum stomachum potest, comprimendus autem vomitus est, qui per se venit, sic, si nausea est. Sed si coacuit intus cibus, aut

comp

computruit, quorum utrumlibet ructus ostendit, eiciendus est, protinusq; cibis assumptis iisdem quos proxime posui, stomachus restituendus. Vbi sublatuſ est praesens metus, ad ea redeundum est, qua supra praecpta sunt.

De laterum doloribus.

CAP. VI.

Stomachus lateribus cingitur, atq; in his quoque vehementes dolores esse consuerunt, & initium vel ex frigore, vel ex ictu, vel ex nimio cursu, vel ex morbo est. Sed interdum id malum intra dolorem est, isq; modo tardè, modo celeriter soluitur: interdum ad perniciem quoq; procedit, oriturq; acutus morbus, qui pleuriticus à Græcis nominatur. Huic dolori lateris febris, & tussis accedit, & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus est, pituita: si grauis, sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, qua nihil emollitur. Idq; primo vitio grauius, secundo tolerabilius est. Remedium verò est magni & recentis doloris, sanguis missus. At siue lenior, siue vetustior casus est, vel superuacuum, vel serum id auxilium est, confugiendumq; ad cucurbitulas est, antè summam cute incisa. Rectè etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec ulcera pustulasq; excitet, & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hac circumdare primum oportet latus ipsum Lina sulphurata: deinde cum paulum, infl: immatio se renūsit, succis & calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malmagmata est. Si vetustior dolor remanet, nouissimè resin

resina imposita discutitur. Utendum cibis, potio-
nibusq; calidis, vitandum frigus. Inter hac tamen
non alienum, & extremas partes oleo & sulphu-
re perficere. Si leuata tussis est, leni lectione vi-
ianiq; & acres cibos, & vinū meracius assumere.
Quæ à medicis precipiuntur, ut tamen sine his,
rústicos nostros epota ex aqua herba trix ego satis
adiuuet. Hac in omni lateris dolore communia
sunt, plus negotij est, si acutus quoq; morbus is fa-
ctus est. In hoc præter ea quæ suprà posita sunt,
hac animaduertenda sunt, ut cibus sit quamma-
xime tenuis & lenis, præcipueq; sorbitio, eaq; ex
ptisana potissimū, aut ius in quo porrus cū pullo
gallinacco coctus sit. Idq; non nisi tertio quoq; die
detur, si tamen per vires licebit: potio verò aqua
mulsa, in qua hyssopum aut ruta decocta sit. Quæ
quibus tēporibus danda sint, ex ratione vel adie-
ctæ, vel leuata febris apparbit, sic, ut in remissio-
ne quàm maxima dent, cū eo tamen, ut sciamus
non esse eius generis tussi aridas fauces committen-
das. Sæpe enim, ubi nihil est quod excreatur, con-
tinuatur, & strangulat. Ob quam causam dixi
etiam peius id genus esse tussis, quod nihil, quàm
quod pituitam moueret. Sed hic vinum sorbere,
ut suprà precipimus, morbus ipse non patitur, in
vicem eius cremor ptisana sumendus est. Ut his au-
tem in ipso morbi feruore sustinendus ager est, sic
ubi paulū is se remisit, alimenta pleniora & vini
quoq; aliquid dari potest, dum nihil detur, quod
aut

aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectione quoque manserit tussis, intermittere oportebit uno die, posteroque, cum cibo vini paulo plus assumere. Atque incipiente quoque tussi, tum non erit alienum (ut supra quoque possumus est) vini cyathos sorbere. Sed in hoc genere valetudinis dulce, vel certe lenè commodius est. Si malum inveteravit, athletico victu corpus firmandum est.

De viscerum morbis, & primo de Pulmone, deinde de Iocinore, tum de Liene, postremo de Renibus.

CAP. VII:

A Compagine verò corporis ad viscera transfundendum est, & in primis ad pulmonem veniendum, ex quo vehemens & acutus morbus oritur, quem peripneumonicon Græci vocant. Eius hæc conditio est. Pulmo totus afficitur, hunc eius casum subsequetur tussis, bilem vel pus trahens, præcordiorum, totiusque pectoris gravitas, spiritus difficultas, magna febres, continua vigilia, cibi fastidium, tabes. Id genus morbi plus periculi, quam doloris habet. Oportet, si satis validae vires sunt, sanguinem mittere: si minores, cucurbitulas sine ferro præcordiis admoovere. Tum si satis valet, gæstando agrum, digerere: si parum, intra domum tamen dimovere. Potionem autem hyssopi dare, cui sicus arida sit incocta, aut aquam mulsam, in qua vel hyssopum vel rusa decocta sit. Frictione vi diutissime in scapulis, proximè ab his

in brachijs, & pedibus, & cruribus, leniter contra
 pulmonem, idq; bis quotidie facere. Quod ad ci-
 bum verò pertinet, huic nec salsis opus est, neque
 acribus, neq; amaris, neq; alium astringentibus,
 sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est
 sorbitio ptisana, vel alica, vel oryza, cum qua re-
 cens adeps cocta sit. Cum hoc sorbile onum, nuclei
 quæ mul- pini ex melle, panis, vel elota alica, ex aqua mul-
 sa: potui deinde non solum pura aqua, sed etiam
 mulsa egelida: aut si æstas est, etiam frigida, nisi
 quid obstat. Hac autem altero quoq; die increscen-
 te morbo dare satis est. Ubi in incremento consti-
 tit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendū
 est, præterquam aqua egelida. Si vires desunt,
 adiuvanda sunt aqua mulsa, profuntq; adversus
 dolores imposita calida fomenta, vel qua simul &
 reprimunt & emolliunt. Prodest impositus super
 pectus sal bene contritus, cum cerato mistus, quia
 leniter cutem erodit, eoque impetum materiae, quæ
 pulmo vexatur, euocat. Utile etiam aliquod ma-
 lagma est ex his quæ materiam trahunt. Neque
 alienum est dum premit morbus, clausis sinistris
 agrum continere. Ubi paulum lenatus est, ter aut
 quater die, sinistris aliquanto apertis, paruum
 ærem recipere. Deinde in refectioe pluribus
 vetricum diebus à vino abstinere, gestatione, frictione vi-
 ri: vel, sorbitionibus, & prioribus cibis adycere, ex ole-
 runculo ribus porrū, ex carne ungulas, & sinima*: run-
 culorum, atque pisciculos, sic, ut diu nihil molle
 &

& lene sumatur.

De iocinoris morbo, & curatione. CAP. VIII.

Alterius quoq; visceris morbus, id est, iocinoris aequè modo longus, modò acutus esse consuevit, & πικτινὸν Græci vocant. Dextra parte sub præcordijs vehemēs dolor est, idemq; ad latus dextrum, & ad iugulum, humerumq; partis eiusdem peruenit, nonnunquam manus quoq; dextra torquetur, horror calidus est. Vbi male est, bilis euomitur, interdum singultus propè strangulat. Et hac quidem acuti morbi signa sunt: longioris verò, ubi suppuratio in iocinore est, dolorq; modò finitur, modò intenditur: dextra parte præcordia dura sunt, & tument, post cibum maior difficultas est, accedit maxillarum quadam resolutio, ubi inueterauit malum, venter & crura pedesq; intumescunt, pectus atque humeri, circaq; iugulum utrunq; extenuatur. Initio sanguinè mittere optimum est, tum venter soluendus est: si non potest aliter, per nigrum veratrum imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ reprimant, deinde calida quæ deducant, quibus rectè iris vel absinthium adijcitur, post hac malagma. Danda verò sorbitiones sunt, omnesq; cibi & calidi, & qui non multum alant, & sere qui pulmonis quoque dolori conueniunt, præterq; eos qui urinam mouent, potionesq; ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepeta, amyllum, sisamum, Lauri bacca, pini flos, herba

sang

sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, columba iecur recens & crudū. Ex quibus quadam per se esse, quadam adycere vel sorbitioni, vel potioni licet, sic tamen ut parcè assumantur. Neq; alienum est absinthii contritum ex melle, & pipere, eiusq; catapotium quotidie deuorare: abstinentum utiq; est ab omnibus frigidis: neq; enim res ulla magis iecur ledit. Frictionibus utendū in extremis partibus, vitandus omnis labor, omnis vehementior motus, ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, iētus, cursus, inimica sunt. Persusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est, calida: si aestas, tepida. Item liberalis vntio, & in balneo sudor. Si verò iecur vomica laborat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationibus. Quidā etiā contra id scalpello aperiunt, ipsam vomicam adurūt.

De lienis morbo, & curatione. CAP. IX.

AT lienis ubi affectus est, intumescit, simulq; cum eo pars sinistra, eaq; dura est, & prementi renititur, venter intentus est, aliquis etiam cruribus est tumor. Ulcera aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem vix recipiunt. In intenta ambulatione, cursuq; dolor, & quædam difficultas est. Hoc vitium quies auget. Itaque exercitatione & labore opus est, habita tamen ratione, ne fibre mista, si nimium processerit, excitetur. Vntiones, frictionesq; & sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt. Item

las

lac & caseus. Acida autem maxime conueniunt. Ergo acetum acce per se sorbere, & magis etiam, quod scilla cōditum est, expedit. Edenda sunt sal-samenta: vel olea ex muria dura tinēte in aceto Lactuca, intubiq; & betæ ex eodem, ex sinapi as-paragus, armoracia, pastinaca, vngula, rostra, aues macra, eiusdem generis venatio. Potui verò ieiunio dari debet absinthium incoctum, at post cibum aqua à ferrario fabro, in qua candens fer-rum subinde tinētum sit. Hac enim vel precipue lienem coërcet: quod animaduersum est in his ani-malibus, quæ apud hos fabros educata, exiguos lienes habent. Potest etiam dari vinum tenue, austerum, omniaq; in cibis & potionibus quibus urina mouenda sunt, precipueq; ad id valet, vel trifolij semen, vel cuminum, vel apium, vel serpil-lum, vel cythisus vel portulaca, vel nepeta, vel thymum, vel hyssopum, vel satireia. Hac enim inde commodissimè videntur humorem deduce-re. Lienis quoq; bubulus utiliter esui datur: præ-cipueq; crucea & nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoq; extrinsecus sunt, quæ leuent. Fit ex vnguento & palmulis, quod *μυροβλάτερον* Græci vocant. Fit ex lini & nasturtij semine, quo vinum & oleum adijcitur. Fit ex cypresso viri-di, & arida ficu. Fit ex sinapi, cui seui hircini à renibus quarta pars ponderis adijcitur, teriturq; in sale, & protinus imponitur. Multisq; modis huic rei capparari aptum est. Nam & ipsum cū ci-

bo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum fursuribus, aut ipsum cappari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoq; huic rei aptantur.

De renum morbis, & curationibus. CAP. X.

ATrenes ubi affecti sunt, diu male habent. Peius est, si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquirere, cubare molliter, solvere aluum, si aliter non respondet, etiam ducere: saepe desiderare in aqua calida, neque cibum, neque potionem frigidam assumere, abstinere ab omnibus salsis, acribus, acidis pomis, bibere liberaliter, adijcere modò cibo, modò potioni piper, porrum, ferulam, album papaver. Qua maxime inde urinam mouere consuerunt. Auxilio quoque his exulceratis sunt, si adhuc ulcera purganda sunt, cucumeris semina detrahtis corticibus sexaginta, nuclei ex pinu syluestri duodecim, anisi, quod tribus digitis sumi possit, croci paulum, contrita, & in duas mulsi portiones diuisa. Si verò dolor tantum lenandus est, eiusdem cucumeris semina triginta, ydem nuclei viginti, nuces Graecae quinque, croci paululum contrita & cum lacte potui data, * ac insuper quoq; recte quadam malagmata iniiciuntur, maximeq; ea, quae humori extrahendo sunt.

De intestinorum morbis, & primo de Cholera.

CAP. XI.

Avisceribus ad intestina veniendum est, quæ sunt & acutis, & longis morbis obnoxia. Primo aquæ facienda mentio est cholera, quia commune id stomachi, atq; intestinorum vitium videri potest. Nam simul & deicctio, & vomitus est, præterq; hæc inflatio est, intestina torquētur, bilis supra infraq; erumpit, primum aqua similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnunquam nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc *χολέρα* Græci nominarunt. Præter ea verò quæ supra comprehensa sunt, sæpe etiam crura manusq; contrahuntur, urget sitis, anima deficit: quibus concurrentibus non mirum est, si subito quis moritur. Neq; tamen ulli morbo minori memento succurritur. Protinus ergo ubi ista cæperunt, aqua tepida quàm plurimū bibere oportet, & vomere. Vix unquam sine vomitu sequitur, sed etiam si non incidit, miscuisse tamen novam materiam corrupta prodest, parsq; sanitatis est vomitū esse suppressum: si id incidit, protinus ab omni potione abstinendum est. Si verò tormina sunt, oportet frigidis, & humidis fomentis stomachum fovere: sed si venter dolet, iisdē egelidis, sic ut venter ipse mediocriter calentibus iunetur. Quòd si vehementer & vomitus, & deicctio, & sitis vexant, & adhuc subernata sunt quæ vomuntur, nondum vinum maturum tempus est, aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est, admonendumq; naritius est

pulegium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel mēta, si nondū matura est. At cū discussa cruditas est, tum magis verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugendum est ad vinum. Id esse oportet, tenue, odoratum, cum aqua frigida mīstum, vel polenta adiecta, vel melle quoque assumere expedit, quotiesq; aliquid aut stomachus, aut venter effudit, toties per hac vires restituere. Eras. Stratus primo tribus vini guttis, aut quinis aspergendam potionem esse dixit, deinde paulatim merum adijciendum. Is si & ab initio vinum dedit, & metum cruditatis secutus est, non sine causa fecit. Si vehementem infirmitatem adiuvare posse tribus guttis putavit, erravit. At si inanis est homo, & crura eius contrahuntur, interponenda potio absinthij est. Si extrema partes corporis frigent, ungenda sunt calido oleo, cui cera paulum sit adiectum, calidiq; fomentis nutrienda. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsam cucurbitula admoveenda est, aut sinapi super imponendum. Vbi his constitit, dormire oportet, postero die utique à potione abstinere, die tertio in balneū ire, paulatim se cibo reficere: somno, quiquis facile acquiescit, itemq; lassitudine, & frigore. Si post suppressam cholera febricula manet, alvum duci necessariū est, tum cibus, vinoq; utendum est, sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestina, stomachūq; versatur, sic ut cuius potiss

potissimum partis sit, non facile dici possit.

De Cœliaco ventriculi morbo. CAP. XII.

IN ipsius verò ventriculi porta consistit is, qui & longus esse consuevit, νομακας à Grecis nominatur. Sub hoc venter indurescit, dolorq; eius est. Alius nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Extrema partes frigesunt. Difficiliter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toto vètri imponere, ut dolorem leniant, post cibum vomere atque ita ventrē exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro ventri, & coxis admoovere. Ventrē ipsum liquare dato lacte, & vino salso frigido. Si tempus anni patitur, etiam viridibus ficis, sic tamen, ne quis aut cibus aut humor vniuersus detur, sed paulatim. Ergo per intervalla tēporis sat est cyathos binos ternosve sumere, & cibum pro portione huius commodeq; facit cyatho lactis cyathus aqua mistus, & succatus. Cibiq; instantes, & acres utiliores sunt, adeo ut lacti quoq; rectè contritū allium adijciatur. Procedēte vero tempore opus est gestari, maximeq; navigare, perfricari ter aut quater die, sic ut nitrum oleo misceatur, perfundi aqua calida post cibū, deinde sinapi imponere per omnia membra, excepto capite, donec arrodatur & rubeat, maximeq; si corpus durum & virile est, paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ ventrem comprimunt. Assa caro dāda, valens & quæ non facile

corrumpatur: potui verò pluvialis aqua decocta, sed quæ per binos ternosue cyathos bibatur. Si vetus vitium est, oportet læxer quàm optimi ad piperis magnitudinem denotare, altero quoq; die vinum, vel aquam bibere, interdum interposito cibo singulos vini cyathos sorbere, ex inferiori parte infundere pluvialem egelidâ aquam, maximeq; si dolor in imis partibus remanet.

De tenuioris intestini morbo. CAP. XIII.

INter ipsa verò intestina consistunt duo morbi, quorū alter in tenuiore, alter in pleniore intestino est. Prior acutus est. Insequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum $\chi\epsilon\gamma\delta\alpha\psi\omicron\upsilon$, plenioris $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\upsilon$ nominavit. * κωλι-
δρ A plerisq; video nunc illum priorem $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\upsilon$, hunc * $\chi\epsilon\gamma\delta\alpha\psi\omicron\upsilon$ nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem mouet. Fit ex alterutro loco inflammatio, nec alvus, nec spiritus infra transmittitur. Si superior pars affecta est, cibus: si inferior, stercus per os redditur: si utrumlibet vetus est, adicitur periculo vomitus biliosus, mali odoris, aut varius, aut niger. Remedium est sanguinem mittere, vel cucurbitulas pluribus locis admonere, nō ubiq; cute incisa. Id enim duobus aut tribus locis satis est. Ex cæteris spiritum eu care, abunde est. Tum animaduvertere oportet, quo loco malum sit. Solet enim contra id timere. Et si supra umbilicum est, alui ductio utilis non est. Si infra est, aluum ducere

ducere (ut Er. siſtrato placuit) optimum eſt . & ſape id auxilij ſatis eſt . Ducitur autem percolato ptifana cremore cum oleo & melle , ſic ut præter ea nihil adijciatur . Si nihil tumet , duas manus imponere oportet , ſupra ſummum vētrem , paulatimq; deducere . Inuenietur enim mali locus qui neceſſe eſt renitatur : & ex eodem deliberari poterit , ducenda ne ſine alius ſit . Illa communia ſunt , calida cataplaſmata admoovere , eſq; imponere à mammis uſq; ad inguina , & ſpinam , ac ſape mutare : brachia , cruraq; perfricere , demittere totum hominem in calidum oleum . Si dolor non quieſcit , etiam in aluum ex parte inferiore tres , aut quatuor cyathos calidi olei dare . Ubi per hæc conſecuti ſumus , ut iam ex inferiore parte ſpiritus tranſmittatur , offirre potui muſum tepidum non multum . Nam ante magna cura vitandum eſt , ne quid bibat . Si id commodè creſcit , adycere ſorbitiōem . Ubi dolor & fibrilla quierunt , tum demum vi cibo plenior , ſed neq; inſtante , neq; dero neq; valido , ne inteſtina adhuc imbecilla ladantur , potui vero nihili præterquàm puram aquam . Nam ſine quid vinolentum , ſine acidum eſt , id huic morbo alienum eſt . Ac poſtea quoq; vitare oportet balneum , ambulationem , geſtationem , ceteroſq; corporis motus . Nam facile id malum redire conſuevit , & ſine cum frigore ſubit , ſine aliqua iactatio , niſi bene iam conſirmatis inteſtinis , reuertitur .

De morbo intestini plenioris. CAP. XIII I.

IS autem morbus, qui in intestino plenior est, in ea maxime parte est, quam cacam esse proposui. Vehemens inflatio, vehementes dolores dextra magis parte, intestinum quod verti videtur, propè spiritum elidit. In plerisque post frigora, cruditatesq; oritur, deinde quiescit, & per atatem saepe repetens, sic cruciat, ut vita spatio nihil demat. Ubi is dolor caput, admonere sicca & calida fomenta oportet, sed primo lenta, deinde validiora, simulq; frictiones, ad extremas partes, id est, crura, brachiaq; materiam revocare. Si disensus non est, qua dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei caussa comparatum, quod nonnòp nominatur. Id se reperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest potui datum, sed impositum quoq; extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem leuat. Nisi finito vero tormento, recte neq; cibus neq; potio assumitur. Quo victu sit utendum, qui hoc genere tentantur, iam mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod nonnòp nominatur, ex his constat: Costi, anesi, castorei, singulorum P. denariorum I I I. ✱. petrosclini P. denariorum I I I. piperis longi, & rotundi, singulorum P. ✱. I I. papaveris lacrymae, iunci rotundi, myrrhae, nardi, singulorum P. V I. ✱. quae melle excipiuntur, id autem & dehorari potest, & ex aqua calida sumi.

De Torminibus, id est, *δυσωστίς*. CAP. XV.

Proxima his inter intestinorum mala, tormina esse consueverunt, *δυσωστίς* Grace vocatur, intus intestina exulcerantur. Ex his cruor manat. Isq; modò cum stercore aliquo semper liquido, modò cum quibusdam quasi mucosis excernitur, interdum simul quaedam carnosae descendunt. Frequens deijciendi cupiditas, dolorq; in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur. Atq; eo quoq; tormentum intenditur. Idq; post tēpus aliquod levatur, exiguaq; requies est, somnus interpellatur, febricula oritur, longoq; tempore id malum cum inucteraverit, aut tollit hominē, aut etiam (si finitur) excruciat. Oportet in primis cōquiescere. Siquidem omnis agitatio exulcerat, deinde ieiunii sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquesfolij sit adiecta, imponere cataplasmata super ventrem, quae reprimunt, quod in superioribus ventris morbis non expedit, quotiesq; desidit, subnere aqua calida, in qua decocta verberna sint, portulacam vel coctam, vel ex dura muria edissc, cibos, portionesq; eas, quae astringunt alui. Si vetustior morbus est, ex inferioribus partibus tepidum infundere, vel ptisana cremorē, vel lac, vel adipem liquatā, vel medullam cerninā, vel oleum, vel cum rosa bulyrum, vel cum eadem album crudū ex onis, vel aquā, in qua lini semen decoctū sit: vel si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in qua rosa floris folia

folia cocta sint. Leuât enim dolorē hac, & mitiora ulcera efficiunt: maximeq; utilia sunt, si cibi quoq; secutum fastidiū est. Thymison muria dura quam asperissima sic vrendum memorix prodidit. Cibi verò esse debent, qui leniter ventrem distringant, & ea quæ urinam moueāt. Si ea cōsecuta sunt, in aliam partem humorem auertēdo, prosunt: si non sunt consecuta, noxā augent. Itaq; nisi in quibus prōptē id facere consueuerunt, non sunt adhibenda. Potui si febricula est, aqua pura calida, vel ea quæ ipsa quoq; astringat, dari debet: si non est, vinum lene, austerum. Si pluribus diebus nihil remedia alia iuuerūt, vetusq; iam vitium est, aqua bene frigida potio assumpta ulcerā astringit, & initiū secunde valitudinis facit. Sed ubi venter suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est. Solet autē interdum etiam putris sanies pessimiq; odoris descendere, solet purus sanguis profluere. Si superius vitium est, aluus aqua mulsa duci debet, tūc deinde eodem infundi, quæ suprā comprehensa sunt. Valensq; est etiā aduersus ulcera intestinorum minij gleba, cum salis hemina contrita. Si minus, mista his aqua in aluū datur. Ac si sanguis profluit, cibi potionesq; esse debent, quæ astringant.

De laxitate intestinorum.

CAP. XVI.

EX torminibus interdum intestinorum laxitas oritur, quæ continere nihil possunt, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddunt.

reddunt. Id interdum agros trahit, interdum
 precipitat. In hoc utiq; adhibere oportet compri-
 mentia, quò facilius tenendi aliquid intestinis
 vis sit. Ergo & super pectus ponetur sinapi, exul-
 cerataq; cute, malagma, quod humorem euocet,
 & ex verbenis decoctis aqua desidat, & cibos,
 potionesq; assumat, qua aluum astringunt, &
 frigidis vitetur persusionibus. Oportet tamen pro-
 spicere, ne simul his omnibus admotis vitium con-
 trarium per immodicas inflationes oriatur. Pau-
 litim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus
 quotidie adiectis. Et cum in omni fluore ventris,
 tum in hoc precipue necessarium est, non quoties
 libet desidere, sed quoties necesse est, ut hac ipsa
 mora in consuetudinem ferendi oneris intestina
 deducat. Alterum quoq; quod aequè ad omnes si-
 miles affectus pertinet, in hoc maxime seruand-
 um est, ut cum pleraque utilia insuauia sint,
 qualis est plantago, & rubi, & quicquid mali-
 corio mistum est, ea potissimum ex his dentur,
 qua maxime ager volet. Deinde si omnia ista
 fastidiet ad excitandam cibi cupiditatem inter-
 ponatur aliquid minus utile, sed magis gratum.
 Exercitationes, frictiones huic quoq; morbo ne-
 cessarie sunt, & cum his sol, ignis, balneum, vo-
 mitus (ut Hippocrati visum est) etiam albo ve-
 ratro (si cetera parum proficiunt) euocatus.

Desidat,
 subaudi æ-
 ger: sic in-
 frà cap.
 proxi.

De Lumbricis aluum occupantibus.

C A P.

XVII.

Nonn

Nonnunquam autem lumbrici quoq; occurrant alium, hiq; modo ex inferioribus partibus, modo sædus ore redduntur. Atq; interdum latos eos, qui peiores sunt, interdum teretes videmus. Si lati sunt, aqua potui dari debet, in qua lupinum aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectum sit, contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scamonea paulum. Vel etiam pridie cum multum allium ederit, vomat. Posteroq; die mali punici tennes radículas colligat, quantum manu comprehendet, easq; contusas in aqua tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adiciat nitri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas portiones sumit, aut aquæ, vel muria dura sic adiectæ, tum desidat subiecta calida aqua in pelue. Si vero teretes sunt, qui pueros maxime exercet, & eadem dari possunt, & quadam leuiora, ut contritum semine urinae, aut brassicae, aut cumini cum aqua, vel menta cum eadē, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex aqua malsa, vel nasturtij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, in alium & allium prodest, vel* malua oleum subter dedisse.

De tymopæ intestinorum morbo.

C A P. XVIII.

Est autem aliud leuius omnibus proximis, de quibus supra dictum est, quod tymopæ Græci vocant, id neq; acutis, neq; longis morbis annumerari debet, cum & facile tollatur, neque nunquam

unquam per se ingulet, in hoc aquè atq; in torminibus frequens desidendi cupiditas est, aquè dolor ubi aliquid excernitur. Descēdunt autē pituita, mucisq; similia, interdū etiam leuiter subruenta: sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoq; recte coacta: desiderare oportet in aqua calida, sæpiusq; ipsum manus nutrire, cui plura medicamenta idonea sunt, butyrū cum rosa, acacia ex aceto liquata, emplastrū id, quod τετραφάρμακον Græci vocant, rosa liquatū, alumen lani circumdatum, & ita appositum, eademq; ex inferiore parte indita, qua torminum auxilia sunt, eadem verbena decoctia, ut inferiores partes foueantur, alternis verò diebus aqua, alternis leue aut austerum vinum bibendum est. Potio esse debet egelida & frigida: prior ratio victus talis, qualē in tormina suprā præcepimus.

De ventris fluxu, & curatione. CAP. XIX.

LExior etiam dum recens deiectio est, ubi & liquida aluus, & sæpius quàm ex consuetudine feritur: atq; interdum tolerabilis dolor est, interdum grauissimus, idq; peius est: sed vno die fluere aluum sæpe pro valetudine est, atq; etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, & quod intus lesurum erat, citiliter effunditur, verum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas excitat, viresq; consumit: primo die quiescere satis est, neq; impetum ven-

tris

trū prohibere : si per se desit, balneo uti, paulum cibi capere : si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die si nihilominus liquida alius est, aquè conquiescere, paulum astringentis cibi sumere, tertio die in balneum ire, vehementer omnia præter ventrem perfricare, ad ignem lumbos, scapulasq; admonere, cibis uti, sed ventrem contrahentibus, vino non multum meraco. Si postero quoque die fluxit, plus edissè, sed vomere etiam ex toto, donec conquiescat. Contra sitim, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, ut post hanc animi diversionem alius non contrahatur. Alia via est ubi velis suppressere, canare, deinde vomere, postero die in lecto conquiescere, vesperi ungi, sed leniter, deinde panis circa selibram, ex vino amineo mero sumere, tum assum aliquid, maximeq; auem, & postea vinum idem bibere aqua pluviâli mustum, idq; usq; ad quintum diem facere, iterumq; vomere. Frigidam autem assiduè potionem esse debere, contra priores autares Asclepiades affirmavit, & quidem quàm frigidissimam. Ego experimentis quæq; in se credere debere existimo, calida potius an frigida utatur. Interdum autem evenit, ut id pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere, deinde

* oleo postero die vesperi, tepido* loco ungi, cibū modicum assumere, vinū meracum quàm asperrius, impositā super ventrem habere cum cerato rutam.

tam. In hoc autem affectu corporis neq; ambulatione, neq; frictione opus est, vehiculo sedisse, vel magis etiam equo prodest. Neq; enim vlla res magis intestina confirmat. Si verò etiam medicamentis, utendum est, aptissimum est id quod ex pomis fit. Vindemia tempore in grande vas conijceinda sunt pira, atq; mala sylvestria: si ea non sunt, pira tarentina viridia, vel signina, mala scandiana vel amerina, myrrappia, hisq; adijcienda sunt cotonea, & cū ipsis corticibus suis punica, sorbo, & quibus magis utimur, etiam torminalia, sic ut hac tertiam olla partem teneant, tum deinde ea musto implenda est, coquendumq; id, donec omnia qua indita sunt, liquata in unitatem quædam cōeant. Id gustui non insuave est, & quandocunq; opus est, assumptum leniter, sine vlla stomachi noxa ventrem tenet: duo aut tria cochlearia vno die sumpsisse, satis est. Alterum valentius genus est, myrti baccas legere, ex his vinum exprimere, id decoquere, ut decima pars remaneat, cuiusq; cyathum sorbere. Tertium quod quādoq; furi potest, malum punicum excavare, exemptisq; omnibus seminibus, membranas qua inter ea fuerunt, iterum conijcere, tum infundere cruda ona, rudiculaq; mīscere, deinde malum ipsum super prunum imponere, quod dum humor intus est, non adurit. Vbi siccū esse capit remouere oportet, extrahimq; cochleari, quod intus est, disse. Aliquibus adiectis maius momentum habet. Itaq; etiam

Myrrhap
pia Plin
ab odo
dicta e
dicit, li.
cap. 15.

orio quæ
stringat.

in piperatum coniicitur, misceturq; cum sale, & pipere: est quid ex his edendum, est pultrix etiã, cum qua paulum ex feno vetere coctum sit, & lenticula cum malo corio cocta, rubiq; cacumina in aqua decocta, & ex oleo atq; aceto assumpta, efficacia sunt, atq; ea aqua, in qua vel palmule, vel malum cotoneum, vel arida sorba, vel rubi decocti sunt, potata. Quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quæ astringat. Tritici quoq; hemina in vino amineo austero decoquitur, idq; triticum ieiuno, ac sitiienti datur, superq; id vinum id sorbetur, quod iure valentissimis medicamentis annumerari potest, atq; etiam potui datur vinum signinum, vel resinatũ austerrum, vel quodlibet austerrum. Contunditurq; cum corticibus, seminibusq; suis punicum malum, vinoq; tali miscetur, idq; vel merum sorbet aliquis, vel bibit mistum. Sed medicamentis uti, nisi in vehementibus malis superuacuum est.

De vulvæ morbo, & curationibus. CAP. XX.

EX vulva quoque feminis vehemens malum nascitur, proximeq; ab stomacho vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, ut tanquam comitiali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eò quod neque oculi vertuntur, nec spuma profluunt, nec nervi distenduntur, sopor tantum est, idq; quibusdam feminis crebro reuertens, perpetuum est. Ubi incidit, si satis virium est, sanguis missus adiuvat.

Si parum est, cucurbitula tamen defigenda sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut aliqui iacere cōsuevit, admonere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentū, vel aliud ex his quæ sœdioris esse odoris retuli, quod mulierem excitet. Idemq; aqua frigida perfusio afficit, adiunq; ruta cōtrita cum melle, vel ex cyprino ceratum, vel quodlibet calidum & humidum cataplasma, naturalibus pubetenus impositum. Intra hæc etiam perfricare coxas, & poplites oportet. Deinde ubi ad se redit, circumcidendum vinum est in totum annum, etiam si casus idem non reuertitur. Frictione quotidie utendum totius quidem corporis, præcipuè verò vëtris & poplitū. Cibus ex media materia dandus. Sinapi super iunum ventrem, tertio quoq; , aut quarto die imponendum donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire commodè videtur solanum in lac demissum, deinde contritum, & cara alba, atq; medulla ceruina cum irino, aut seuum iaurinū, vel caprinum cum rosa mistum. Dandum potui etiā vel castoreum est, vel git, vel anethum. Si parū putra est, purgatur iunco quadrato: si verò vulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet, & recens suilli adeps, & ex ouis album misceatur, idq; opponatur, vel album ex ouo cum rosa mistū, edicto quo facilius consistat, contrita rosa pulvere. Dolens verò ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitule cute incisa

p 2 inguin

inguinibus, vel etiam sub mammis admota: si
 iūtia maligna purgatio est, subijcienda sunt, * co-
 ercentia. Id faciunt etiam alba olina, & nigrum
 papaner cum melle assumptum, & gummi cum
 trito semine apij liquatū, & cum cyatho passi da-
 tum. Præter hæc in omnibus vesicæ oderibus ido-
 neæ potiones sunt, quæ ex doloribus fiunt, id est
 spica nardi, croco, cinnamomo, casia, similibusq;.
 Idemq; etiam decocta lentiscus præstat. Si tamen
 intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiam
 sanguinis detractio apta est, aut ceriè coxis admo-
 ta cucurbitula cute incisa. At cum urina super
 potionum modū etiam sine dolore profluens, ma-
 sciem, & periculū facit, si tenuis est, opus est exer-
 citatione & frictione, maximeq; in sole vel ad
 ignem. Balneū rarum esse debet, neq; longa in co-
 mora, cibus comprimens. Vinū austerum meracū,
 per æstatem frigidum, per hyemem egclidum, sed
 tantū, quantum minimū sit. Infima alvus quoq;
 vel ducenda, vel lacte purgāda est. Si crassa uri-
 na est, vehementior esse debet & exercitatio, &
 frictio, longior in balneo mora cibus opus est tene-
 ris, vinum idem. In utroq; morbo vitanda omnia
 sunt, quæ urinam mouere consueverunt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus.

CAP. XXI.

Est etiam circa naturalia vitium, nimia
 profusio seminis, quod sine venere, sine no-
 cturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spa-
 tio

tio tale hominem consumat. In hoc affectu salutare sunt vehementes frictions, perfusiones, nationesq; quam frigidissima, neq; cibi, nec potio, nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet cruditates, omnia infantia, nihil ex his assumere, quæ contrahere semen videntur, qualia sunt, siligo, simila, oua, alica, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, crucca, bulbi, nuclei pinei. Neque alienum est fovere inferiores partes, aqua decocta ex verbenis comprimentibus, ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibusq; circumdare, præcipueq; ex aceto rutam vitare, etiam ne supinus obdormiat.

De coxarum morbis, & curationibus.

C A P. XXII.

Superest ut ad extremas partes corporis veniam, quæ articulis inter se conscruntur, initium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit. Isq; hominem saepe debilitat, & quosdam non dimittit. Eoq; id genus difficillime curatur, quod ferè post longos morbos vis pestifera huc se inclinat, quæ ut illas partes liberat, sic hæc ipsam quoq; affectam prehædit. Fovendum primum aqua calida est, deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse videtur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mistus capparis cortex concisus vel lolij farina ex vino diluto decocta, & * quæ mista cum acida fece. * quæ, quia refrigerant impo- refrigerare nocturno malagmata cõmodius est. Inula quoq; scunt

radix contusa, & ex vino austero postea cocta, & late super coxam imposita, inter valētissima auxilia est. Si ista non soluerunt, sale calido & humido utendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admouenda sunt cucurbitula, metienda vrina. Alius sic cōpressa est, ducenda. Ultimum est, & in veteribus quoq; morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam, cutem cādentibus ferramentis exulcerare. Sed frictione quoq; utendum est, maxime in sole, & eodem die sapius: quò facilius ea, qua cōcundo nocuerunt, dirigantur. Eaq; si nulla exulceratio est, etiā ipsis coxis, sicut & ceteris partibus adhibēda est. Cūm verò saepe aliquid exulcerādum cādenti ferramēto sit, ut materia inutilis euocetur, illud ppetuū est, nō ut primum fieri potest, huius generis ulcera sanare, sed ea trahere, donec id vitium, cui per hac opitulantur, conquiescat.

De genuum doloribus, & cura. CAP. XXIII.

COxis proxima genera sunt, in quibus ipsis nonnūquam dolor esse consuevit. In eisdem autem cataplasmatibus, cucurbitulisq; praesidium est, sicut etiam cū in humeris, aliquis commissuris dolor aliquis exortus est. Equitare ei cui genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes autem eiusmodi dolores, ubi inueterauerunt, vix citra vstionem finiuntur.

De articulorum doloribus, in manibus, pedibusq;.

CAP. XXIIII.

IN manibus pedibusq; articularum vitia frequentiora, longioraq; sunt, quae in podagris, chiragrisve esse consueverunt. Ea raro vel castratos, vel pueros ante saemina coitum, vel mulieres, nisi quibus mensiua suppressa sunt, tētant. Ubi sentiri coeperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter iničia statim factum, saepe annuam, nōnunquam perpetuam valetudinem totam praestat. Quidam etiam cū asinino * lotio epoto se eluissent, in perpetuum hoc malum euaserunt. Quidam cum toto anno à vino, mulso, venere sibi temperassent, securitatem totius vita cōsecuti sunt. Idq; utiq; post primum dolorem seruandū est, etiam si quieuit. Quod si iam consuetudo eius facta est, potest quidem aliquis esse securior his temporibus, quibus dolor se remisit. Maiorē verò curam adhibere debent hi, quibus id reuertitur. Quod frē vere, autumnōve fieri solet. Cū verò dolor non vrget, manu gestari debet, deinde ferri, inambulatione leui se dimouere: & si podagra est, interpositis temporibus exiguis inuicē modò sedere, modò ingredi, tum antequam cibū capiat, sine balneo loco calido leuiter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida, deinde cibum sumere ex media materia interpositis rebus urinā mouentibus, quotiesq; plenior est, euomere. Ubi dolor vehemens vrget, interest sine tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor iā etiā obcaluerit. Nam si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquā marinā, vel mu-

* lact.

idure-
nt
in hoc
tidie
m.

riam durā firuēficere oportet, deinde in peluē
conijcere, & cum iam homo pati potest, pedes de-
mittere, superq; pallam dare, & vestimento tege-
re, paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadē
aqua leuiter infundere, ne calor intus destituat,
ac deinde noctu cataplasmata calefacta impo-
nere, maximeq; hibiſci radicem ex vino coctam.
Sin verò tumor calorq; est, utiliora sunt refrige-
rantia, recteq; in aqua quā frigidissima articu-
li continentur: sed neq; quotidie, neque diu fit, ne
nerui^{*} laedantur. Imponendum vero est cataplas-
ma quod refrigeret. Neq; tamen^{*} in hoc ipso per-
manendum, sed ad ea tranſeundum, quæ sic reprimunt,
ut emolliant. Si maior est dolor, papaueris
cortices in vino coquendi, miscendiq; cum cerato
sunt, quod ex rosa factum sit. Vel cera, & adipis
suilla tantūdem una liquandum, deinde his vi-
num miscendum, atq; ubi quod ex eo impositum
est, incaluit, detrahendum, & subinde imponen-
dum aliud est. Si verò tumores etiam obcaluerūt,
& dolent, leuat spongia, quæ imposita subinde ex
oleo, vel aceto, vel aqua frigida exprimitur, aut
pari portione inter se mista, pix, cera, alumen. Sūt
etiam plura idonea manibus, pedibusq; malag-
mata. Quod si nihil superimponi patitur, id
quod sine tumore est, fouere oportet spongia, quæ
in aquam calidam demittatur, in qua vel papa-
ueris cortex, vel cucumeris syluestris radix de-
cocta sit, tum inducere articulis crocum cum suc-
co pap

co papaveris, & ouillo lacte. At si tumor est, fo-
 ueri quidem debet aqua* calida, in qua lētiscus, * egelida
 aliāve verbenā ex reprimētibz decocta sint:
 induci verò medicamentum ex nucibus amaris
 cum aceto tritis, aut ex cerussa, cui contrita herba
 muralis succus sit adiēctus. Lapis etiam qui carnē
 exedit, quem *σάπνοφάγορ* Graci vocant, excisus,
 sic, ut pedes capiat, demissos eos cum dolent, retē-
 tosq; ibi lenare consuevit. Ex quo in Asia lapidi
 * *Asio* gratia est. Vbi dolor, & inflāmatio se re-
 miserunt, quod intra dies quadraginta fit, nisi vi-
 tium hominis acceſsit, modicis exercitationibus,
 abstinentia, vnctionibus lenibus utendum est: sic,
 ut etiam *aiopo*, vel liquido cerato cyprino articu-
 li perfriētur. Equitare podagricis quoq; alienum
 est. Quibus verò articulorum dolor certis tempo-
 ribz reuertitur, hos antē & curioso victu cane-
 re oportet, ne inutilis materia corpori supersit, &
 crebriore vomitu, & si quis ex corpore metus est,
 vel alui ductione uti, vel lacte purgari. Quod
 Erasistratus in podagricis expulit, ne inferiores
 partes factus cursus pedes replet, cūm euidens
 sit omni purgatione non superiora tantummodo,
 sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocunque au-
 tem morbo quis inualeſcit, si tardē confirmatur,
 vigilare prima luce debet, nihilominus in lecto
 conquiescere, circa tertiam horam leniter vnctis
 manibus corpus permulcere. Deinde delectationis
 causa (quantum iuuat) ambulare, circūcisa o-

nni negotiosa cogitatione vel aetione, tum gestari diu, multa fricatione uti, loca, cælum, cibos sepe mutare. Vbi triduo, quatrduove vinum bibit, uno aut etiam altero die interponere aquam. Per hac enim fiet, ne in vitia tabi in infirmitia incidat, & ut maturè vires suas recipiat. Cum ex toto verò conualuerit, periculosè vita genus subito mutabit, & inordinatè aget. Paulatim ergo debet omiſſis his legibus, eò transire, ut arbitrio suo vivat.

LIBER V.



DIXI de his malis corporis, quibus victus ratio maxime subne- nit. Nunc tranſeundum eſt ad eam medicina partem, qua magis me-

* pugnat dicamentis* purget. His multum antiqui auctores tribuerunt, & Erasistratus, & hi qui se Empiricos nominaverunt, præcipuè tamen Herophilus, deductiq; ab illo viri, adeo ut nullum morbi genus, sine his curarent. Multaq; etiam de facultatibus medicamentorum memoria prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andrea, vel Apolloni, qui Mys cognominatus est. Horum autè usum ex magna parte Asclepiades, non sine causa sustulit: & cum omnia firè medicamenta stomachum ledant, maliq; succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transi-

anstulit. Verum ut illud in plerisq; morbis vitiosum est, sic multa admodum corporibus nostris invidere consuerunt, quae sine medicamentis ad sanitatem pervenire non possunt. Illud ante omnia curare convenit, quod omnes medicinae partes ita annexa sunt, ut ex toto separari non possint, sed ab eo nomen trahant, à quo plurimum petunt. Ergo ut illa quae vitium curat, aliquando medicamentum adhibet, & illa quae praecipue medicamentis * purgat, adhibere etiam rationem vitii * pugnae debet, quae multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac saepe simplicia opitulentur, saepe mista, non alienum videtur ante proponere & nomina, & vires, & mixturas eorum, quo minor ipsius curationis ex sequentibus mora sit.

De simplicibus facultatibus quarumcunque rerum, ex quibus medicamenta fiunt, & primo de his quae sanguinem supprimunt. CAP. I.

Sanguinem supprimunt, atramentum sutorium, quod Graeci χαλκανωλον appellant, chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloë, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta vel cimolia vel figularis, misq; frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, squamae & ferri, & aris, atque huius quoque duae species sunt, alia tantum aris, alia rubri aris.

Quae vulnus glutunt.

CAP. II.

Glutin

Glutinant vulnus, myrrha, thus, gūmi, pra-
cipueq; acanthinum psillenm, tragacantha,
cardamomum, bulbi, lini semen, nasturtium, oui
album, gluten, ichthyocolla, vitis alba, contusa cū
testis suis cochleæ, mel coctū, sponsia, vel ex aqua
frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa, ex is-
dem lana succida, si levis plaga est, etiam aranea:
reprimunt alumen & scissile (quod *oxisip* voca-
tur) & liquidum, melinum, auripigmentum, er-
go, chalcitis, atramentum sutorium.

Quæ concoquant, & moueant pus. CAP. III.

Concoquant & mouent pus, nardum, myr-
rrha, costus, balsamum, galbanum, propolis,
styrax, thuris & fuligo, & cortex, bitumen, pix,
sulphur, resina, sebum, adeps, oleum.

Quæ aperiant vulnera. CAP. IIIL.

Vulnera aperiunt tanquam ora in corpori-
bus, quod *τομα* Grace dicitur, cinnamo-
mum, balsamum, panaces, iuncus quadratus, fu-

*bdella legium, flos alba viola, *bdellium, galbanum, re-
sina terebinthina, & pinea, propolis, oleum ve-
aminia tus, piper, pyrethrum, chamæpitys, vna taminia,
sulphur, alumen, ruta semen.

Quæ purgant. CAP. V.

Purgant, erugo, auripigmentum, quod *ἀπο-
ρινος* à Grecis nominatur. Huic autem &
sindaraca in omnia, eadem vis, sed validior est.
squama aris, pumex, iris, balsamum, styrax, thus,
thuris cortex, resina & pinea, & terebinthina li-
quida

quida, ænanthe, lacerti stercus, sanguis colum-
 te, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum
 bdellium, quod in omnia idem quod ammonia-
 cum potest, sed valentius est, abrotanum, ficus
 arida, coccum gnidium, scobis eboris, omphacium
 radícula, coagulum, sed maxime leporinum, cui
 eadem quæ cæteris coagulis facultas, sed ubiq; va-
 lidior est, fel, vitellus crudus, cornu ceruinum, glu-
 ten taurinum, mel crudum, misy, chalcitis, cro- * aminia
 cum, uua^{*} taminia, abrotanum, spuma argenti,
 galla, squama aris, lapis hamatites, minium, co-
 stum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ru-
 ta, porrum, lenticula, eruum.

Quæ rodant.

CAP. VI.

R Odunt, alumen liquidum, sed magis rotun-
 dum, arugo, chalcitis, misy, squama aris, sed
 magis rubri, as combustum, sandaraca, minium
 Synopicum, galla, balsamum, myrrha, thuris cor-
 tex, galbanum, resina terebinthina humida, piper
 utrunq; sed rotundum magis, cardamomum, eu-
 ripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij
 semen, narcissi radix, omphacium, alcyonium,
 oleum ex amaris nucibus, allium, mel crudum,
 vinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, sca-
 monea, uua taminia, cinnamomum, styrax, cicu-
 ta semen, resina, narcissi semen, fel, nuces amara,
 oleumq; earum, ætramentum sutorium, chryso-
 colla, veratrum, cinis.

Quæ exedant corpus.

CAP. VII.

Exid

EXedunt corpus, acacia succus, hebenus, arugo, squama aris, chryso. olla, cinis Cyprius, natrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, cicuta, sandaraca, salamandra, alcyonium, aris flos, chalcitis, atramentum sutorium, ochra, calx, acetum, galli, alumen, lac caprisui, vel lactuca marina, quæ rithymallos à Græcis nominatur, alcyonium, fel, thuris, fuligo, spodium, lenticula, mel, olea folia, martianum, lapis hematites, & Phrygius, & Asiæ, & Sisyrius, misy, vinum, acetum.

Quæ adurant.

CAP. VIII.

ADurant, auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, misy, arugo, calx, charta combusta, sal, squama aris, fixa combusta, myrrha, stercus & lacerti & columba, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum Guaidium, alium, diphryges, lac utrumque (quod proximo capite suprà comprehensum est) veratrum & albulum & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, rhus, salamandra, crucea, sandaraca, vustaminis, chysocolla, ochra, alumen scissile, onidium, stercus, ananthe.

Quæ crustas ulceribus inducant. CAP. IX.

EAdem fere crustas ulceribus tanquam igne adustis inducunt, sed præcipue chalcitis, utiq; si cocta est, flos aris, arugo, auripigmentum, misy, & id, quo magis coctum.

Quæ crustas ulceribus resoluant. CAP. X.

Crustæ

Crustas verò has, resoluit farina triticea cū cruta, vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discutiant ea, quæ in aliqua parte corporis coierunt.

CAP. XI.

Ad discutienda verò ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt, maxime possunt, abrotanum, helenium, amaracus, alba viola, mel, liliū, * sanfucus, cyperus, lic, sertula campana, ser * sampsis pillum, cupressus, cedrus, iris, viola purpurea, narcisus Cyssius, rosa, crocū passum, iuncus quadratus, nardum, cinnamomum, casia, ammoniacum, cera, resina, vua taminia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini, & narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut molaris, crudus vitellus, amara nuges, sulphur.

Quæ euocent, & educant.

CAP. XII.

Evocat & educit, ladanum, alumen rotundum, hebenes, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina & pinea, propolis, ficus arida decocta, sterus columbe, pumex, farina lolij, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri bacca, nitrum, sal.

Quæ exasperata leuent.

CAP. XIII.

Leuat id quod exasperatū est, spodium, hebenus, gummi, oui album, lac, tragacanthum.

Quæ carnem nutriant, & vlcus impleant.

CAP. XIII.

Carnē alunt, & vlcus implet, resina pinea, * ochra, alicia, mel, asteriace, cera, butyru. * ochra alicia, vlcus implet, resina pinea, * ochra, alicia, mel, asteriace, cera, butyru. * ochra alicia, vlcus implet, resina pinea, * ochra, alicia, mel, asteriace, cera, butyru.

Quæ molliant.

CAP. XV.

Moll

*erythria

Molluent, as combustum, terra * cretria, nitrum, papaveris lacryma, ammoniacum, bdellium, cera, sebum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum, sertula Campana, narcissi & radix & semen, rosa folia, coaguli, vitellus crudus, amara nuces, medulla omnis, stibi, pix, cochlea costae, cicuta semen, plumbi retrementum, onocia p. αἰψός Graci vocant, panaces, cardamomum, galbanum, resina, vua taminia, styrax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, butyri, ruta.

Quae cutem purgent. CAP. XVI.

Cutem purgat mel, sed magis, si est cum galla, vel eruo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel arugine.

De misturis simplicium rerum, & de ratione ponderum, & quid Malagma, & Emplastrum, & Pillulos inter se differant. CAP. XVII.

Expositis simplicibus facultatibus, dicendum est quemadmodum misceantur, quae ex his fiant. Miscentur autem varie, neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur, alia adijciuntur, iisdemque servatis, poterum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt, quae comprehendere si possent, tamen esset superuum. Nam & iidem effectus inter paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet (cognitis facultatibus) facile est. Itaque contentus his ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quae vel desiderari in prioribus pot

potuerunt, vel ad eas curationes pertinent, quas
 protinus hic comprehendam, sic ut tamen quæ ma-
 gis communia sunt, simul iungam. Si quæ singu-
 lis, vel etiam parvis accommodata sunt, in ipso-
 rum locum differam. Sed & antea sciri volo, in
 uncia pondus denariorum septem esse. Vnius deinde Vncla.
 denarij pondus dividi à me in sex partes, id est sex Denarii
 uncias, ut idem in uncia denarij habeam, quod
 Græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellant. Id ad
 nostra pondera relatum, paulo plus dimidio scru-
 pulo facit. Malagmata verò, atq; Emplastra Pa-
 stilliq; (quos τρωχίσματα Græci vocant) cum pluri-
 ma eadem habeant, differunt eo, quod Malagma-
 ta maximè ex floribus, earumq; etiam succulis:
 Emplastra Pastilliq; magis ex quibusdam metal-
 licis fiunt: deinde malagmata confusa abunde mol-
 lescent: nam super integram cutem injiciuntur.
 Laboriose verò conteruntur ea, ex quibus empla-
 stra pastilliq; fiunt, ne ledant vulnera cum im-
 posita sunt. Inter Emplastrum autem, & Pastillum
 hoc interest, quod Emplastrum utiq; liquati ali-
 quid accipit, in Pastillo tantum arida medica-
 menta aliquo humore iunguntur. Tum Empla-
 strum hoc modo fit, arida medicamenta per se te-
 runtur, deinde mistis bis instillatur aut acetum,
 aut si quis alius non pinguis humor accessurus est,
 & ea rursus ex eo teruntur. Ea verò quæ liquari
 possunt, ad ignem simul liquantur, & si quid olei
 misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam

aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt, quae separatim fieri debuerunt, in unum omnia miscentur. At Pastilli haec ratio est: Arida medicamenta contrita humore non pingui, aut vino, vel aceto coquantur, & rursus cocta, inarescunt. Atq; ubi utendū est, eiusdē generis humore
 *pastillis diluuntur, tū Emplastrum imponitur, *pastillus illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.

DE MALAGMATIS.

CAP. XVIII.

Malagma aduersus calidas podagras.

His cognitis, primum malagmata subiiciam, quae ferè non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit, ad calidas podagras aptum. Habet galle & immatura & alterius, coriandri seminis, cicuta lacryma arida, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati eloti, quod *μενιπύριον* Graeci vocant, selibr. m. Reliqua ferè calefaciunt. Sed quaedam digerunt materiam, quaedam extrahunt, quae *μαλμαγμω* vocantur, pleraq; certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

Si materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoq; mediocri, aptum est id, quod habet resina arida, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum pōdo * cere pōdo *. Aut in quo haec sunt, arginis rasa, thuris, singulorum P. II. *. ammoniaci salis. P. VI. *. squamis aris, cere singulorū. P. VIII. *.
 refu

resina arida. P. * XII. *. aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum struthio, & melle P. II. *. * VII.

Malagma ad iecor dolens.

Si iecur dolet, id in quo est balsami lacryma. P. XII. *. costi, cinamomi, casia, corticis myrrha, croci, iunci rotundi, balsami seminis, iridis illyrice, cardamomi, amomi, nardi, singulorum. P. XV I. *. Quibus adijcitur nardinum unguentū, donec cerati crassitudo sit, & huius quidem recentis usus est. Si verò seruandum est, resina terebinthina. P. XV I. *. cera P. X. *. ex vino leni contunduntur, tum eo miscentur.

Malagma ad lienem.

At si lienis torquet, glandis (quam βάλανον Græci vocant) cortex & nitrum paribus portionibus contunduntur, respergunturq; aceto quàm acerrimo. Vbi cerati crassitudinem habet, linteo antea in aqua frigida madefacto idinitur, & sic imponitur, supraq; farina ordeacea iniicitur, sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat. Satiusq; est id bis, aut ter fieri. Cōmunē autē & iocineri, & lienī, & abscessibus, & strumæ, parotidibus, articulis, calcibus quoq; suppuratibus, aut aliter dolentibus, etiā cōcoctioni ventris, Lysias cōposuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani, resinæ, singulorū. P. II. *. ammoniaci, bdellij, cera, seui taurini, iridis arida P. I I I I. *. cacthyos acetabulo, piperis granis quadraginta. Quæ contrita, irino unguento temperantur.

Malagma ad laterum dolores.

AD laterum autem dolores compositio est Apollopheanis, in qua sunt resina terebinthina, thuris fuliginis, singulorum p. iiii. *. bdellij, ammoniaci, iridis, seu vitulini, aut caprini renibus sicci, singulorum p. iiii. *. Hac autem eadem omnem dolorem leuant, dura emolliunt, mediocriter calefaciunt. Ad idem latus Andreaeque malagma est, quod etiam resoluit, educit tumorem, pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, ad cicatricem perducit, prodest impostum minutis maioribusque abscessibus, item articulis, ideoque & coxis, & pedibus dolentibus: item si quid in corpore collisum est, reficit, praecordia quoque dura & inflata emollit, ossa extrahit, ad omnia denique valet, quae adiuvare calor potest. Id habet cere p. *. x i. *. visci lycamini, quam alii

* I. lycomorum vocant, lacrymae, singulorum p. *. I. *.
 * x i. piperis & rotundi, & longi, ammoniaci, thymiamatis, bdellij, iridis illyrica, cardamomi, amomi, xylobalsami, thuris masculi, myrrha, resinae aridae, singulorum p. x. *. pyrethri, cocci Gnidij, spumae nitri, salis ammoniaci, aristolochiae Creticae, radicis ex cucumere agrastii, resinae terebinthina liquida, singulorum p. x x v. *. Quibus adijcitur unguenti irini, quantum satis est ad ea mollienda, atque cogenda.

Malagmata ad resoluenda quae astricta sunt, & mollienda quae dura sunt, & digerenda quae coeunt.

Præcip

PRecipuum verò est ad resolvenda quæ astricta sunt, mollienda quæ dura sunt, digerenda quæ coeunt, id quod ad Polyarchum autorem refertur. Habet iunci quadrati, cardamomi, thuris, fuliginis, amomi, cere, resina liquida, pares portiones. Aliud malagma ad eadem.

Aliud ad eadẽ Nilei: crocomagmatis (quod quasi recrementum eius est) P. II. I. I. I. I. *. ammoniaci, thymiamatis, cere, singulorum P. X. X. *. ex quibus duo priora ex aceto teruntur, cere cum rosa liquatur, & tum omnia iunguntur.

Malagma Moschi ad molliendum.

Proprie etiã dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. Habet galbani unciam, thuris fuliginis P. *. 3. cere, ammoniaci, thymiamatis trientes, picis arida P. I. I. *. aceti heminas tres.

Malagma Medæ ad digerenda quæ coeunt.

Fertur etiam ad digerenda quæ coeunt sub autore Medo, quod habet cere P. *. 3. panacis P. *. semis, squame aris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum P. I. *. plumbi combusti. P. I. *. & semis.

Malagma Panthemii ad eadem.

Ad eadẽ Panthemius utebatur calcis P. *. semis, sinapis contriti, itẽ sæni Graci, aluminis, singulorũ P. I. *. seni bubuli P. II. *. & semis.

Malagma ad strumas.

Ad strumã multa malagmata inuenio. Credo autem quo peius id malum est, minusq; facile discutitur, eo plura esse tentata, quæ in per-

sonis varie responderunt. Andreas autor est, & hæc misceantur, urtica seminis $\text{P. I. } \times$. piperis rotundi, bdellij, galbani, ammoniaci, thymiamatis, resina arida, singulorum $\text{P. I I I I. } \times$. resina liquida, cera, pyrethri, piperis longi, lactuca marina seminis, sulphuris ignem non experti (quod $\alpha\omega\gamma\epsilon\phi$ vocatur) fecis arida, aceti, spuma nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis ex cucumeris sylvestri, resina, singulorum $\text{P. } \times$. V I I I.

* P. V.

* Quæ ex leni vino contunduntur.

Aliud malagma ad idem valens.

Ex peditius ad idē fit, quod habet visci, * scilicet lini stercoris, resina, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris. $\text{P. I. } \times$. lapidis, quem pyriten vocant $\text{P. I I I I. } \times$. cumini acetabulum. Item in quo est lapidis eiusdem pars una, sulphuris duæ partes, resina ter. binthina partes tres.

* Alias : scilicet inine, stercoris. Legē dū fortasse vel caprini vel bouilli ex Galeno de strumia

Malagma ad strumam, & phymata.

Arabis autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ $\phi\upsilon\mu\alpha\tau\alpha$ vocantur, quod hæc digerit. Habet myrrha, salis ammoniaci, thuris, resina & liquida & arida, crocomagmatis, cera, singulorum $\text{P. I. } \times$. lapidis eius, quem $\omega\gamma\epsilon\tau\alpha\gamma$ vocant, $\text{P. I I I I. } \times$. quibus quidam adiciunt sulphuris $\text{P. I I. } \times$.

Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

Et etiam proficiens in struma, & in his tuberculis, quæ difficiliter concoquantur, & in his

in his quæ carcinoda vocantur, quod ex his constat : Sulphuris P. I I. *. nitri P. I I I I. *. myrrha P. V I. *. fuliginis, thuris P. *. semis, salis ammoniaci P. *. I I I. cera P. I. *.

Malagma Protarchi ad Parotidas, & fauum,
& mala vlcera.

Protarchus autē ad parotidas, eaq; tubercula, quæ meliceria, id est, feui, vel phymata nominantur, itē mala vlcera, pumicis, resina pinea liquida, thuris, fuliginis, spuma nitri, iridis, singulorum P. V I I I. *. cum cera P. I X. *. miscbat, hisq; olei cyathum, & dimidium adyciebat.

Malagma, aduersus panum & phymata.

Ad aduersus panum, tum primum orientem (quod πυγιδιον Græci vocant) & omne tuberculum, quod phyma nominatur, miscetur ochra, quæ Attice nominatur, cum duabus partibus simile, hisq; contunditur, subinde mel infillatur, donec malagmatis crassitudo sit.

Malagma aduersus phymata.

Discutit etiam omne tuberculū (quod phyma vocatur) id quod habet calcis, nitri spuma, piperis rotundi, singulorum P. I. *. galbani P. I I. *. salis P. I I I I. *. quæ excipiuntur cerato ex rosa facto.

Malagma ad suppressendum omne quod abscedit.

Supprimitq; omne quod abscedit id, in quo est galbani, fabæ* fræse, singulorum P. I. *. * frige myrrha, thuris, ex radice capparis corticis, singulorum P. I I I I. *. Satisq; omnia abscedentia digerit,

gerit, murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adieſſo.

Malagma ad ſanguinem ſupprimendum,
& phymata.

AT ſi ſatis ſanguis ſubit, rectè imponitur quod aduerſus phymata quoq; poteſt. Conſtat ex his, bdellij, ſtyracis, ammoniaci, galbani, reſinae & aridae & liquida pineae. Item ex lentisſci, thuris, iridis, ſingulorum P. II. ✱.

Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.

Carcinoda verò & phymata cōmodè his leniuntur: Galbani, viſci, ammoniaci, reſinae terebinthinae in ſingulis P. I. ✱. ſeu taurini P. ✱. ſemis, ſcis cōbuſta quàm maxima portione, dum id ſiccius nō faciat, quàm eſſe malagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei contuſae.

Quod ſi facie cōtuſa liuor ſubcruentus eſt, hac cōpoſitio nocte & die impoſita tollit: Ariſtolochia, thapſia, ſingulorum P. II. ✱. bdellij, ſtyracis, ammoniaci, thymiamatis, galbani, reſinae aridae, & ex lentisſco liquida, thuris maſculi, iridis illyrica, care, ſingulorum P. III. ✱. Item faba quoq; impoſita proficit.

Malagmata ſtomachica ad aperiendum.

Sunt etiam quadam malignata, quae *Σματινα* Graeci vocant, quoniam aperiēdi vim habent. Quale eſt quod ex his conſtat, piperis longi, ſpuma nitri, ſingulorum P. I. ✱. eriſimi P. ✱. III. quae cum melle miſcentur. Idonea q̃ etiam

etiam struma aperienda sunt eius generis. Vehe-
mentiusq; ex his est id quod habet calcis P. IIII.
*. piperis grana sex, nitri, cera, singulorum P. X.
*. mellis P. *. 3. olei heminam.

Miconis malagma, ad resoluendum aperi-
endumq; ac purgandum.

Miconis quoq; est quod resoluit, aperit, pur-
gat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum,
pumicem, paribus portionibus, quibus tantum
picis, & cera adijcitur, ut fiat cerati crassitudo.
Malagma ad ossa, & nervos.

AD ossa autem Aristogenis, fit ex his, sul-
phuris P. I. *. resina terebinthina, nitri
spuma, & ex scilla partis interioris, plumbi eloti,
singulorum P. II. *. thuris, fuliginis P. VIII. *.
ficus arida quam pinguisima, seni taurini, sin-
gulorum P. VIII. *. cera P. XI. *. iridis Mace-
donica P. VI. *. sesami fricti acetabulum, ma-
ximeq; nervis, & articulis malagma conuenit.

Malagma Enticlei ad articulos, & ad
omnem dolorem.

Igitur Enticlei est, & ad articulos, & ad omnē
dolorem, & ad vesica, & ad recenti cicatrice
contractos articulos, quas ἀγκύλας Græci nomi-
nant, quod habet fuliginis, thuris acetabulum,
resina tantundem, galbani sine surculis sescun-
ciam, ammoniaci, bdellij, singulorum P. *. 3. cera
P. *. semis. Aliud item fit, quod habet iridis, am-
moniaci, galbani, nitri, singulorum P. XIIII. *.
resina liquida P. VI. *. cera P. XVI. *.

Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.

AD dolores articulorū Sofagora : Plūbi cōbu-
sti, papaveris lacrymæ, corticis bioscyami, sty-
racis, peucedani, seui, resinæ, cere, pares portiones.

Chrysippi malagma, ad idem valens.

Chrysippi, resina liquida, sandaraca, pipi-
ris: singulorum P. XII. *. quibus cara pau-
lum adijcitur.

Ctesipon

* Ctesiphontis malagma ad idem valens & ad
parotidas, & phymata, & strumam.

Ctesiphōtis, cara Cretica, resina terebinthi-
na, nitri quā ruberrimi, singulorū P. *.
seui, olei cyathi tres. Sed id nitrum antè per tri-
duū instillat a aqua teritur, & cum sextario eius
incoquitur, donec omnis humor consumatur. Po-
test verò ea compositio etiā ad parotidas, phyma-
ta, strumā, omnemq; coitū humoris emolliēdum.

Malagma ad articulos.

AD articulos sici quoq; aridi, partem nepeta
mistam vel unam taminiam sine semini-
bus cum pulegio rectè aliquis imponit.

Malagma Aristonis, aduersus podagras, & re-
centia phymata & omnes dolores.

Eadem podagra presidio sunt. Sed ad eam
sic Aristonis quoq; quod habet, nardi, cin-
namomi, casia, chamaleontis, iunci rotundi, sin-
gulorum P. VIII. *. seui caprini ex irino liquati
P. XX. *. iridis P. I. *. qua in aceto quā acerr-
mo iacere per XX. dies debet. Idem autem etiam
recentia phymata doloresq; omnes discentit.

* Ibro

Theoseni malagma, ad pedum dolores.

Theos

AT Theosenus ad pedū dolores, seni à reni-
bus partiē tertiā, salis partes duas miscebat,
hisq; mēbranulā illiā imponebat, iis superinj-
ciebat ammoniacū, thymiana in aceto liquatū.

Numenii malagma, ad podagram, catre-
rosq; articulos induratos.

AT Numenius podagram, caterosq; articu-
los induratos hoc mollebat: abrotani, rosa
aride, papaveris lacryma, singulorum P. III. *.
resina terebinthina P. IIII. *. thuris, spuma ni-
tri, singulorum P. V I I I. *. iridis, aristolochia,
singulorum P. XII. *. cera P. III. *. quibus adij-
citur cedri cyathus unus, olei laurini cyathi tres,
olei acerbi sextarius.

Dexti malagma, si quando callus in
articulis increvit.

Si quando autem in articulis callus increvit,
Dextius docuit imponere, calcis P. IIII. *. ce-
ruse P. VIII. *. resina pinea P. IX. *. piperis
grana P. XX. cera P. II. *. Quibus dum contun-
duntur, hemina vini lenis instillatur.

DE EMPLASTRIS.

CAP. XIX.

EX emplastris autem nulla maiorem usum
prestant, quàm quæ cruentis protinus vul-
neribus inijciuntur, ἰδαίμα Græci vocant. Hæc
enim reprimūt inflammationē (nisi magna vis
ita cogit) atq; illius quoque impetum minuunt,
et in glutinant vulnera, quæ id patiūtur, cicatri-

cem iſdem inducunt. Conſtant autem ex medica-
ipara mētis nō pinguibus, ideoq; * alipena nominatur.

Barbarum emplaſtrum nigrum, quod cruen-
tis protinus vulneribus iniicitur.

Optimum ex his eſt, quod Barbarum voca-
tur. Habet aruginis rafa P. XII. *. ſpuma
argenti P. XX. *. aluminis, picis arida, reſina, pi-
nea arida, ſingulorum P. I. *. quibus adiſciuntur
olei & aceti ſingula hemina.

Choacon emplaſtrum nigrum ad idem valens.

Alterum ad idem, quod χόανον vocant,
habet ſpumæ argenti P. C. *. reſina arida
tantundem. Sed ſpuma prius ex tribus olei he-
minis coquitur. His duobus emplaſtris calor niger
eſt, qui ſerè talis fit ex pice atq; reſina. At ex bi-
tumine nigerrimus: ex arugine, aut aris ſquama,
viridis: ex minio ruber, ex ceruſſa albus.

Baſilicon emplaſtrum nigrum ad idem.

Pauca admodum cōpoſitiones ſunt, in qui-
bus aliquid miſtura varietas nouat. Ergo
id quoq; nigrum eſt, quod Baſilicon nominatur.
Habet panacis P. I. *. galbani P. II. *. picis, &
reſina ſingulorū P. X. *. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplaſtrum nigrum
ad idem.

AT quod peruiride eſt, ſmaragdinum ap-
pellatur, in quo ſunt reſina pinea P. III.
*. cere P. I. *. aruginis P. *. ſemis, thuris fuli-
ginis P. I. *. olei tantundem, & aceti, quo fuligo
& erugo in vnum cogantur.

Empla

Emplastrum rufum ad idem.

Est etiā coloris fere ruffi, quod celeriter ad cicatricē vulnera pducere videtur. Habet thuris P. I. *. resina P. II. *. squama aris P. IIII. *. spuma argēti P. XX. *. cera P. C. *. olei hemina.

παραιολαῖον, emplastrum ad idem.

Praterea est, quod παραιολαῖον γλυτίνανδο vocant. Constat ex his: Bituminis, aluminis scissilis P. IIII. *. spuma argenti* P. * P. I. IIII. *. & olei veteris hemina.

Cephalicum emplastrum Philotæ capitū conveniens.

Praterea sunt quadā generis eiusdem, quia capitibus fractis maxime conveniunt, Cephalica à Græcis nominantur. Philotæ compositio habet: Terra* cretrea, chalcitidis, singulorum P. IIII. *. myrrha, aris combusti P. X. *. ichthyocolla singulorum P. V I. *. aruginis rasa, aluminis rotundi, misyos crudi, aristolochia, singulorum P. V III. *. squama aris P. XX. *. thuris masculi P. II. *. cera P. I. *. rose, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur. * Et thra

Emplastrum viride ad idem valent.

Aliud ad idem viride, aris combusti, squama aris, myrrha, ichthyocolla, singulorum P. VI. *. misyos crudi, aruginis rasa, aristolochia, aluminis rotundi, singulorum P. V III. *. cera* P. VII. *. olei hemina, aceti quod satis sit.

Tetrapharmacum emplastrum, ad pus movendum.

Puri

PVri autē movendo non aliud melius, quā
quod expeditissimum est, Tetrapharmacō
à Græcis nominatur. Habet pares portiones cere,
picis, resine, seui taurini, si id non est, vitulini.

Enneapharmacum emplastrum ad pus mo-
uendum & ad purgandum valens.

Alterum ad idem Enneapharmacum no-
minatur, quod magis purgat. Cōstat ex
novem rebus, cera, melle, seuo, resina, myrrha,
rosa, medulla vel ceruina, vel vitulina, vel bu-
bula, hyssopo, butyro. Quorum ipsorum quoque
pondera paria miscentur. Sunt autem quedam
emplastra, quibus utriusq; rei facultas est, quæ si
singula habenda sunt, meliora sunt. Sed in copia
reicienda sunt, his potius adhibitis, quæ pro-
pria id, quod eo tempore opus est, consequuntur.
Exempli causæ duo proponam.

Attalum emplastrum ad vulnera.

P. V I. **E**st igitur ad vulnera Attalum, quod habet
squame aris* P. X V I. ✱. fuliginis P. X V. ✱.
ammoniaci tantundem, resine terebinthina li-
quida. P. XXV. ✱. seui taurini tantundem, aceti
heminas tres, olei sextarium.

Iudæi emplastrum, fracto capiti accommodatum:

AT inter ea quæ fracto capiti accommodantur,
habent quidam id quod ad autorem Iu-
deum refertur. Cōstat ex his, salis P. ✱. I I I I.
squame aris rubri, aris combusti, singulorum P.
XII. ✱. ammoniaci, thymiamatis, thuris, fuligi-
nis, resine aride, singulorum P. VI. ✱. resine Colo-
phonias,

phoniace, cere, seni vitulini curati, singulorum
 P. XX. ℥. acetis sesquicyathū, olei minus cyathum,
 τιδερατιναια Greci appellant, quæ curata vo- Curata.
 cant, cum ex senu, puta omnes membranulæ dili-
 genter exemptæ sunt aut ex alio medicamento.

Diadaphnidon emolastum, ad extrahendum.

Sunt etiam quedam emplāstra nobilia ad ex-
 trahendum. Quæ ipsa quoq; ιασιπαρινα no-
 minantur. Quale est, quod quia lauri baccas ha-
 bet, diadaphnidon appellatur. In eo est, resine te-
 rebinthinæ P. X. ℥. nitri, cere, picis aride, bacca-
 rum lauri, singulorum P. XX. ℥. olei paulū. Quo-
 ties aut baccam, aut nucem, aut simile aliquid
 posuero, scire oportebit, antequam expendatur,
 ei summam pelliculam esse demendam.

Aliud diadaphnidon ad extrahendum,
 & pus mouendum.

Aliud eo nomine, quod puri quoq; mouendo
 est: Seni vitulini, ammoniaci, thymiam i-
 tis, picis, cere, nitri, baccarum lauri, resine aride,
 aristolochiæ, pyretbri, pares portiones.

Philocratis emplastrum ad extrahendum,
 & pus mouendum.

Preter has, est Philocratis, quod habet salis
 ammoniaci P. VII. ℥. aristolochiæ P. VIII.
 ℥. cere, resine terebinthinæ, fuliginis, thuris, sin-
 gulorum P. XV. ℥. spumæ argenti. ℥ P. LII. ℥. P. XXX.
 Quibus et pus quoq; moueant, iridis P. IIII. ℥.
 & galbani P. VI. ℥. adijciuntur.

Rhyzodes emplastrum, ad extrahendum.

Optim

Optimum tamen ad extrahendū est id quod à similitudine sordium *ῥονῶδες* Græci appellant. Habet myrrhæ, croci, iridis, propolis, bdelij, capitulorum punici mali, aluminis & scissilis & rotundi, misyos, chalcitis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis ammoniaci, visci, singulorum P. IIII. *. aristolochiæ P. VIII. *. squamæ eris P. XVI. *. resine terebinthinæ P. LXXV. *. cere & seui vel taurini, vel hircini P. C. *.

Emplastrum Hecatæi, ad extrahendum.

Hecatæo quoque autore emplastrum generis eiusdem fit ex his, galbani P. II. *. fuliginis thuris P. IIII. *. picis P. VI. *. cere, & resine terebinthinæ, singulorum P. VIII. *. quibus paulum irini unguenti miscetur.

Alexandrinum emplastrum viride, ad extrahendum.

Valensq; ad idem emplastrum viride Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis P. VIII. *. salis ammoniaci P. *. VIII. 3. squamæ eris P. XVI. *. myrrhæ, thuris singul. P. XVIII. *. cere P. CL. *. resine Colophoniacæ, aut pinæ

* P. C C * P. CXC. *. olei heminam, aceti sextarium.

De emplastris exedentibus.

Quædā autē sunt emplāstra exedentia, quæ *ῥονῶδες* Græci vocant, quale est id quod habet resine terebinthinæ, fuliginis thuris, singulorum P. *. 3. squamæ eris P. I. *. ladani P. II. *. aluminis tantundem, spumæ argenti P. IIII. *.

Emplastrum quod exest corpus, & ossa resolvit, & supercrescentem carnem coërect.

Exci

Est etiam uebementer corpus, atque ossa quoque; resoluit, & supercrescentem carnem coercet, id quod habet spuma argenti, squama aris, uncias singulas, nitri ignem non experti, lapidis Asy, aristolochia P. sexantes, cera, resina terebinthina, thuris, olei veteris, atramenti sutorij, salis ammoniaci P. semis, aruginis rasa P. bessem, aceti stillitici heminam, vini aminei, tantūdem.

Emplastra aduersus morsus, & alia recentiora vulnera.

Sunt etiam aduersus morsus quadam accommodata, quale est Diogenis nigrum, quod habet bituminis, cera, resina pinea arida singulorum P. XX. * spume argenti P. C. * olei sextariū. Aut in quo sunt squama aris P. IIII. * cerussa, & aruginis * rasa, singulorum P. VIII. * ammoniaci * passa P. XII. * cera, resina pinea, singulorum, P. XXV. * spuma argenti P. C. * olei sextarium. Aut in quo sunt squame aris P. XIIII. * galbani P. VI. * cerussa, & aruginis rasa, singulorum P. VIII. * ammoniaci P. XII. * cera, resina pinea, singulorum * P. * P. XLV. LV. * ex quibus spuma argenti concoquitur.

Ephesium emplastrum rubrum, ad idem valens.

Rubrum quoque emplastrum quod * Ephe- * Ephesium vocatur huc aptum est. Habet resina terebinthina P. II. * galbani P. * IIII. minij sinopici P. VI. * thuris fuliginis P. VI. * cera P. VII. * spuma argenti P. LV. * olei veteris heminam.

Aliud emplastrum ad idem valens.

Item id quod ex his constat, squamę aris, thuris
fuliginis, singul. P. IIII. *. galbani P. VI. *.
salis ammoniaci P. *. XII. 3. cere P. XXV. *. olei
tribus heminis. Hac autem alijs quoq; recentiori-
bus vulneribus recte imponuntur.

Aliud emplastra non grauib; vulneribus ac-
commodata, & maxime senilibus.

Sunt enim alba lenia, λευκὰ Graci vocant, se-
rè non grauib; vulneribus accommodata,
precipueq; senilibus. Quale est quod habet cerussa
P. XXX. *. P. LII. *. seni vitulini curati, & cera, singula-
rum P. LVI. I. *. olei heminas tres ex quibus ea
& cerussa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

Aliud quod habet cerussa P. XX. *. cera
P. XXX. *. P. LV. *. olei hominem, aqua sextarium.
Quę quoties adyiciuntur cerussę, vel spumę ar-
genti, scire licet illa ex his coquenda esse. Est au-
tem ea percandida compositio, quę suprà pessica
est, ideoq; elephantina nominatur.

Lenia emplastra.

Lenia quoq; quedã emplastra sunt, quas
λεπὰς serè Graci nominant, ut id quod habet
namij P. IIII. *. spumę argenti P. XXV. *. cera, &
adipis suille, singul. P. XXVII. vitellos quatuor.

Emplastrum lenne.

Alia compositio generis eiusdem, cera, re-
sina terebinthina, singulorum P. VI. *.
P. VII. cerussa P. VI. *. spumę argenti, plumbi recti-

menti, scoriā molybdi Græci vocant, singulorum
P. XX. cicini olei, & myrti, singulorum hemina.

Archagathi emplastrum lene.

Tertia qua ad autorem Archagathum re-
fertur, Misos colti, aris combusti, singulo-
rum, P. IIII. *. cerussa colta P. VIII. *. resina te-
rebinthina. P. X. *. spuma argenti. P. VI. *.

Emplastrum eiusdem generis ad lenien-
dum apta.

Etiamnū generis eiusdem, spumæ argenti, cera,
adipis suille, singulorum P. XXVII. *. vitel-
li colti, rosæ hemina. Aut cerati ex oleo myrteo
facti partes tres, adipis suille pars quarta, paulū
ex plumbi recremento. Aut spumæ argenti selibra, ex
olei hemina, & aqua marina altera colta, donec
bullire desierit, cui paulū cera sit adiectū, ac pa-
res portiones cera, seni, sibi, spuma argenti, cerussa.

De pastillis, & primo de his qui ad recentia vulnera
glutinanda, sanandaq; apti sunt. CAP. XX.

Pastilli quoque facultates diversas habent.
Sunt enim ad recentia vulnera glutinan-
da, sanandaq; apti. Qualis est qui habet chalcitis,
misos, spuma nitri, floris aris, gella, aluminis
scissilis modice colti, sing. P. I. *. aris combusti, ca-
pitulorum mali punici, singulorum P. III. *.
Hunc oportet diluere aceto, sic ubi vulnus glu-
tinandus est, illinere. At si nervosus aut muscu-
losus is locus est, commodius est cerato miscere, sic
ut illius octo partes, nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda vulnera.

Alius ad idem cōstat ex his, bituminis, aluminis scissilis, singulorū P. I. ✱. aris cōbusti P. IIII. ✱. spuma argenti P. XI. ✱. olei sextario.

De sphragide pastillo, quem Polybus confecit ad glutinandum vulnus.

Sed longe Polybi celeberrimus est. Sphragis autem nominatur, qui habet aluminis scissilis P. ✱. I. 3. atramenti sutorij P. I I. ✱. myrrhae P. V. ✱. aloës tantundem, capitulorum punici mali, fellis taurini, singulorum P. V I. ✱. Quae contrita vino austero excipiuntur.

Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, & in obscenis partibus, inflammationesq; eorum.

Ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, obscenis partibus, inflammationesq; eorum: Chrysocolle P. I. ✱. atramenti sutorij, aluminis scissilis, sing. P. I I. ✱. halicacabii corticis P. I I I I. ✱. minij P. V I. ✱. spuma argenti P. XII. ✱. cerussae P. XVI. ✱. Quae ex aceto & cōguntur, & ubi utendum est, diluuntur.

Pastillus Andronis ad vuam inflammata, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.

Andronis verò est ad vuam inflammata, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia: Galla, atramenti sutorij, myrrhae, singulorum ✱ P. I. ✱. aristolochiae, aluminis scissilis, singulorū P. II. ✱. capitulorum punici mali P. XXV. ✱. ex passo coactorum, & (cum usus exigat) aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut lenius

* P. II.

lenius vitium est, cui medendum est.

Pastillus ad fissā ani, vel ora venarum supponenda sanguinem vel cancrum.

Propriè autem ad ani fissā, vel ora venarum fundentia sanguinē, vel cancrum: Aetraginis P. II. ✱. myrrhae P. XII. ✱. stibis, lacryma papaveris, acacia singulorum. P. XV I. ✱. Quae ex vino & teruntur, & in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum cum urina.

Expellere autem ex vesica cum urina calculum videtur hac compositio: Casia, croci, myrrha, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici pares portiones conteruntur, deinde vinum lene instillatur, & pastilli fiant, qui singuli habeant P. ✱. 3. biq; singuli quotidie mane ieiuno dantur.

De pessis.

CAP. XXI.

Hae tria compositionum genera, id est, quae in malagmatis, pastillis, emplastrisq; sunt, maximum, praecipueq; varium usum praestant. Sed alia quoque utilia sunt, ut ea quae feminis subijciuntur (πλάστας Graeci vacant.) Eorum haec proprietas est: Medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

Ad sanguinem autem euocandum, canneis duabus adijcitur nitri* P. I. ✱. aut alij semen conteritur, adijcitur myrrha paululum, & unguento susino miscetur, aut cucumeris glaucis pars interior, ex lacte muliebri diluitur.

Ad vuluam molliendam.

AD vuluam molliendam, oui vitellus, & serum Grecum, & rosa & crocum temperantur. Aut elaterij P. ✱. 3. salis tantundem quæ taminia P. VI. ✱. melle excipiuntur.

Alia pessi compositio ad idem valens.

AUt Boëthio autore, croci, resina terebinthina sing. P. ✱. IIII. myrrha P. ✱. 3. rosa 8. 1. ✱. semi vitulini P. ✱. 3. cera P. II. ✱. miscentur.

Ad inflammationes vulvæ Numenii pessus.

OPTIMA autem aduersus inflammationes vulvæ, Numenij compositio est, quæ habet croci P. ✱. 3. cera P. I. ✱. butyri P. VIII. ✱. adipis asserini P. XII. ✱. vitellos coctos duos, rosa minor cyatho.

Ad eiciendum è vulua infantem mortuum.

SI verò infans intus decessit, quo facilius eiciatur, malicorium ex aqua terendum, eoq; utendum est.

Si mulier vitio locorum concidit, quæ curatione utendum sit.

SI concidere vitio locorum mulier solet, co-schlea cum testis suis comburenda, conterendaq; deinde his mel adijciendum est. Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

De medicamentis quibus aridis utimur.

C A P. XXII.

Ad carnem supererescentem exedendam.

QUADAM autem mixtura medicamentorum sunt, quibus aridis neq; coactis utimur, sic ut inspergamus, aut cum aliquo liquido

mista illinamus, quale est ad carnem supererescē-
tem exedendā, quod habet squame, fuliginis thur-
ris, singulorum P. I. ✱. aruginis P. II. ✱. Hac au-
tem eadem cum melle purgant ulcera, cum eara
implēt. Misy quoq; & galla, si paribus portionib.
misceantur, corpus consumunt, eaq; vel arida in-
spargere licet, vel excepta cadmia, illinire.

Ad putrem carnem continendam, ne ultrā serpat,
eamq; leniter exedēdam plures compositiones.

Putrem verò carnem continet, neq; ultrā ser-
pere patitur, & leniter exest, mel, vel cum
lenticula, vel cum marrubio, vel cum olea folijs,
antè ex vino decoctis. Itē sertula cāpana in mul-
so cocta, deinde contrita, aut calx cum cerato, aut
amara nuces cū allio, sic ut huius pars tertia sit,
paulumq; his croci adijciatur. Aut quod habet
spuma argenti P. VI. ✱. cornu bubuli combusti P.
XII. ✱. olei myrtei, & vini cyathos ternos. Aut
quod ex his constat: Floris punici mali, atramenti
sutorij, aloës, sing. P. I I. ✱. aluminis scissilis, thu-
ris singul. P. I I I I. ✱. galla P. V I I I. ✱. aristo-
lochia P. X. ✱. Vehementius idem facit etiā adu-
rendo auripigmētum cū chalcitide, & aut nitro,
aut calce, aut charta combusta. Item sal cū aceto.
Vel ea cōpositio quæ habet chalcitidis, capitulorū
punici mali, aloës, sing. P. II. ✱. aluminis scissilis,
thuris, singulorū P. II I I. ✱. galla P. V I I I. ✱. ari-
stolochia P. X. ✱. mellis quantū satis sit ad ea co-
genda, vel cantharides P. I. ✱. sulphuris P. I. ✱.

loli p. III. *. Quibus adijcitur picis liquida quantum satis est, adiungendum mel, chalcitis quoque cum resina & ruta mista, aut cum eadem resina diphryges, aut uua taminia, cum pice liquida. Idem uero possunt feces uini combustæ, & calcis, & nitri pares portiones, vel aluminis scissilis p. *. 33. thuris, sandaraca, nitri, singul. p. *. I. gallæ p. VIII. *. aristolochia p. X. *. mellis quantum satis est.

Hieræ compositio.

Est etiam Hieræ compositio quæ habet myrrha, chalcitidis, singulorum p. II. *. aloës, thuris, aluminis scissilis, singulorum p. III. *. aristolochia, gallæ immature, singul. p. VII. *.
* p. X. mali corij contriti * p. XX. *.

Iudæi compositio.

Est & Iudæi, in qua sunt calcis partes due, nitri quàm ruberrimæ pars tertia, quæ uirina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

Iollæ compositio.

At Iollæ, charta combusta, sandaraca, singulorum p. I. *. calcis p. II. *. auripigmenti tantundem miscebat.

Ad sanguinis profluvia vel ex membrana cerebri, vel aliis locis, & ad cancerum, & ad inducendam cicatricem, & ad coercendam carnem crescentem.

Si uero ex membrana, quæ super cerebrum est, profluit sanguis, vitellus combustus & contritus inspergi debet, si alio loco sanguinis profusum

sumum est, auripigmenti, squama aris, singulorum P. I. *. sandaraca P. II. *. marmoris colti P. III. *. inspergi debet. Eadem cancro quoq; obstant. Ad inducendam cicatricem, squama aris, thuris fuliginis, sing. P. II. *. calcis P. III. *. Eadem incrementem quoq; carnem coërcent.

Timxi compositio ad ignem sacrum
vel cancerum.

TImaus autem ad ignem sacrum, vel ad cancerum his utebatur, myrrha P. II. *. thuris, atramenti sutorij, singulorum P. III. *. sandaraca, auripigmenti, squama aris, singulorum P. III. *. galla P. VI. *. cerussa combusta P. VII. *. Eadem vel arida inspersa, vel melle excepta idem præstant.

Ad sternutamenta excitanda.

Sternutamenta verò vel albo veratro, vel struthio coniecto in naves excitantur, vel his mistis, piperis, veratri albi, singulorum P. *. 3. castorei pondo I. *. spuma, nitri P. II. *. struthij P. III. *.

Gargarizationes quibus fieri
debeant.

Gargarizationes autem aut levandi causa fiunt, aut reprimendi, aut euocandi. Levant, lac, cremor, vel ptisana, vel fursurum. Reprimit aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmula decocta sunt. Euocant, sinapi, piper.

De antidotis, & quibus malis opitulentur.

CAP. XXIII.

Antidota raro, sed precipue interdum necessaria sunt, quia gravissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus vel perictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum, laterum, fencium, interiorumque partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt aduersus venena, vel per morsus, vel percussiones, aut potiones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

VNum est quod habet lachryma papaveris P. *. 3. acori, malobatri P. v. *. iridis illyrica, gummi sing. P. i i. *. anisi P. i i i. *. nardi gallici, foliorum rose aridorum, cardamomi, sing. P. i i i i. *. petroselini P. *. i i i i. 3. trifolij P. v. *. casia nigra, silis, bdellij, balsami, seminis piperis albi, singul. P. *. 3. styracis P. *. 3. myrrha, opopanacii, nardi hyri, thuris, masculi, hypocistidis, succi, sing. P. v i. *. castorei P. v i. *. costi, piperis albi, galbani, resina terebinthina, croci, floris iunci rotundi, singulorum P. *. v i. 3. dulcis radicis P. v i i i. *. 3. Quae vel melle vel passo excipiuntur.

Aliud antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus Ptolemaeo regi composuit.

Alterum quod Zohyrus regi Ptolemaeo dicitur composuisse, atque Ambrosiam nominasse, ex his constat. Costi, thuris masculi, singulorum P. v. *. piperis albi P. *. 3. floris iunci rotundi P. i i. *. cinnamomi P. i i i. *. casia nigra P. i i i i

P. 1111. *. croci Cilicij P. *. 1111. 3. myrrhe quā
 statem nominat P. V. *. nardi indici P. *. V. 3.
 Quae singula cōtrita melle cōcto excipiuntur. De-
 inde ubi utendum est, id quod Aegyptia faba
 magnitudinem impleat in porione vini diluitur.

Antidotum Mithridatis.

Nobilissimum autem est Mithridatis, quod
 quotidie sumendo rex ille dicitur aduer-
 sus venenorum pericula tutum corpus suum red-
 didisse. In quo haec sunt, costi P. *. S. 3. acori P. V.
 *. hyperici, cimini, sagapeni, acacia succi, iri-
 dis Illyrica, cardamomi, singulorum P. 11. *. anesi
 P. 1111. *. nardi gallici, gentiana, radices, aridorū
 rosa foliorum, singulorum P. 1111. *. papaveris
 lacryma, petroselini, singulorum P. *. 1111. 3. ca-
 sia, silis, lolij, piperis longi, singulorum P. V 1. *.
 styracis P. *. V. 3. castorei, thuris, hypocistidiū suc-
 ci, myrrhe, opopanax, singulorum P. V 1. *. ma-
 lobathri folij P. V 1. *. floris iunci rotundi, resina
 terebinthina, galbeni, dauci cretici seminis, sin-
 gulorum * P. *. V. 3. nardi, opobalsamum, singu- * P. *.
 lorum P. *. V 1. 3. thlaspi P. *. V. 33. radices pon- V 1.
 tica P. V 11. *. croci, Zingiberis, cinnamomi, sing.
 P. *. V 111. 3. Haec contrita melle excipiuntur, &
 aduersus venenum, quod magnitudinem nauiis
 Graeca impleat, ex vino datur. In ceteris autem
 affectibus corporis pro modo eorum, vel quod
 Aegyptia faba, vel quod crui magnitudinem
 impleat, satis est.

DE ACOPIIS.

Acopum nervis utile. CAP. XXIIII.

ACopa quoque utilia nervis sunt. Quale est quod habet floris iunci rotundi P. * .II. 3. costi, iunci quadrati, lauri baccarū, ammoniaci, cardamomi, sing. P. * .IIII. 3. myrrha, aris cōbusti, singulorū P. * .VII. iridis illyrica, cere, singulorum P. IIII. *. alexandrini calami, iunci rotundi, asspalathi, xylobalsami singulorum P. XVIII. *. seui P. I. *. unguenti irini cyathum.

Acopum Euodes nervis utile.

Alterum quod * euodes vocāt, hoc modo fit, cera. P. *. 3. olei tantundem, resina terebinthina ad nucis iuglandis magnitudinem simul incoquuntur, deinde infusa in morterio teruntur, instillaturq; subinde quā optimi mellis acetalbum, tum irini unguenti, & rosa terni cyathi.

Enchrisia ad ulcera purganda & implenda.

Eγχριςια autem Graci vocant liquida quae illinuntur. Quale est quod fit, ad ulcera purganda, & implenda maxime inter nervos, paribus portionibus inter se mistis, butyri, medulla vitulina, seni vitulini, adipis anserina. ceri, mellis, resina terebinthina, rosa, olei * cicini. Quae separatim omnia liquantur, deinde liquido miscentur, & simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis verò emollit, si pro rosa cyprus infunditur.

Ad sacrum ignem.

AD sacrum ignem spuma argenti P. VI. *. cornu bubuli combusti P. II. *. conteruntur, adiga

adyciturq; inuicem vinum, & id quod speciali-
liter sil vocatur, & myrteum, donec viriusq; ter-
ni cyathi conficiantur.

De Catapotilis.

CAP. XXV.

Catapotium ad somnum accersendum, & le-
uationem doloris, & simul ad coquendum.

Catapotia quoq; multa sunt, varijsq; de cau-
sis fiunt. Anodyna vocant, quæ somno dolo-
rem leuant. Quibus uti, nisi nimia necessitas vr-
get, alienum est. Sunt enim ex vehementibus me-
dicamentis, & stomacho alienis. Poteſt tamen etiã
ad concoquendum, quod habet papaueris lacryma,
galbani, singulorum ꝑ. i. ꝥ. myrrhæ, caſtorei, pi-
peris. ꝑ. ii. ꝥ. Ex quibus quod erui magnitudi-
nem habet, ſatis eſt demoraſſe.

Catapotium valentius ad ſomnum.

Alterũ ſtomacho peius, ad ſomnũ valentius
ex his fit, mandragoræ ꝑ. ꝥ. 3. apij ſeminis,
item hyoſcyami ſeminis, ſingul. ꝑ. iiii. ꝥ. Quæ ex
vino teruntur. Unum autem eiufdem magnitu-
dinis, quæ ſuprà poſita eſt, abunde eſt ſumpſiſſe.

Catapotium ad plurimos dolores per
ſomnum leniendos.

Siue autem capitis dolores, ſine vlcera, ſine lip-
pitudine, ſine dentes, ſine ſpiritus difficultas, ſi-
ue inteſtinorum tormenta, ſine inflammatio vul-
næ eſt, ſine coxa, ſine icter, aut lienis, aut latus
torquet, ſine vitio locorum aliqua prolabitur, &
obmuteſcit, occurrit dolori per quietem eiufmodi
catapotium: Silis, acori, ruta Glueſtris ſeminis,
ſing

singulorum p. i. ✱. castorei, cinnamomi, sing. p. ii.
 ✱. papaveris lacryma, panacis, radicis mandrago-
 ra, malorum aridorum, iunci rotundi floris, sing.
 p. ii. ✱. piperis grana lvi. Hac per se contrita, rur-
 sus instillato subinde passo, simul omnia terun-
 tur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum
 aut deuoratur, aut aqua diluitur, et potui datur.

Catapotium aliud ad multa valens.

Quin etiam Gluestris papaveris cum iam ad-
 excipiendam lacrymam maturum est, ma-
 nipulus, qui manu comprehendi potest, in vas de-
 mittitur, & superinfunditur aqua, qua id conte-
 gat, atq; ita coquitur. Vbi iam bene manipulus is
 coctus est, ibidem expressus proijcitur, & cum eo
 humore, passi pari mensura misceatur, infusaq;
 donec crassitudinem sordium habeat. Cum infri-
 xit, catapozia ex eo fiunt, ad nostrae fabae magni-
 tudinem, habentq; usum multiplicem. Nam &
 somnum faciunt, vel per se assumpta, vel ex aqua
 data, & aurium dolores leuant, adiectis exiguo
 modo rosa succo, ac passi. Et tormina supprimunt
 ex vino liquata, & inflammationem vulnus coër-
 cent, mista cerato ex rosa facto, cum paulum his
 croci quoq; accessit, & ex aqua fronti inducitur, spi-
 ritum in oculos decurrentem tenent.

Cataponium ad inducendum somnum, quod
 vulua dolens prohibuit.

Item si vulua dolens somnum prohibuit, croci
 p. ii. ✱. anisi, myrrha, singul. p. i. ✱. papaveris
 lac

lacryma P. IIII. *. cicuta seminis P. VIII. *. miscentur, excipiunturq; vino vetere, & quod lupini magnitudinem habent in tribus cyathis aqua diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

Ad iecur sanandum.

AD sanandum iecur nitri P. *. 3. croci, myrrhae, nardi Gallici, singulorum P. I. *. melle excipiuntur, daturq; quod Aegyptie faba magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

AD lateris dolores finiendos, piperis, aristolochiae, nardi, myrrha pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

AD thoracis, nardi P. I. *. thuris, casiae, sing. P. III. *. myrrha, cinamomi singu. P. VI. *. croci P. VII. *. resina terebinthina quadrans, mellis huiusmodi tres.

Catapodium Athenionis ad tussim.

AD tussim Athenionis, myrrha, piperis, singulorum P. I. *. castorei, papaveris lacrymae, singulorum P. I. *. Quae separatim contusa, postea iunguntur, & ad magnitudinem fabae nostrae, bina catapodia mane, bina noctu dormituro dantur.

Catapodium Heraclidis Tarentini, ad tussim, & somnum.

SI tussis somni prohibet, ad utrunq; Heraclidis Tarentini, croci P. I. *. cinamome, castorei, papaveris lacrymae, singulorum P. I. *. myrrha, piperis longi, costi, galbani, singulorum P. *. 3.

Catap

Catapotium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.

Quod si purgata sunt ulcera in faucibus tussientibus, panacis, myrrha, resina terebinthina, sing. P. V. ✱. galbani P. ✱. 3. hyssopi P. ✱. 3. conterenda sunt, hisq; hemina mellis adijcienda, & quod digito excipi potest, deuorandum est.

Colicæ Cassii medici.

Colica verò Cassij ex his constat, croci, anisi, castorei, singulorum P. III. ✱. petroselini P. IIII. ✱. piperis & longi, & rotundi, singulorum P. V. ✱. papaueris lacryma, iunci rotundi, myrrha, nardi singulorum P. VI. ✱. Quæ melle excipiuntur. Id autē & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

Ad infantem mortuum aut secundas impellendas.

Infantem verò mortuum, aut secundas expellit aqua potio, cui salis ammoniaci P. I. ✱. aut cui dictami Cretici P. I. ✱. adiectum est.

Laborantibus ex partu quid dari debeat.

Ex partu laborantibus erisimum, ex vino Epidio ieiunæ dari debet.

Ad adiuuandum vocem.

Vocem adiuuat thuris P. I. ✱. in duobus cyathis vini datum.

Aduersus difficultatem vrinæ.

Aduersus vrinæ difficultatem, piperis longi, castorei, myrrha, galbani, papaueris lacryma, croci, costi vncie singula, styracis, resina terebinthina pondo sextantes, mel, absinthij cyathus.

Ex

Ex quibus ad magnitudinem faba Aegyptia, & mane, & canato dari debet.

Arteriaceae compositio quomodo fiat.

Arteriace verò hoc modo fit, casia, iridis, cinamomi, nardi, myrrha, thuris singulorum P. I. ✱. croci P. I. ✱. piperis grana x x x. ex passi tribus sextarijs decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrha, thuris, sing. P. I. ✱. conijciuntur in passi eundem modum, eodemque modo decoquuntur. Aut eiusdem passi hemina tres usque eò coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat, & adijcitur trita casia P. I. ✱.

De quinque generibus nozarum corporis, & primo de vulneribus, quae maxime per tela inferuntur.

C A P. XXVI.

Cum facultates medicamentorum proposuerim, genera in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus laesit, ut in vulneribus. Cum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increvit, ut vena, quae intumescens, in varicem conuertitur. Cum quid deest, ut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his, quae praecipue scalpellum & manum postulant, nunc de his dicam, quae maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoque curandi partem sicut priorem. Et ante dicam de his, quae in quamlibet partem corporis incidunt. Tum de his,

qua certas partes infestant. Incipiam à vulneribus. In his autem ante omnia scire medicus debet, qua insanabilia sint, qua difficilem curationem habeant, qua promptiorē. Est enim prudentis hominis, primum eum qui servari nō potest, non at-

- * *Spem tingere, nec subire* * Speciem eius, ut occisi, quem sors ipsius peremit. Deinde ubi gravis metus, sine certa tamen desperatione est, indicare necessarijs
 * *Spem periclitantis in difficili* * rem esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel sefellisse videatur. Sed ut hac prudēti viro cōveniant, sic rursus histrionis est, parvā rē attollere, quō plus praestitisse videatur. Obligariq; equū est, confessione propterea rei, quō curiosius etiā circumspeciat, ne quod per se exigū est malū, maius curantis negligentia fiat.

Quae vulnera insanabilia sint.

Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui iocinoris porta, cui in spina medulla percussa est, cuiq; aut pulmo medius, aut ieiunum, aut tenuius intestinum, aut vētriculus, aut renes vulnerati sunt, cuive circa fāces * *glandes vena, vel arteria praecisa sunt.*

* *glandes vena vel arteria, &c.*

Quae vulnera difficilem curationem habent.
Vix autē ad sanitatē perveniūt, quibus vlla parte pulmo, aut iocinoris crassū, aut membrana quae continet cerebrū, aut lienis, aut vesica, aut vllum intestinū, aut septū transversum vulneratū est. Hi quoq; in praecipiti sunt, in quibus vsq; ad grandes, intusq; cōditas venas,

in alis vel poplitibus mucro * desedit. Periculosa * descen-
 etiam vulnera sunt, ubicūq; vena maiores sunt, dit
 quoniam exhaustire hominē, profusione sanguinis
 possunt. Idq; evenit non in alis tantum, atq; popli-
 tibus, sed etiam in his venis, quæ ad anum, testi-
 culosq; perveniunt. Præter hæc malū vulnus est,
 quodcūq; in alis, vel feminibus, vel inanibus lo-
 cis, vel in articulis, vel inter digitos est. Itē quod-
 cūq; muscūm, aut nervum, aut arteriam, au-
 membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.

Tutissimū omniū, quod in carne est, & hæc
 quidem loco, vel peiora, vel meliora sunt.
 Modò verò periculū facit, quodcūq; magnū est.

Observationes quædam, & ætatis, & corporis
 & vitæ, & temporis in vulneribus.

Aliquid etiam in vulneris genere, figuraq;
 est. Nam peius est quod etiam collisum,
 quam quod tantum discissum est, adeo ut acuto
 quoq; quàm retuso telo vulnerari commodius sit.
 Peius etiam vulnus est, ex quo aliquid excisum
 est, ex quo ve caro alia parte abscissi; alia depen-
 det. Passimaq; plaga in orbem est: tutissima, quæ
 linea modo recta est. Quò deinde propius huic,
 illi ve figura vulnus est, eò vel deterius, vel to-
 lerabilius est. Quin etiam confert aliquid & ætas,
 & corpus, & vitæ propositum, & anni tem-
 pus: quia facilius sanescit puer, vel adolescens,
 quàm senior, valens, quàm infirmus, neq; nimis

tenuis, neq; nimis plenus, quàm si alterũ ex his est. Integri habitus, quàm corrupti: exercitatus, quàm iners: sobrius, & temperans, quàm vino, veneriſq; deditus. Opportuniſſimumq; curationi tẽpus verum est, aut certẽ neq; fruens, neq; frigidum. Si quidem vulnera & nimius calor, & nimium frigus inſiſtant: maximẽ tamen horum varietas, ideoq; pernicioſiſſimus autumnus est. Sed pleraſq; ex vulneribus oculis ſubiec̃ta ſunt, quorundam ipſa ſedes indices ſunt, quas alio loco demonſtravimus, cum poſitus interiorum partium oſtendimus. Veruntamen quia quadam vicina ſunt, intereſt quoq; vulnus in ſumma parte ſit, an penitus penetraverit: neceſſarium eſt notas ſubijcere, per quas quid intus actum ſit, ſcire poſſimus, & ex quibus vel ſpes, vel deſperatio oritur.

Signa percusſi cordis.

Igitur corde percusſo, ſanguis multus effertur, vena langueſcunt, color pallidiſſimus, ſudores frigidi, maliq; odoris, tanquam in rotato corpore oriuntur, extremisq; partibus frigidis, matura mors ſequitur.

Signa pulmonis ic̃ti.

Pulmone vero ic̃to, ſpirandi difficultas eſt, ſanguis ex ore ſpumans, ex plaga rubens, ſimulq; etiam ſpiritus cum ſono fertur: in vulnere inclinari iuvat, quidam ſine ratione conſurgunt. Multi ſi in ipſum vulnus inclinati ſunt, loquuntur: ſi in aliam partem, obmureſcunt.

Signa

Signa iocinoris vulnerati.

Iocinoris autem vulnerati notæ sunt, multus sub dextra parte præcordium profusus sanguis ad spinam reducta præcordia, in vērem cubandī dulcedo, punctiones, doloresq; vsq; ad ingulū, iunctumq; ei latus scapularum, os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

Signa percussorum renum.

Renibus verò percussis, dolor ad inguina, testiculosq; descendit, difficulter vrina redditur, eaq; aut est cruenta, aut cruor fertur.

Signa vulnerati lienis.

At liene ictō, sanguis niger à sinistra parte prorumpit, præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurefcunt, sitis ingens oritur, dolor ad ingulum, sicut iocinore vulnerato venit.

Signa percussæ vulvæ.

At cum vulva percussa est, dolor inguinibus, & coxis, & femoribus est. Sanguinis pars per vulnus, pars per naturale descendit, vomitus bilis insequitur. Quædam obmutescunt, quædam mente labuntur, quædam sui compotes, nervorum, oculorumq; dolore urgeri se confitentur, morientesq; tandem, eadem quæ corde vulnerato patiuntur.

Signa percussi cerebri, vel membranæ eius.

Sin cerebrum, membranæve eius vulnus accipit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit, fœciq; bilis vomitus insequitur. Quorundam sensus obtunduntur, appellatiq; ignorāt.

Quorundam trux vultus est, quorundam oculi quasi resoluti, huc atq; illuc moventur. Freq; tertio vel quinto die delirium accedit. Multorum etiam uerui distenduntur. Ante mortem autem pleriq; fascias, quibus caput deligatum est, laxant, ac nudum vulnus frigori obijciunt.

Signa percussæ stomachi.

Vbi stomachus autem percussus est, singultus & bilis vomitus insequitur. Si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito. Venarum motus elanguescunt, sudores tenues oriantur, per quos extrema partes frigescent.

Signa ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.

Communes verò ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati nota sunt. Nam cibus, & portio per vulnus exeunt, præcordia indurescent, nonnunquam bilis per os redditur. Intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina illa vel sterqus, vel odorem eius exhibent.

Signa percussæ medullæ, quæ in spina est.

Medulla verò quæ in spina est discussa, nervi resolvuntur, aut distenduntur, sensus intercidit: interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam sterqus excernunt.

Signa septi transversi percussæ.

At si septum transversum percussum est, præcordia sursum contrahuntur, spina dolens, spiritus rarus est, sanguis spumans fertur.

Signa

signa vesicæ vulneratæ.

Vesica verò vulnerata, dolēt inguina. Quod super pubem est, intēditur, pro urina sanguis, aut ex ipso vulnere urina descendit, stomachus afficitur. Itaq; aut bilem vomunt, aut singultiuunt, frigus, & ex eo mors sequitur.

De sanguine, & sanie, & pure, & eorum speciebus, quando meliora, deterioraue sint.

His cognitis, etiā nunc quadam alia noscenda sunt, ad omnia vulnera ulceraq; de quibus dicturi sumus, pertinentia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc, varie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus crassissimū, albiissimūq; glutinosius & sanguine & sanie. Exit autē sanguis ex vulnere recenti, aut iam sanescēte. Sanies est inter utriūq; tempus: Pus ex ulcere iam ad sanitatē spectante. Rursus & sanies, & pus quasdam species Græcis nominibus distinctas habent. Est enim quadā sanies, qua vel ἰχὼρ, vel* meli- * μύχμα seria nominatur. Est pus, quod ἰδαῖωδες appellatur. ἰχὼρ tenuis, subalbidus ex malo ulcere exit, maximeq; ubi nervo lesio inflāmatio secuta est. Meliceria crassior, & glutinosior, subalbida meliūq; albo subsimilis fertur. Hæc quoq; ex malis ulceribus, ubi nervi circa articulos lesi sunt, & inter hæc loca, maximè ex genibus. Ἐλαῖωδες tenues, subalbidū, quasi unctum colore atq; pinguitudine, oleo albo nō dissimile, adparet in magnis ulceribus

ribus sanescentibus. Malus autem est sanguis nimium, aut tenuis, aut crassus, colore vel liuidus, vel niger, aut pituita mistus, aut varius. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaq; protinus eius vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itēq; postea spes in his maior est, ex quibus melioris generis quaq; proueniunt. Sanies igitur mala est, multa, minus tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum ulcus, & iunctam ei cutē erodit. Melior non multa, modice crassa, subrubicūda, aut subalbida. Itēq; autē peior est multus, crassus, subliuidus, aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui cætera omnia cōtraria prioribus habet. Meliceria autē mala est multa, & percrassa, melior quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimū est. Sed id quoq; peius est multum, tenue, dilutum, magisq; si ab initio tale est. Itemq; si colore sero simile, si pallidum, si liuidū, si ficulētum est. Præter hæc, si male olet, nisi tamē locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius. Itēq; si leue est, si nihil olet, si æquale est, modo tamen conuenire, & magnitudini vulneris ut tempori debet. Nam plus ex maiore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fitur. Elæodes quoq; peius est multum, & parum pingue, quo minus etiam, quoq; id ipsum pinguius, eo melius est.

Curatio

Curatio aduersus profusionem sanguinis in vulneribus.

Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui seruari potest, protinus prospicienda duo sunt, ne sanguinis sit profusio, néve inflammatio interimat. Si profusionem timemus, quod ex sede vulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest, siccis linamentis vulnus implendū est, supr. q; imponēda spongia, ex aqua frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sapius linamenta mutanda sunt. Et si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem suppressendum est. Ideoq; quidam id vulnere infundūt. Sed alius rursus metus subest, ne nimis valenter ibi retenta materia magnā inflammationem postea moueat. Quæ res efficit, ut neq; rodentibus medicamentis, neq; adurētibus, & ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendū, quamuis pleraq; ex his sanguinem suppressunt. Sed si semel ad ea decurritur, potius quæ mitius idē effluunt. Quod si illa quoq; profluvio vincuntur, vena quæ sanguinē fundunt apprehēdenda, circaq; id quod ictū est, duobus locis deligēda, intercidendaq; sunt, ut & in se ipsa coeant, & nihilominus ora præclusa habeāt. Ubi ne id quidem res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sed etiā satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque verius, neq; minusculus est, ut puta in fronte, vel

superio

superiore capitis parte, commodissimum tamen est, cucurbitulam admonere à diversa parte, ut illuc sanguinis cursus renocetur.

Curatiores aduersus vulnere inflammationem.

ET aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationē autem in ipso sanguinis cursu, ea timeri possunt, ubi latus est vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus: aut ubi parū sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinē maturē suppressere non oportebit, sed pati fluere, dū tutum erit, adeo ut si parum fluxisse videbitur, mitti quoq; ex brachio debeat, utiq; si corpus inuenile, & robustum, & exercitatum est: multoq; magis, si id vulnus ebrietas precessit. Quod si musculus latus videbitur, præcidendus erit. Nam percussus mortiferus est: præcisus sanitatē recipit.

De glutinatione vulnerum.

Sanguine autē vel suppresso, si nimis erumpit: vel exhausto, si per se parū fluxit, longi optimum est vulnus glutinari. Potest autē id vel quod in cute vel etiam in carne est, si nihil ei præterea mali accēit. Potest caro alia parte dependens, alia inharens, si tamen etiamnum integra est, & coniunctione corporis fouetur. In his verò que glutinatur duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte, sui debet, maximeq; si discissa auris ima est, vel intus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur curis
vel

vel venter. Si verò in carne vulnus est, hiat q̃;
 neq; in unum ora facile attrahuntur, sutura qui-
 dem aliena est. Imponenda verò fibule sunt (ἀ-
 κτῆρες Græci nominant) quæ oras, paulum ta-
 men, contrahunt, quo minus lata postea cicatrix
 sit. Ex his autem colligi potest, id quoq; quod alia
 parte dependēs, alia inhaerebit, si alienatū adhuc
 non est, suturam, an fibulam postulet. Ex quibus
 neutra antè debet imponi, quàm intus vulnus
 purgatum est, ne quid ibi concreti sanguinis re-
 linquatur. Id enim & in pus vertitur, & inflā-
 mationem mouet, & glutinari vulnus prohibet.
 Ne linamentū quidem, quod suppressendi san-
 guinis caus̃sa inditū est, inibi relinquendum est.
 Nūm id quoq; inflammat. Comprehēdi verò su-
 tura vel fibula non cutē tantum, sed aliquid etiā
 ex carne, ubi suberit hac, oportebit, quo valētius
 bareat, neq; cutem abrumpat. Vtraq; optima est
 ex * acia molli non nimis torta, quod vitiū cor- * acu
 pori insadat. Vtraq; neq; nimis rara, neque nimis
 cribra iniicienda est. Si nimis rara est, non conti-
 net. Si nimis cribra est, vehementer afficit, quia
 quo sæpius acus corpus * transiit, quoq; plura lo- * trāsm
 ca iniectū vinculum mordet, eo maiores inflāma-
 tiones oriuntur, magisq; astate. Neutra etiā vim
 illā desiderat: sed eatenus utilis est, qua cutis du-
 centē, quasi sua sponte subsequitur. Eerē tamē fi-
 bula latius vulnus esse patitur. Sutura oras
 iungit, quæ ne ipsa quidē inter se cōtingere ex toto
 debent

debēt, ut si quid intus humoris cōcreuerit, sit quā
 emonet. Si quod vulnus neutrum horū recipit, id
 tamē purgari debet, deinde omni vulnere primo
 imponenda est spongia ex aceto expressa: si susti-
 nere aliquis aceti vim non potest, vino utendum
 est. Lenis plaga iuuatur etiam, si ex aqua frigida
 expressa spongia imponitur. Sed ea quocūq; modo
 imposita est, dum manet, prodest. Itaq; ut inare-
 scat, non est committendum. Licetq; sine peregrini-
 nis, & conquisitis, & compositis medicamentis
 vulnus curare. Sed si quis huic parum confidit,
 imponere medicamentum debet, quod sine seuo
 compositum sit ex his, quae cruentis vulneribus
 apta esse proposui. Maximeq; si caro est, barba-
 rum: si nervi, vel cartilago, vel aliquid ex emi-
 nentibus, quales aures, vel labra sunt, Polybi
 sphragidem. Alexandrinum quoq; viride nervis
 idoneum est, eminentibusq; partibus ea, quam
 Graeci πᾶσι τοῖς ἀπὸ vocant. Solet etiā colliso corpo-
 re exigua parte findi cutis. Quod ubi incidit, non
 alienum est scalpello latius aperire nisi musculi,
 nerviq; iuxta sint, quos incidi non expedit. Ubi
 satis deductum est, medicamentum imponendum
 est. At si id quod collisum est, quamvis parum de-
 ductum est, latius tamen aperiri propter nervos,
 aut musculos non licet, adhibenda sunt ea, quae
 humorem leniter extrahant praecipueq; ex his,
 id quod rhypodes vocari proposui. Non alienum
 est, etiam ubicunq; vulnus graue est, impositum,
 quo

quo id inuetur, insuper circumdare lanam succidam ex aceto, & oleo. Vel cataplasma si mollis is locus est, quod leniter reprimat, si nervosius aut musculosus, quod emolliat.

Quomodo vulnus ligari conveniat.

Fascia verò ad vulnus deligandum, lintea aptissima est, eaq; lata esse debet, ut semel iniecta non vulnus tantum, sed paulum utrinq; etiam oras eius comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur. Si aequè ab utraq; transverse cōprehendere oras debet: aut si id vuineris ratio non patitur, media primum injicienda est, ut tum in utranq; partē ducatur. Si autem deliganda est, ut & contineat, neq; astringat. Quod non continetur, elabitur: Quod nimis astrictū est, cancro periclitatur. Hyeme saepius fascia circumire debet, estate quoties necesse est, tum extrema pars eius inferioribus assuenda est. Nam nodus *vulnus ledit, nisi tamen longe est. Illo neminem decipi decet, ut propriam viscerum curationē requirat, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel sutura, vel alio medicina genere est. In visceribus nihil mouendum est, nisi aut si quid ex iocinore, aut liene, aut pulmone dumtaxat extrema depēdat, pracidatur. Alioquin vulnus interius, ea victus ratio, eaq; medicamenta sanabūt, quacuiq; visceri convenire superiore libro proposui.

De ratione victus, & notis vulnorum curationibusq; eorum.

His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est, isq; si grave vulnus est, abstinere, quentiu vires patiuntur, ante inflammationē à cibo debet: bibere, donec sitim finiat, aquā calidam: vel si aestas est, neq; febris, neq; dolor est, etiam frigida. Adeo tamen nihil perpetuum est. Sed semper pro viribus corporis aestimandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit, tenuē scilicet & exiguum, qui tantum sustineat. Multiq; etiam ex profluvio sanguinis intermorientes, ante ullam curationē vino reficiendi sunt, quod alioqui inimicissimum vulneri est. Nimis verò intumescere vulnus, periculosum: nihil intumescere, periculosissimū est. Illud indicium est magnae inflammationis, hoc mortui corporis. Protinusq; si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet maturē vulnus sanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet, si in magna vulnere, diu * inflatio est, permanet. Illa perniciosa est, quae vel levi vulnere superuenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium mouet, vel si nervorum rigor, aut distinctio, quae ex vulnere orta est, eam non finit. Vomitus quoq; biliosus non voluntarius, vel protinus ut percussus est aliquis, vel dum inflammatiō manet, malū signum est in his duntaxat, quorum vel nervi, vel etiā nervosi loci vulnerati sunt. Spōte tamē vomere non alicui est, praecipuē his, quibus in consuetudine fuit: sed neq; protinus post cūcū,

neq; iam inflammatione orta, neq; cum in superioribus partibus plaga est. Et duo sic vulnere habito, tertio die aperiendū, detergendāq; sanies ex aqua frigida est, eademq; rursus injicienda sunt. Quinto iam die quanta inflammatio futura est, se ostēdit. Quo die rursus detecto vulnere cōsiderāndus color est. Quod si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est, scire licet malū vulnus esse: idq; quandocumq; animadversum est, terrere nos potest. Album, aut rubicundū esse vlcus, commodissimū est. Item cutis dura, crassa, dolēs, periculum ostēdit. Bona signa sunt, ubi hac sine dolore tenuis, & mollis est. Sed si glutinatur vulnus, aut leuiter intumuit, eadē sunt imponenda, qua primò fuerūt. Si gravis inflāmatio est, neq; glutinādi spes est, eaq; pus moueat, aquae quoq; calidae necessarius vsus est, ut & materiā digerat & duritiā emolliat, & pus citet. Ea sic tēperanda est, ut & manu contingēti iocunda, sit, vsq; eò adhibenda donec aliquid ex tumore minuisse, coloremq; vlteri magis naturalē reddidisse videatur, maximq; si grande vulnus est tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locis cartilagineosis, rhyppodes. Post id fomentum, si lata plaga non patet, imponi protinus emplastrū debet, & si latius biat, illud emplastrū liquari ex irino vnguento oportet: eoq; illita linamenta disponi per plagam, deinde emplastrum suprā dari, & super id succidam lanā, minusq; etiā, quā primò, fasciis astringēde sunt.

Curatio

Curationes propriæ articulorum.

Propriè quadam in articulis visenda sunt, in quibus si præcisi nervi sunt, qui continebāt, debilitas eius partis sequitur. Si id dubiū est, & ex acuto telo plaga est, ea transversa commodior est. Si retuso & gravi est, nullum in figura discriminē est. At visendū est prius supra articulū, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albūq; & crassum diu fertur, nervū præcisum esse credibile est. Magis quoq; maiores dolores inflammationesq; quò maturius excitatę sunt. Quamvis autē non abscissus nervus est, tamen si circa tumor durus diu permanet, necesse est & diuturnum vlcus esse, & sano quoq; eo tumorem permanere, futurumq; est, ut tarde membrum id extendatur vel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, ubi recurvato articulo curatio adhibita est, quàm in recurvando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoq; membrum quod iectum est ratione certa debet. Si glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est, ut in neutram partem inclinatum sit. Si iam prius profluit, ut decursum sit. Optimū etiam medicamentū quies est: moveri & ambulare, nisi sanis, alienum est. Minus tamē his est periculosum, qui in capite vel brachijs, quā qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minimūq; ambulatio convenit, si minime crurē, aut pedē laborāte. Loc⁹ in quo cubabit, tepidus esse debebit. Balneum quoq; dum parum

quidam

vulnus purum est, inter res infestissimas est. Nam id humidum, & sordidum reddit, ex quibus ad cancrum transitus esse consuevit. Lenis frictio rectè adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à vulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

Inflammatione finita, vulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta, supraq; id, emplastrum, vel encepharmacum dandum est. Tum demum verò purum vulcus est, cum rubet, ac nimium neque siccum, neq; humidum est. Ac quodcumque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est: quod aut pallidum, aut albidum, aut lividum, aut nigrum est, id purum non est.

Quomodo vulnus implendum est.

Purgato, sequitur ut impleatur, iamq; calida aqua eatenus necessaria est, ut sanies remoueat. Lana succida supernacuius usus est. Lota melius circumdatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiã medicamenta aliqua. Itaq; ea adhiberi non alienum est, ut butyrum cum rosa, exigua mellis parte, aut cū eadem parte, aut cum eadem rosa tetrapharmacum, aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum Cibi boni succi, vitatis omnibus acribus, sed iam plenioribus. Nam & avis, & venatio, & suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienum est. Itemq; vsq; ad cicatricem,

tricem, si nervi, musculive vulnerati sunt, etiam si alte caro, aut si plagi in summa cute generis tioris est, potest non peruetus, modicè tamen datū, ad implendū quoq; proficere. Si quid molliendum est, quod in nervosis locis, musculosisq; necessariū est, cerato quoq; super vulnus vacandum est. At si caro supercrevit, modice reprimis siccū linamentū, vehementius squama aris. Si plus est, quod tolli opus est, adbibenda sunt etiamniū vehementiora, quæ corpus excedant. Cicatricem post omnia hæc cōmodè inducit, lycium ex passo, aut lacte dilutū, vel etiam per se impositum siccum linamentum.

De ulceribus, quæ extrinsecus per vulnera incidunt, curationibusq; eorum.

Hic ordo felicitis curationis est. Sed quædam tamen periculosa incidere consuerunt. Interdum enim vetustas vlcus occupat, induciturq; ei callus, & circum ora crassa lient, post quo quicquid medicamentorum ingeritur, parū proficit, quod serè negligenter curato vlceri superuenit. Interdum vel ex nimia inflammatione, vel ob æstus immodicos, vel ob nimia frigora, vel quia nimis vulnus astrictum est, vel quia corpus aut senile, aut mali habitus est, cancer occupat. Id genus à Græcis diductum in species est, nostris vocabulis non est. Omnis autem cancer non solum id corrumpit, quod occupavit, sed etiam serpit, deinde alijs alijsq; signis decernitur. Nam modo super inflammationem rubor

vlcus

Vlcus ambit, isq; cum dolore procedit, ὄνυστα Graci nominant. Modò vlcus nigrum est, quia caro eius corrupta est. Idq; vebemētius etiam putrescendo intenditur. Vbi vulnus humidum est, & ex nigro vlcere humor pallidus fertur, maliq; odoris est, caruncula corrupta. Interdum etiam nervi ac membrana resoluuntur, specillumq; demissum descendit aut in latus, aut deorsum, eoq; vitio nonnunquam os quoq; afficitur. Modò oritur ea, quàm Graci γὰρραίαν appellant. Priores in qualibet parte corporis sunt. Hæc in prominentibus membris, id est inter ungues, & alas vel inguina, ferèq; in senibus, vel his in quorū corpus mali habitus est. Caro in vlcere vel nigra, vel limida est, sed sicca & arida, proximaq; cutis plerūq; subnigris* pustulis impletur, deinde ei proxima vel pallida, vel limida, ferèq; rugosa sine sensu est. Ulterior in inflammatione est, omniaq; ea simul serpunt. Vlcus in locum pustulosum: Pustula, in eum qui pallet aut linet: Pallor aut linor, in id quod inflammatum est: Inflammatio, in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta oritur, ingensq; sitis, quibusdam etiam delirium accedit, alij quamvis mentis suæ compotes sunt, balbutiendo tamen vix sensus suos ore explicant. Incipit affici stomachus. Fit sædi spiritus ipse odoris. Atq; initium eius quidem mali recipit curationem. Vbi verò penitus insedit, insanaabile est, plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

Curatio ulceris.

AC pericula quidem vulnerum hac sunt. *Exciden*
m Vetus autem vlcus scapello * incidendam
 est excidendaq; eius ora, & quicquid super ea
 linet, æquè incidendum. Si varicula intus est,
 qua his sanari prohibet, ea quoque excidenda.
 Deinde, ubi sanguis emissus, nouatumq; vulnus
 est, eadem curatio adhibenda, qua in recentibus
 vulneribus exposita est. Si scapello aliquis uti
 non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex
 ladano fit, & cum vlcus sub eo exesum est, id quo
 cicatrix inducitur.

Curatio Erysipelatum.

ID autem quod Erysipelas vocari dixi, non
 solum vulneri superuenire, sed sine hoc quoq;
 oriri consuevit, atque interdum periculum maius
 affert, utique si circa ceruices aut caput consti-
 tit. Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mit-
 tere, deinde imponere simul reprimentia & re-
 frigerantia, maximeq; cerussam solani succo, aut
 simoliam cretam aqua pluuiali exceptam, aut ex
 eadem aqua subactam farinam cupresso adie-
 cta, aut si tenerius corpus est, lenticulam. Quic-
 quid impositum est, betæ folio contegendum est,
 & super linteolum frigida aqua madens impo-
 nendum. Si per se refrigerantia parum prode-
 runt, miscenda erunt hoc modo, sulphuris P. I. *.
 P. XII. cerussa & croci, singulorum * P. XX. *. eaq;
 cum vino conterenda sunt, & id his illinendum:

aut si durior locus est, solani folia contrita, suilla
adipi miscenda sunt, & illita lincolo superini-
cienda. At si nigrities est, neque dum serpit, im-
ponenda sunt, qua carnē putrem lenius exedant,
repurgatumq; vlcus sic ut cetera nutriendum est.
Si magis putre est, iamq; procedit ac serpit, opus
est vehemētius erodētibus. Si ne hac quidē euin-
cant, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor
feratur: nam quod sanum est, siccum est cūm adu-
ritur, post vstionem putris vlcēis superponenda
sunt qua crustas à vino resoluant, eas ἰσχαλαίους
Graeci vocant. Vbi exciderunt, purgandum vlcus
maxime melle & * resina est, sed alijs quoq; pur- * resina
gari potest, quibus purulenta curantur, eodemq; vsta
modo ad sanitatem perducendum est.

Curatio gangraenarum.

G Angranam verò, si nondum planè tenet,
sed adhuc incipit, curare non difficilimum
est, utique in corpore iuuenili, & magis etiam si
musculi integri sunt, si nervi vel laesi non sunt,
vel leuiter affecti sunt, neque vllus magnus ar-
ticulus nudatus est, aut carnis in eo loco paulum
est, ideòq; non multū, quod putresceret, fuit, con-
sistitq; eo loco vitium: quod maxime fieri in di-
gito potest. In eiusmodi casu primum est, si vi-
res patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quic-
quid aridum est, & intentione quadam proxi-
mum quoque locum male habet, * vsq; ad sanum * vsq; ad
corpus conuolare. Medicamenta verò, dum ma- sa.

Vbi verò in quolibet vulnere ventum ad inducendum cicatricem est, quod perpurgatiss iam repletisq; ulceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur, deinde cum iam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet, quo & reprimatur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix Sylvestris cucumeris prestat. Idem compositio, quæ habet elaterij P. I. ✱. spuma argenti P. II. ✱. ungueti pondo IIII. ✱. Quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. At nigras quoq; cicatrices leniter purgât paribus portionibus mista, erugo, plumbum elotum, eademq; rosa cocta, siue ungitur cicatrix, quod in facile fieri potest: siue id ut emplastrum imponitur, quod in alijs partibus commodius est. At si vel excreuit cicatrix, vel concaua est, stultum est decoris causa rursus, & dolorem & medicinam sustinere. Alioqui res viri succurri patitur. Siquidem utraq; cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquod manuit, idem efficiunt compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniicienda sunt: super concauam implentia, donec utrunq; ulcus sanæ cui æquetur, & tum cicatrix inducatur.

De vulneribus quæ per morsus inferuntur, eorumq; curationibus. CAP. XXVII.

Dixi

Dixi de his vulneribus, quæ maxime per te-
la infringuntur. Sequitur, ut de his dicā, quæ
morsu fiūt, interdū hominis, interdum simiæ, sa-
pe canis, nonnunquā ferorū animaliū, aut serpen-
tium. Omnis autē fera morsus habet quoddā vi-
rus. Itaq; si vehemens vulnus est, cucurbitula ad-
monenda est. Si lenius, protinus emplastrum inji-
ciendum, præcipueq; * Diogesi. Si id nō est, quod- * Dioge-
libet ex his, quæ aduersus morsus proposui. Si ea vi-
non sunt, viride Alexandrinum. Si ne id quidē
est, quodlibet non pingue ex his quæ recentibus
vulneribus accommodantur. Sal quoq; his, præ-
cipueq; ei, quod canis fecit, medicamentum est, si
manus vulneri imponitur, superq; id duobus di-
gitis verberatur: Exaniet enim: ac salsamentum
quoq; recte super id vulnus deligatur.

Curatio aduersus rabiosi canis morsum.

VTiq; autē si rabiosus canis fuit, cucurbitu-
la virus eius extrahendū est. Deinde si lo-
cus neq; nervosus neq; musculosus est, vulnus id
adurendum est. Si uri non potest, sanguinē homi-
ni mitti non alienum est. Tum vsto quidē vulne-
ri superimponēda, quæ cæteris vstis, sunt. Ei verò
quod expertū ignem nō est, ea medicamenta, quæ
vehementer exedūt. Postq; nullo nouo magisterio,
sed iam supraposito vlcus erit implendū, & ad sa-
nitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis
morsum protinus in balneū mittunt, ibiq; patiam-
tur desudare, dū vires corporis sinunt vlcere ada-
p-
perio.

Timor
aquæ
v. *Algepô-*
BC.

perto, quo magis ex eo quoque virus distillet, deinde multo, meracoque vino excipiunt: quod omnibus venenis contrarium est. Idque cum ita per triduum factum est, tutius esse homo à periculo videtur. Soli autem ex eo vulnere, ubi parii occursum est, aqua timor nasci, v. *Algepôsiac* Græci appellant. Miseritimum genus morbi, in quo simul æger & siti, & aqua metu cruciatur. Quo oppressis in angustis spes est. Sed unicum tamē remedium est, nec operantē in piscinam non autē ei provisam projicere. Et si natandi scientiam non habet, modòmersum bibere pati, modò attollere. Si habet, interdū deprimere, ut invitus quoque aqua satiatur. Sic enim simul & sitis, & aqua metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmū corpus in aqua frigida vexati, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina protinus in oleū calidum demittendus est. Antidotū autē, præcipuē id, quod primo loco posui: ubi id non est, aliud, si nodum æger aquā horret, potui ex aqua dandū est, & si amaritudine offenditur, mel adijciendum est. Et si iam is morbus occupavit, per catapota fieri potest.

Curaciones communes, aduersus omnes
morsus serpentium.

Serpentium quoque morsus non nimium distantem curationē desiderant, quamuis in ea multum antiqui variarunt, ut in singula genera anguinum singula medendi genera præciperent, atque alijs alia. Sed in omnibus eadem maxime profuit

proficiunt. Igitur in primis super vulnus id mem-
brum deligandum est, non tamen nimium vehe-
menter, ne torpeat. Dein venenum extrahendum
est, id cucurbitula optime fit. Neq; alienum est,
antè scalpello circà vulnus incidere, quo plus vi-
tiati iam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula nō
est, quod tamē vix incidere potest, tum quodlibet
simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est,
homo adhibendus est, qui vulnus exugat. Neque
Hercules scientiā præcipuam habent hi qui Psylli Psylli.
nominantur, sed audaciam usu ipso confirmatā.
Nam veneni serpētis, ut quādā etiam venatoria
venena, quibus Galli præcipuē veniuntur non gustu
sed in vulnere nocēt. Ideoq; colubra ipsa tuto estur,
ictus eius occidit, & si suspēte ea (quod per quādā
medicamenta circulatores faciunt) in os digitum
quis indidit, neq; percussus est, nulla in ea salina
noxa est. Ergo quisquis exemplū Psylli secutus, id
vulnus exuxerit, & ipse tutus erit, & tutū homi-
nem præstabit. Illud ne intereat, antè debet at-
tendere, ne quod in gingivis, palato ve, aliā ve par-
te oris vlcus habeat. Post hæc is homo loco calido
collocandus est, sic ut id, quod percussus erit, in
inferiorem partē inclinetur. Si neq; qui exugat,
neq; cucurbitula est, sorbere oportet ius anserinum
vel ouillū, vel vitulinum, & vomere. Vivū cu-
tem gallinacū pullum per medium dividere, &
protinus calidū super vulnus imponere, sic ut pars
interior corpori iungatur. Facit id etiam hædus,

agnisve discissus, & calida eius caro statim super
vulnus imposita. Emplastra quoque, quae supra com-
prehensa sunt. Aptissimumque est, vel Ephesium, vel
id quod ei subiectum est. Praesensque in aliquo anti-
doto praesidium est. Sin id non est, necessarium est
exorbere potionem meri vini cum pipere, vel quid-
libet aliud, quo calor mouendus est, ne humorem
intus coire patiatur. Nam maxima pars venenorum
frigore interimit. Omnia etiam urinam au-
gumentia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium,
& primo aduersus ictum aspidis.

Haec aduersus omnes ictus communia sunt.
Vnus tamen ipse docuit, eum quem aspi-
perussit, acetum potius bibere debere. Quod de-
monstrasse dicitur casus cuiusdam pueri, qui cum
ab hac ictus esset, & partim ob ipsum vulnus, par-
tim ob immodicos aestus siti premeretur, ac locum
siccis alium humorem non reperiret, acetum quod
forte secum habebat, ebibit, & liberatus est. Credo
quoniam id, quamuis refrigerandi vim habet,
tamen habet etiam dissipandi. Quò fit, ut terra
respersa eo, spumet. Eadem ergo vi verisimile est,
spissescentem quoque intus humorem hominis ab
eo discuti, & sic dari sanitatem.

Aduersus ictum scorpionis.

In quibusdam etiam alijs serpentibus, certa
quaedam auxilia satis nota sunt. Nam scorpia
sibi ipse pulcherrimum medicamentum est. Qui-
dam

Aceti vis
& natura.

dam contritum cum vino bibunt, quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt, quidam super prunam eo imposito, vulnus suffumigant, undiq; veste circumdata, ne is fumus dilabatur, cum carbonem eius super vulnus deligant. Bibere autem oportet herba solaris, quā ἡλιωτρόπιον Graeci vocant, semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam fursures ex aceto, vel ruta Sylvestrica recte imponitur, vel cum melle sal costus. Cognovi tamen medicos, qui ab scorpione ictis, nihil aliud quam ex brachio sanguinem miserunt.

Heliotropium herba solaris.

Aduersus aranei, & scorpionis, ictum.
ET ad scorpionis autem, & ad aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoq; contritum superimponitur.

Aduersus cerasus, & dipsadis, & haemorrhoidis ictum.

AT si cerasus, aut dipsas, aut haemorrhoidis percussit * asphodeli, quod Aegyptiae faba * catapotium magnitudinem aequet, arefactum, in duas portiones dividendum est, sicut ei ruta paulum adijciatur. Trifolium quoq; & mentastrum, & cum aceto panaces aquae proficiunt. Costumq; & casia, & cinamomum recte per potionem assumuntur.

Aduersus chersydri ictum, & cerasus.

ADuersus chersydri vero ictum, panaces, aut laer, quod sit scrupulorum * p. 11. *. vel por- * 1119.
 ti succus cum hemina vini sumendus est, & eden *. 1.
 da multa saturia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum, aut ex eodem

dem ordeacea farina, aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoq; vulnere, quod crastes fecit, aquè valet.

Aduersus phalangii ictum.

Vbi verò phalangium nocuit, præter cā curationē qua manu redditur, sape homo demittendus in solium est, dandueq; ei myrrha, & vnataminiq; per modum ex passi hemina, vel radicle semen, aut lolij radix ex vino, et super vulnus furfures ex aceto cocta, imperandūq; ut is cōquiescat.

Aduersus ictos italorum anguium, qui minus terribiles peregrinis sunt.

Veram hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt, maximeq; adluosis locis gignuntur. Italia, frigidiorēq; regiones hac quoq; parte salubritatē habent, quā minus terribiles angues edunt. Aduersus quas satis proficit herba betonica, vel cantabrica, vel centaurion, vel egrimonia, vel trix igo, vel persennia, vel marina pascinata, singulę binariis trites, & cum vino potui data, & super vulnus impressa. Illud ignorari non oportet, omnis serpentis ictum & ieiuni, & ieiunio magis nocere. Ideoq; perniciosissimi sunt cum incubant. Utilissimumq; est, ubi ex anguib; metus est, non ante progredi, quā quis aliquid assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia venena, vel in cibo, vel in potione assumpta.

Non tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potione sumpserunt.

Primo

Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue
icti, ita ne succurrere quidam statim sibi possunt.
Deinde, quia noxa non à cute, sed ab interioribus
partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi
primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto
vomere. Deinde, ubi praeordia exhaustit, bibere
antidotum. Si id non est, vel merum vinum.

Specialia remedia aduersus quaedam venena, &
primo aduersus cantharidas.

Sunt tamē quaedam remedia propria aduersus
quoddā venena, maximeq; leniora. Nā si can-
tharidas aliquis ebibit, panaces cū lacte contusa,
vel galbano, vino adiecto dari, vel lac p se debet.

Aduersus cicutam.

Si cicutam, vinum merum calidum cum ruta
quamplurimum ingerendum est, deinde is vo-
mere cogendus. Posteaq; laser ex vino dandum.
Isq; si fibre vacat, in calidum balneum mittendus.
Si non vacat, ungendus ex calefacientibus est.
Post quae quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum.

Si hyoscyamum, si ruens mulsum bibendū est,
aut quodlibet lac, maxime tamen asininum.

Aduersus ceruffum.

Si cerussim, ius maluae, vel ius glandis ex vino
contrita, maxime prosunt.

Aduersus sanguisugam si epota est, & lac
quod intus cont.

Si sanguisuga epota est, acetum cum sale bi-
bendum est. Si lac intus coit, aut passum, aut
coag

coagulatum, aut cum aceto laser.

Aduersus fungos inutiles.

SI fungos inutiles quis assumpserit, radicum aut epota, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi vero hi & specie quidem discerni possunt ab utriusque ^{*} feri libus, & coctura genere idonei ^{*} sunt. Nam siue ex oleo inferbuerunt, siue piri surculus cum his inferbuit, omni noxa vacant.

De aduulsis corporis locis, & quomodo curari debent.

ADustis quoque locis extrinsecus vis infertur, itaque sequi videtur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur folijs aut lilij, aut lingua canina, aut betæ in vetere vino oleoque decoctis. Quorum quodlibet protinus impositum, ad sanitatem producit. Sed dinidi quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimentiaque, primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculam exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticula cum melle, farina, vel myrrha, vel vino, creta cimolia cum thuris cortice contrita, & aqua cocta, atque ubi usus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus quælibet lipara. Sed idonea maxime est, quæ vel plumbi recrementum, vel vitellos habet. Est etiam illæ aduulsum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam. Ubi ea declinavit farina cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crustæ cadant. Tumorum cum melle, aut irim,

aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit. Nouissime siccum linamentum.

De interioribus vlcenibus, quæ aliqua corporum parte corrupta nascuntur. CAP XXVIII.

De carbunculo, & eius curatione.

AB his quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est quæ interius corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. Eius hæc nota sunt: Rubor est, superq; cum non nimium pustula eminent, maxime nigra, interdum sublivida, aut pallida. In his sanies esse videtur, infra color niger est. Ipsum corpus aridum, & durius quàm naturaliter oportet. Circa quæ quasi crusta est, eaq; inflammatione cingitur, neq; in eo loco lenari cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget, nonnunquã horror, aut febris oritur, aut utrunq;. Idq; vitium subtrahitis quasi quibusdã radicibus serpit, interdum celerius, interdum tardius, supra quoq; procedens inalbescit, dein lividum fit, circumq; exigua pustule oriuntur. Et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit. Nihil melius est, quàm protinus adurere. Neq; id grave est. Nam non sentit, quoniam ea caro mortua est. Finisq; adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta undiq; a viva carne diducta, qua trahit secum quicquid corruptum erat, purusq; iam sinus curari potest.

potest implētibus. At si in summa cute vitium est, possunt succurrere quadam vel excedentia tantū, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumq; verò medicamentum possum est, si satis proficiat, protinus à viua corruptā partem resolvit. Certa q; esse fiducia potest, frē ut vndiq; vitiosa caro excedat, qua huius rei medicamen exest. Si id non sit, medicamentumq; malo vincitur, vtiq; ad usienem properandum est. Sed in eiusmodi casu abstinendum à cibo, à vino est. Aquā liberaliter bibere expedit. Magisq; ea servanda sunt, si fibracula quoq; accessit.

De Carcinomate, & eius curatione.

Non idem periculum læguivromæ affert, nisi imprudentia curantis agitata est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciē, nares, aures, labr., mammas sanivarrē. Et in iecore autem, aut splenē hoc nascitur. Circa locū aliqua quasi punētz sentiuntur, isq; immobilis, inæqualitū tumet, interdum etiā torpet. Circa eum inflatę venę quasi recurvantur, hęq; pallent, aut livent, nōnunquam etiam in quibusdam deficiunt. Tactusq; is locus, alijs dolorem effert, in alijs enim non habet. Et nonnunquam siue ulcere aurior aut mollior est, quam esse naturaliter debet, nonnunquam iisdem omnibus ulcus accedit. Interdumq; nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quæ vocant Græci νοδὸν ὁματῆα, aspredine quadam & magnitudine sua. Colorq;

ei

eius tuber est, aut lenticule similis, neq; tuto fertur. Nā protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Sape homo ictus obmutescit, atq; eius anima deficit. Quibusdam etiā si id ipsum pressū est, quæ circa sunt, intenduntur & intumescent. Nanq; pessimum id genus est, siq; primū id sit, quod *κακοῦθες* à Græcis nominatur. Deinde ex eo id *καπλιρρωπία*, quod sine ulcere est. Deinde ulcerus ex eo thymū. Tolli nihil nisi *κακοῦθες* potest, reliqua curationibus irritantur. Et quo maior vis adhibita est, eo magis quidā vti sunt medicamentis adurentibus. Quidā ferro adusserūt. Quidā scalpello exciderūt. Neq; ulli unquā medicina proficit. Sed adusta protinus concitati sunt, & increverunt, donec occiderent. Excisa etiā post inductā cicatricem, tamen reverterūt, & causā mortis attulerunt. Cum interim pleriq; nullam vim adhibendo, quæ tollere id malum tentent, sed imponendo tantū levia medicamenta, quæ quasi blandiantur, quo minus ad ultimā senectutem perveniant, non prohibētur. Discernere autē *κακοῦθες*, quod curationē recipit, à carcinomate, quod non recipit, nemo scire potest, nisi tēpore & experimēto. Ergo ubi primū id vitium notatū est, imponi debent medicamentā adurentia. Si levatur malū, minuiturq; eius indicia, procedere curatio potest, & ad scalpellum, & ad vstionē. Si protinus irritatum est, scire licet iam carcinoma esse, remouendaq; sunt omnia acria, omnia vehementia. Sed si

sine ulcere is locus durus est, imponi sicum quam pinguisimam, aut rhyppodes emplastrum satis est. Si ulcus aequale est, ceratū ex rosa iniiciendū est, adijciendusq; ei pulvis ex contrita testa, ex qua sber ferrarius tingere candens ferrū solitus est. Sed si id nimium supercreuit, tentanda squama erit est, quæ lenissima ex adurentibus est, eatenus ne quid eminere patiatur, sed ita, si nihil exacerbat. Si minus, eodē cerato cōtenti esse debeamus.

De Theriomate, & eius curatione.

Est etiam ulcus, quod *ἰσθμια* Græci vocant. Id & per se nascitur, & interdum ulceri ex alia caussa factō superuenit. Color est vel lividus, vel niger, odor fædus, multus, & musco similis humor. Id ipsum ulcus neq; tactum, neque medicamentum sentit, prurigine tantum moetur. At circa dolor est, & inflammatio. Interdum etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erūpit. Ad id quoq; malū serpit. Quæ omnia saepe intenduntur. Fitq; ex his ulcus, quod *ἰσθμια* Græci vocant, quia celeriter serpendo, penetrandoq; usque ossa corpus vorat. Id ulcus inaequale est, cæno simile, inestq; multus humor glutinosus, odor intolerabilis, maiorq; quam pro modo ulceris inflammatio. Vtrunq; sicut omnis cancer, sit maxime in senibus, vel his, quorum corpora mali habitus sunt. Curatio utriusq; eadem est, sed in maiore malo magis necessaria. Ac primum à victus ratione ordinandus est, & quies

Quiescat in lectulo, ut primis diebus à cibo abstineat, aquam quàmplurimam assumat. Aluus quoq; ei ducatur. Dein post inflammationem cibum boni succi capiat, vitatis omnibus acerbis, potionis quātū volet, sic, ut interdum quidā aqua contentus sit. In cœna etiam vini austeri aliquid bibat. Non aequè tamen fame in his quos herpes urget, atq; in his qui therioma adhuc habebūt, utendum erit. Et victus quidem talis necessarius est. Super vlcus verò inspergenda est arida aloë, ænanthe, & si parū proficiet, chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne natus est, cōtegendus antè linteolo est, ne sub eo medicamēto aduratur. Si validioribus etiam remedijs opus est, ad eas compositiones veniendū est, quæ vehemētius adurant. Quicquid autem inspergitur, averso specillo infundi debet. Superdanda cum melle sunt vel linamēta, vel olea folia ex vino decocta, vel marrubium, eaq; linteolo contegenda in aqua frigida madesfacto, dein bene expresso. Circaq; qua tumor ex inflammatione est, imponenda, quæ reprimant, cataplasmata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet, diligenter nervis, si qui adparēt, antè contectis. Adustum vel medicamentis, vel ferro corpus, primum purgandum, deinde implendum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne, & eius curatione.

Sacer quoq; ignis, malis vlceribus annumerari debet. Eius duæ species sunt: Alterum

fortissi-
um

est subrubicundū, aut mistum rubore atq; pallore, exasperatūq; per pustulas continuas, quarum nulla altera maior est, sed plurimae perexiguae. In his semper ferè purus, & saepe rubor cum calore est, serpitq; id nonnunquam sanescente eo, quod primum vitiatum est, nonnunquam etiam exulcerato, ubi ruptis pustulis ulcus continuatur, humorq; exit, qui esse inter saniem, & pus videri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, praecipueq; in plantis. Alium autem est in summa cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublividum, inaequaliter tamen, mediūq; sanescit, extremis procedentibus, ac saepe id, quod iam sanū videbitur, iterum exulceratur. At circa proxima cutis quae vitium receptura est, tumidior & durior est, coloremq; habet ex rubro subnigrum. Atq; hoc quoq; malo ferè corpora seniores tentantur, aut quae mali habitus sunt, sed in cruribus maxime. Omnis autem sacer ignis, ut minimum periculum habet ex his quae serpunt, sic propè difficilimè tollitur. Medicamentum eius^{us} fortissimè est, uno die febris, quae humorem noxium absumat. Cuius quo crassius & albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra os ulcerum ladi, quo plus puris exeat, & id quod ibi corruptum corpus est, extrahat: sed tamen si fibracula accipit, abstinentia, lectulo, alui ductione opus est. In omni verò sacro igni neque lenibus, & glutinosis cibis, neque salsis & acri-

bui

bus vitendum est, sed his quæ inter utrunq; sunt, qualis est panis sine fermento, piscis, hædus, aues, exceptoq; apro omnis fere venatio. Si nõ est fibrilla, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinũ austerrum, & balneum. Atq; in hoc quoq; genere potio magis liberalis esse, quàm cibus debet. Ipsa autem ulcera si mediocriter serpũt, aqua calida: si vehemẽtius, vino calido fouenda sunt. Deinde acu pustule quæcunq; sunt aperienda. Tum imponenda ea, quæ, putrem carnẽ exedant. Vbi inflammatio sublata, vlcus purgatiũ est, imponilene medicamentũ debet. In altero autem genere possunt proficere mala cõtonea in vino cocta, atq; cõtrita. Potest emplastrũ vel Hieræ, vel tetrapharmacum, cui quinta pars thuris adiecta sit. Potest nigra hedera ex vino austero cocta. Ac si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato ulcere, quod in summa cute esse proposui, satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficient.

De chironio vlcere, & eius curatione.

Chironium autẽ vlcus appellatur, quod & magnũ est, & habet oras duas, callosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neq; in vlcere, neque in eius * tumore est. * hume
Nulla inflammatio, dolor modicus est, nihil serpit, ideoq; nullum periculum adsit, sed nõ facile sanescit. Interdũ tenuis cicatrix inducitur, deinde iterũ rumpitur, vlusq; renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Super id imponi debet,
v 4 quod

quod & lenē aliquid, & vehemens, & reprimēs
 habeat. Quale eius rei causa sit ex his, Squama
 eris, plumbi eloti combusti, singulorum P. IIII. *.
 cadmia, cara, singulorum P. VIII. *. rosa quan-
 tum satis est ad caram simul cum eis molliendam.

De ulceribus quæ ex frigore in pedibus & mani-
 bus oriuntur, & eorum curationibus.

χίμαλλον
 hoc genus
 ulceris di-
 citur à Græ-
 cis, à Lati-
 nis Pernio

Flunt etiam ex frigore hyberno ulcera, maxi-
 me in pueris, & præcipuè pedibus, digitisq;
 eorum, nonnunquam etiam in manibus. Rubor
 cum inflammatione mediocri est. Interdum pustula
 oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem medi-
 cus. Prurigo maior est, nonnunquam humor exit,
 sed non multus, qui referre vel pus, vel sanie vi-
 detur. In primis multa calida aqua fouendum est,
 in qua rapa decocta, aut si ea non sunt, aliqua
 verbenæ ex reprimentibus. Si nondum adaperitum
 ulcus, ac quam maxime calidum quis pati potest,
 admonendum est. Si iam exulceratio est, imponi de-
 bet alumē, aqua portione cum thure contritum,
 cum vino adiecto, aut malicorium in aqua coctum,
 deinde contritum. Si summa detracta pellicula est,
 hic quoq; melius lenia medicamenta proficiunt.

De struma, & eius curatione.

Struma quoq; est tumor, in quo subter con-
 creta quadam ex pure & sanguine, quasi
 glandula oriuntur. Quæ vel præcipuè fatigare me-
 dicos solent, quoniam & febres mouent, nec un-
 quam facile maturescunt, & siue ferro, siue me-
 dicam

dicamentis curantur. Plerūq; iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq; post medicamento est opus. Quibus id quoq; accedit, quod longo spatium detinent. Nascuntur maxime in cervice, sed etiam in alis & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoq; sœminarum se reperisse, Chirurgicus Megeas autor est. Propter hæc & album veratrum recte datur, atq; etiam sœpius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quæ humorem vel educant, vel dissipent, quorum supra mētio facta est. Adurentibus quoq; quidā utuntur, quæ exedunt, crustaq; eum locum astringunt: tunc verò ut ulcus conterant. Quæcunq; autem ratio curandi est, corpus puro ulcere exercendum, atque alendum est, donec ad cicatricem perveniat. Quæ cum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet, eum, si anguem edit, liberari.

De Furunculo, & eius curatione.

Furunculus verò est tuberculū acutum cum
 * inflammatione, & dolore, maximeq; ubi * infla-
 iam in pus vertitur. Qui ubi ad apertus est, & tione
 exit, super adparet pars carnis in pus versa, pars
 corrupta subalbida, subrubra, quem vetriculum
 quidam furunculi nominant. In eo nullum peri-
 culum est, etiā si nulla curatio adhibeatur. Ma-
 turescit enim per se, atq; erumpit. Sed dolor effi-
 cit, ut potior medicina sit, quæ maturius liberet.
 Proprium eius medicamētum galbanum est. Sed

alia quoq; suprà comprehensa sunt. Si cetera desunt, imponi debet primum non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde si non repressit, quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidem est, vel resina, vel fermentum. Expresso pure, nulla vltra curatio necessaria est.

De Phymate, & eius curatione.

Phyma verò nominatur tuberculum furunculo simile, sed rotundius & planius, saepe etiam maius. Nam furunculus oui dimidij magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latus patere consuevit, sed inflammatio dolorq; sub eo minores sunt. Vbi euulsus est pus, eodem modo adparet ventriculus, quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & saepius nascitur, & facilius tollitur, in iuuenibus rarius oritur, & difficilius curatur. Vbi atas indurauit, ne nascitur quidem. Quibus verò medicamentis discureretur, suprà propositum est.

De Phygethlo, & eius curatione.

Phygethlon autem est tumor, non altus, sed latus, in quo quiddam pustula simile est. Dolor distentioq; vehemens est, & maior quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam fibrilla, idq; tarde maturascit, neq; magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in vertice, aut in alis, aut in inguinibus. Panem, ad similitudinẽ signare, nosiri vocant. Atq; idipsam quo medicamentis soltere

tolleretur, *suprà* demonstravi. Sed cum omnes hi
 nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen
 trahit latius vitium ad suppurationem spectans.
 Idq; frè fit aut post febres, aut post dolores partis
 alicuius, maximeq; eos, qui ventrem instarunt.
 Sapiusq; oculis expositum est, siquidè latius ali-
 quid intumesceat ad similitudinē eius, quod phy-
 ma vocari proposui, rubetq; cum calore, & paulò
 pòst etiam cum duritie, magisq; innocenter indo-
 lescit, & sitim vigiliāq; exprimit. Interdum ta-
 men nihil horum in cute deprehēdi potest, maxi-
 meq; ubi altius pus movetur. Sed cum siti vigi-
 liāq; sentiūtur intus aliqua punctiones, & quod
 de subito durius non est, melius est: & quamvis
 non rubet, coloris tamē aliter mutati est. Quæ si-
 gna iam pure oriente nascuntur. Tumor ruborq;
 multo antè incipiūt. Sed si locus mollis est, aut
 rēdus is materię aditus est per cataplasmata, quæ
 sunul & reprimunt, & refrigerant, qualia &
 aliis & paulò antè in Erysipelate proposui. Si iā
 durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, &
 resolvant: qualis est ficus arida, contusa: aut fex
 mista cum carato: quod ex adipe suilla coactū sit,
 aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes
 adiectæ sint, antè ex mulso decocta, Licet etiā mi-
 scere æquis portionibus ammoniacū, galbanum,
 propolim, viscum, pendusq; adycere myrrha di-
 midio minus, quam in prioribus singulis erit.
 Atq; emplastra quoq; & malagmata idē efficiunt,

qua

qua supra explicui. Quod per hæc discussum non
 est, necesse est, matureseat. Idq; quæ celerius fiat,
 imponenda est farina ordeacea, ex qua cocta re-
 ctè miscetur. Eadē autem hæc in minoribus quoq;
 abscessibus, quorum nomina proprietatesq; supra
 reddidi, rectè sunt. Eademq; omniū curatio, tan-
 tummodo distat. Crudum est autē, in quo magis
 quasi venarum motus est, & gravitas, ut ardor,
 & distentio, & dolor, ut rubor, & durities. Et si
 maior abscessus est, horror aut etiam febricula
 permanet, penitusq; condita suppuratio. Si pro-
 his quæ alibi cutis ostendit, punctiones sunt, ubi
 * iamq; is ista se remiserit, * iāq; cutis prurit, & aut sub-
 locus pru- lividus, aut subalbidus est, matura suppuratio
 rit est, eaq; ubi vel per ipsa medicamenta, vel etiam
 ferro aperta est, pus debet emitti. Tum si quæ in
 alis, vel inguinibus sunt, sine linamento nutriē-
 da sunt. In cæteris quoq; partibus, si una plaga
 exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si nō altè
 penetravit, si febris non est, si valet corpus, æquē
 linamēta supernacua sunt. In reliquis, parce ta-
 men, nec nisi plaga est, imponi debent. Commodè
 verò vel super linamenta, vel sine his imponitur
 lenticula ex melle, aut malicorium ex vino co-
 ctū. Quæ & per se, & mista idonea sunt. Si quæ
 circā duriora sunt, ad ea mollienda, vel malua
 cōtrita, vel sæni Graci, lini ve semen ex passō co-
 ctum superdandum est. Quicquid deinde imposi-
 tum est, non astringi, sed modicè deligari debet.

illo neminem decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cetera quæ pertinent ad purgandum vulnus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conueniuntq; in vulneribus, exposita sunt.

De Fistulis, & earum generibus, & curationibus.

Nonnunquam autem ex eiusmodi abcessibus, & ex alijs ulcerum generibus Fistula oriuntur. Id nomen est ulceri alto, angusto, calloso. Fit in omni scilicet parte corporis, habetq; quædam in singulis locis propria. Prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. Siquidem aliæ breues sunt, aliæ altius penetrant, aliæ rectè intus feruntur, aliæ multoq; plures transuersæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplicés væ ab vno ore intus orse, quæ tres sunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur, aliæ rectæ, aliæ flexæ, & tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa, aut cartilaginē penetrāt, aut ubi neutrum horum subest, ad interiora perueniunt. Aliæ deinde facili, aliæ cum difficultate curantur. Atque etiam quadam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici recenti intra carnē, adiunatq; ipsum corpus, si iuuenile, si firmū est. Inimica, contraria his sunt. Itemq; si fistula, os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos læsit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vuluam, vel ad grandes venas arteriās ve, vel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracē penetravit. Ad intestina quoq;

cā tendere semper periculosum, saepe pestiferū est. Quibus multū mali accedit, si corpus vel agram, vel senile, vel mali habitus est. Ante omnia autem denitti specillum in fistulam conuenit, et quò tendat, & quā alte perueniat, scire possumus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit: quod extracto specillo patet. Si verò os in vicino est, id quod disci potest, si iam necne, eò fistula penetravit, quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est. Si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si elabitur specillum, nondum caries est: si non labitur. sed aequali innititur, caries quidē, verū adhuc levis est. Si inaequale quoq; & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago ubi subhasit, ipsa sedes docet, peruentumq; esse ad eam ex renixu potest. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxae. Simples verò haec sint, an in plures partes diducātur, cognosci potest ex modo parit, cuius si plus fertur, quā quod simplici spatio cōuenit, plures sinus esse manifestū est. Cumq; ferē iuxta sint caro, & nervus, & aliqua nervosa, quales ferē tunica, mēbranaq; sunt: genus quocq; parit docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera perferant. Siquidem ex carne proleue, album copiosius fertur. At ex nervoso loco coloris quidē eiusdem, sed tennius & minus. Ex nervo pingue, & oleo non dissimile. Deniq; etiā corporis

corporis inclinatio docet, num in plures partes fistula penetrarint, quia saepe cum quis aliter decubuit, aliterq; mēbrū collocavit, pus ferri, quod iam desierat, incipit, testaturq; non solum alium sinum esse ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. Sed si & in carne, & recēs, & simplex est, ac neq; rugosa, neq; cana sede, neq; in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore movetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salē, vel alumen, vel squamam aris, vel aruginem, ex metallicis aliquid. Exq; eo collyrum fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idq; ea parte qua tenuius est, altera antecedēte demitti oportet in fistulā, donec sanguis purus se ostendat. Quae in omnibus fistularum collryis perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo super imponendū, supraq; injiciendo spongia, in acētū ante demissā, solui quinto die satis est. Genusq; victus adhibendum est, quo carnem ali docui. Ac si longius a praecordijs fistula est, ex intervallo ieiunium radicales edissē, deinde vomere, necessarium est. Venustate caūosa fit fistula. Callus autem neminem fallit, quia durus est, & aut albus, aut pallidus. Sed tam validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaveris lacrymae P. I. *. Gummi P. III. *. cadmia P. IIII. *. atramenti iutorij P. VIII. *. Ex quibus aqua coactū collyrum

Callus.

rimum

[^] P. I. rium fit. Aut in quo sunt galla * P. *. eruginis,
 sandaraca, aluminis Aegyptij, singulorum P. I. *.
 atramenti sutorij cōbusti P. II. *. Aut quod cō-
 stat ex chalcitide, & saxo calcis, quibus auripi-
 gmenti dimidio minus, quàm in singulis prioribus
 est, adijcitur, eaq; melle cocto excipiuntur. Ex-
 peditiſſimu autem est ex præcepto Megeis, eru-
 ginis rasa P. II. *. conterere, deinde ammoniaci,
 thymiamatis P. II. *. aceto liquare, eoq; infuso ex
 erugine colligere. Idq; ex primis medicamentis est.
 Sed ut hac maximi effectus sunt, si cui ista non
 adsunt, facile tamen est callum quibuscumlibet ad-
 rentibus medicamentis prodere, aut quibus hoc
 maxime in effectu sunt erodere. Satiusq; est vel
 papyrus intortum, vel aliquid ex penicillo in
 modum collyrij astrictum eo illinere. Scilla quoq;
 cocta & mista cum calce, callum exest. Si quando
 verò longior & trāsversa fistula est, demisso spec-
 cilla contra principium huius incidi, commodissi-
 mum est, & collyriu* utrinq; demitti. At si du-
 plicem esse fistulam, aut multiplicē existimamus,
 sic tamē ut brevis, intraq; carnem sit, collyrio utri-
 usq; non debemus, quòd unam partem curet, reliquas
 omittat: sed eadem medicamenta arida in cala-
 mum scriptorium coniicienda sunt, isq; ori fistulae
 aptandus, inspirandumq; , ut ea medicamenta
 intus compellantur. Aut eadem ex vino liquan-
 da. Vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callo-
 sior, ex aceto sunt: atq; intus infundendum quic-
 quid

quid inditum est. Superponenda sunt quae resfrigerent & reprimant. Nam si frè quae circa fistulam sunt, habet aliquid inflammationis. Neque alienum est ubi quis resoluerit, antequam rursus alia medicamenta coniiciat, per oricularium chysterem fistulam eluere. Si plus puris fertur, vino: si callus durior est, aceto: si ià purgatur, mulso, vel aqua, in qua eruum coctum sit, sic ut huic quoque mellis paulis adijciatur. Fere verò fit, ut ea tunica quae inter* framentum & integram carnem est, victa* forame
 medicamentis tota exeat, infraque; ulcus purum sit. Quod ubi contigit, imponenda glutinantia sunt, praecipueque; spogia melle cocto illita. Neque ignoro multis placuisse, linamentum in modum collyrii compositum, tinctum melle demitti. Sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori iunctum, non coeat, adiectis quoque medicamentis ad id efficacibus, cum saepe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in unum eos iungat.

De Meliceria.

Est etiam ulceris genus, quod & à fani similitudine *μεινρηξία* à Graecis nominatur, idque duas species habet. Alterum subalbidum furunculo simile, sed maius, & cum dolore maiore. Quod ubi maturescit, habet foramina per quae fertur humor glutinosus, & purulentus, nec tamen ad iustam maturitatem pervenit. Si divisum est, multo plus intus corrupti quam in
 x furunc

furunculo apparet, altiusq; descendit. Rarò fit nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus emmens, durum, latum, subviride, subpallidum, magis exulceratum. Siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per qua fertur humor glutinosus subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci referens, interdum olei. Si inciditur, viridis intra caro apparet. Dolor autem, & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem mouere cõsuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est, rectè imponitur & ficus arida, & lini semen * in mulso co-
vino co-
ctum
ctum, & emplastra ac malagmata materiam educentia, aut quæ propriè huic pertinentia, supra posui. Super alterum, & ea medicamenta, & farina ex mulso cocta, sic ut ei dimidium resinae terebinthinæ misceatur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & una taminia pars quarta fico adiecta: Quæ si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum vlcus usque ad sanam carnem excidi oportet, & vlcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt, primum quæ pus citent, deinde quæ purgent, tum quæ impleant.

De Acrochordone, & Thymio, & Myrmecis,
& Clauo, curationibusq; eorum.

Sunt quedam verò verrucis similia, quorum diuersa nomina, ut vitia sunt. Acrochordona Græci vocant, ubi sub cute coit aliquid durissimum

rius, & interdum paulo asperius, coloris eiusdem, infra tenue, ad cutem latius, idq; modicum est, quia raro faba magnitudinem excedit. Vix unū tātum eodem tempore nascitur, sed frē plura maximeq; in pueris, eaq; nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflātionem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At Thymion nominatur, quod super corpus quasi verrucula eminet, ad cutē tenue, supra latius, subdurum & in summo perasperum. Idq; summum colorem floris thymi repræsentat, unde ei nomen est, ibiq; facile finditur, & cruentatur, nonnunquam aliquantū sanguinis fundit, fireq; circa magnitudinē fabæ Aegyptiæ est, raro maius, interdum perexiguum, modo unum, modo autem plura nascuntur, vel in talis, vel palmis, vel inferioribus pedum partibus. Pessima tamen in obsecanis sunt, maximeq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autē vocantur, humiliora thymio, durioraq; quæ radices altius exiguūt, maioremq; dolorem mouent, infra lata, super autem tenuia, minus sanguinis mittunt, magnitudine vix unquam lupini modū excedūt. Nascuntur ea quoq; aut in palmis, aut inferioribus partibus pedum. Clauus autē nonnunquam quidem etiā alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præcipuè tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, doloremq; etiam, si non aliàs, tamen ingredienti mouet. Ex his Acrochordon, siue Thymium sæpe

etiam per se finiuntur: & quo minora sunt, et magis. Myrmecia & clavi sine curatione vix unquam desinunt. Acrochordon si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoq; ne remanescit quidem. Thymio clavoq; excisis subter rotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad carnem, eaq; relicta idem rursus * exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhaerent, ideoq; ne excidi quidē sine exulceratione magna possunt. Clavum subinde deradere commodissimum est. Nam sine ulla vi sic emollescit, ac si sanguinis quoque aliquid emissum est, saepe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulveris paulum, quem ex lapide molari contrito fecit. Cetera verò genera medicamentis adurenda sunt. Alijsq; id quod ex fece vini: myrmecys id, quod ex alumine, & sandaraca fit, aptissimum. Sed ea, quæ circa sunt, folijs contegi debent, ne ipsa quoque exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thymum etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus, & earum curationibus.

AT pustula maximè vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. nam modo circa totum corpus partemque conspersio quadam fit, similis his pustulis, quæ ex urtica, vel ex sudore nascuntur, ἡ ἔκρυψα, ἡ ἔκρυφα Græci vocant, eaq; modo rubent, modo colorem cutis non exci-
dunt.

dunt. Nonnunquam plures similes Varis oriuntur, nonnunquam maiores pustula livide, aut pallida, aut nigra, aut aliter naturali colore mutato, subestq; humor. Ubi haerupta sunt, infra quasi exulcerata caro adparet, * *ἰκκῶδης* Græcè nominatur. ** φλυκτα*
Fiunt vel ex frigore, vel ex igni, vel ex medicamentis. Psudration autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta, ex qua ipsa quod exprimitur humidum est. Ex pustulis verò nonnunquam etiam ulcuscula sunt, aut aridiora: & humidiora: & modò tantum cum prurigine, modò etiam cum inflammatione aut dolore. Exitq; aut pus, aut sanies, aut utriusque. Maximeq; id evenit in ætate puerili, raro in medio corpore, sæpe in eminentibus partibus. Pessima pustula est, quæ *ἰκκῶδης* vocatur. Ea colore vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem vehemens, inflammatio est, & cum adaperita est, reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est, neq; enim ea faba maior est. Atq; hæc quoque oritur in eminentibus partibus, & firè noctu. Unde nomen quoque à Græcis ei *Epinyctis* impositum est. In omni verò pustularum curatione primum est, multum ambulare, atq; exerceri. Si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere, abstinere ab omnibus acribus, & extenuantibus, eademq; nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Præter hæc is qui

iam robustus est, si pustula minuta sunt, descendere in balneo debet, simulq; super eas nitrū inspergere, oleoq; vinum miscere, & sic vngi. Tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupavit, imponenda lenticula est, detractaq; summa pellicula ad medicamenta lenia transcendendum. Epinyctis post lenticulam rectè herba quoq; sanguinali, vel viridi coriandro curatur. Ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine sæni graci mista, sic, et his inuicè rosa, atq; intubi succus adijciatur, donec mellis crassitudo fiat. Propriè ad eas pustulas, quæ infantes male habent, lapidis, quem pyriten vocant P. V I I I. *. cū quinquaginta amaris nucibus miscetur, adijciunturq; olei cyathi tres. Sed prius vngi ex cerussa pustula debet, tū hoc illini.

De Scabie, & eius curatione.

* alias, **S**cabies verò est, * durior cutis rubicundior, ex humor cu
tis rubi- qua pustula oriuntur, quadam humidiores,
cundus fitq; ex his continuata exulceratio pruriens, ser-
pitq; in quibusdam citò. Atque in alijs quidem
ex toto desinit, in alijs verò certe tempore anni
revertitur. Quo asperior est, quoque prurit ma-
gis, eò difficilius tollitur. Itaque eam, quæ talis
est, ἀγρία (id est fera) Græci appellant. In
hac quoque victus ratio eadem quæ suprà neces-
saria est. Medicamentum autem ad incipientem
hanc idoneum est, quod fit ex spodij, croci, erugi-
nis,

nis, singul. P. I. ✱. piperis albi, omphacij, singulorum P. I. ✱. cadmie P. VIII. ✱. Aut ubi iam exulceratio est, id quod fit ex sulphuris P. I. ✱. cere P. III. ✱. picis liquida hemina, olei sextariis duobus, quæ simul incoquuntur, dum consistudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum autorem refertur. Habet hoc farina lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquida heminam, resina humida scilicet, aceti cyathos tres. Crocū quoq; lyciū, arugo, myrrha, cinis, aquis portionibus recte miscētur, et ex passō coquuntur. Idq; omnē pituitā ubiq; sustinet. Ac si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, vel sulphur pice liquida mistum, sicut in pecoribus proposui, hominibus quoq; scabie laborantibus opitulatur.

De Impetiginis speciebus, & curationibus.

Impetiginis verò species sunt quatuor. Minimè mala est, quæ similitudine scabiem representat. Nam & rubet, & durior est, & exulcerata est, & roditur. Distat autem ea, quia magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet, videnturq; esse in ea quasi bullulle quadam, ex quibus interposito tempore squamula resolvuntur, certioribusq; hoc temporibus reuertitur. Alterum genus peius est, simile papula ferè, sed asperius, rubicundusq; , figuras varias habens: squamula ex summa cute* descendunt, rosio ma-

*discedū

etiā nonnunquam prior temporibus & fit, & desinit, Rubrica cognominatur. Tertia etiamnum deterior est: nā & crassior est, & durior, & magis tumet, in summa cute funditur, & vehementius rodit. Ipsa quoq; squamosa, sed nigra procedit, & latè, & tardè eminus serpit. In temporibus aut oritur, aut desinit, neq; ex toto tollitur, Nigre cognomen est. Quartum genus est, quod curatione omnino non recipit, distans colore. Nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile, squamulaq; habet pallidas, quasdā subalbidas, quasdam lenticali similes, quibus demptis, nonnunquam profuit sanguis. Alioqui verò humor eius albidus est, cutis dura, atq; fissa est, proceditq; latus. Haec verò omnia maxime genera oriuntur in pedibus, & manibus, atq; ungues quoq; infestant. Medicamentū non aliud valētius est, quam quod ad scabiem quoq; pertinere sub autore Protarcho reculi. Serapion autē nitri p. 11. ✱. sulphuris p. 1111. ✱. excipiebat resina copiosa, eoq; utebatur.

De Papulis, & eius curatione.

Papularum verò duo genera sunt. Altera est in qua per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet, leviterq; roditur: medium habet pauxillo lenius, tarde serpit, idq; vitium maximè rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam àgyptiā id est, sceram Græci appellant. In qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturq;

turq; ac vehementius & roditur, & rubet, interdum etiam pilos remittit. Quæ minus rotunda est, difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginē vertitur: sed levis papula, etiam si ieiuna salina quotidie defricatur, sanescit. Maior commodissime murali herba tollitur, si sub ea detrита est. Ut vero ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi tanto valentius in his est, quanto minus in his vitij est: alterum ad idem Myronis, nitri rubri, thuris, singul. ꝑ. i. *. cantharidū purgatorum ꝑ. ii. *. sulphuris ignem non experti tā-
 zundē, resinę terebinthinę liquidę ꝑ. xx. *. farine
 * lolij semis, gith cyathos tres, picis cruda * unum. * lolij
 sext.

De Vulliginis speciebus, id est, de Albo, & Me-
 lane, & Leuce, & earum curatione.

III.

* sext.

Vitiligo quoq; , quamvis per se nullum peri-
 culum adfert, tamen fada est, & ex malo
 corporis habitus fit. Eius tres species sunt. Ἀλφ &
 vocatur, ubi color albus est, frē subasper, & non
 continuus, ut quādā quasi gutta dispersa esse vi-
 deantur. Interdu etiam latius, & cum quibusdā
 intermissionibus serpit. Μελας colore ab hoc dis-
 fert, quia niger est, & umbra similis. Cetera eadē
 sunt. Λευκὴ habet quiddam simile ἄλφῳ, sed ma-
 gis albida est, alius descendit, in eaq; albi pili sunt,
 & lanugini similes. Omnia hæc serpiūt, sed in alijs
 celerius, in alijs tardius. Ἀλφῳ & Μελας in qui-
 busdā varijs temporibus & oriuntur, & desi-
 nunt. Leuce quem occupavit, non facile dimittit.

Priora curationem non difficillimam recipiunt,
 ultimum vix unquam sanescit, ac si quid ex vi-
 tio demptum est, tamen non ex toto sanus color
 redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile
 sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi
 enim cutis debet, aut acu pungi. Si sanguis exit,
 quod frè sit in duobus prioribus, remedio locus
 est: si humor albidus, sanari nō potest: itaq; ab hoc
 quidem abstinendum est. Super id verò, quod cu-
 rationem recipit, imponenda lenticula mista cura
 sulphure & thure, sic ut ea contrita ex aceto sit.
 Aliud ad idem, quod ad Hirenæum autorem re-
 fertur, Alcyonium, nitrum, euainū, fici folia ari-
 da paribus portionibus contunduntur, adiecto
 aceto. His in sole vitiligo perungitur, deinde nō ita
 multo post, ne nimis erodatur, eluitur. Proprie
 quidem Myrone autore eos, quos Alphos vocari
 dixi, hoc medicamento perungunt, sulphuris * 2.
 II. *. nitri P. IIII. *. myrrhæ aridæ contrita ace-
 tabulum miscent, deinde in balneo super vitili-
 ginem inspergunt farinam ex faba, tum hæc in-
 ducunt. Ipsi verò quos Melanas vocari dixi, cu-
 rantur, cum simul contrita sunt alcyonium,
 thus, bordenum, faba sine oleo, in balneo
 ante sudorem insperguntur,
 tum genus id vitili-
 ginis defrica-
 tur.

*

LIBER VI.

De vitis singularū corporis partium. CAP. I.

De capillis fluentibus.

DIXI de his vitijs, quæ per totum corpus orientia, medicamentorū auxilia desiderant. Nunc ad ea veniā, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem saepe radendo succurritur. Adhuc enim vim quandam ad continendum, ladnum cum oleo mistum. Nunc de his capillis loquor, qui post merbum frē fluunt. Nam quo minus caput quibusdam atate nudetur, succurri nullo modo potest.

De Porrigine, & eius curatione. CAP. II.

Porrigo autem est, ubi inter pilos quedam quasi squamule surgunt, eaq; acuta resoluntur, & interdum madent, multo sæpius sicca sunt. Idq; evenit modò sine ulcere, modò exulcerato loco: huic quoq; modò malo odore, modò nullo accidente, frēq; id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio nascitur, neq; ex toto inutile est. Nam bene integro capite, non exit. Vbi aliquod in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi, quàm id quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti. Commodius est ergo subinde pestendo repurgare, quàm id ex toto prohibere. Si ta-

men

men ea res nimium offendit, quod humore sequente fieri potest, magisque si id etiam mali odoris est, caput saepe radendum est, dein id super adiuvandum aliquibus ex leniter reprimentibus, quale est nitrum cum aceto, vel ladanum cum myrteo vino, vel myrobalanum cum vino. Si parum per haec proficitur, vehementioribus uti licet, cum eo, ut sciamus utique in recenti vitio id inutile esse.

De Sycofi, & eius curatione. CAP. III.

Est etiam Ulcus, quod à fici similitudine evocatur à Gracis nominatur. Caro excrescit, & id quidem generale est. Sub eo verò duae species sunt. Alterum Ulcus durum, & rotundum est, alterum humidum, & inaequale. Ex duro exiguum quiddam, & glutinosum exit: ex humido plus: & mali odoris. Fit verò utrumque in his partibus, quae pilis conteguntur. Sed id quidem quod callosum, & rotundum est, maxime in barba. Id verò quod humidum, praecipue est in capillo. Super utrumque oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum, & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum, terra quoque cretria ex aceto liquata recte illinitur.

De Arcis, & earum curationibus. CAP. IIIL.

Arcarum quoque duo genera sunt. Commune utriusque est, quod emorua summa pellicula pili primum extenuantur, deinde excidunt: ac si illius is locus est, sanguis exit liquidus, & mali odor

odoris, intrescitq; vtrunque in alijs celeriter, in alijs tarde. Peius est, quod densam cutem, & subpinguē, & ex toto glabrā facit: sed ea quæ ἀνοτενία nominatur, sub qualibet figura dilatatatur, fit & in capillo, & in barba. Id verò quod à serpētis similitudine ὀφίaceous adpellatur, incipit ab occipitio, duorum digitorum latitudinē nō excedit, ad aures duobus capitibus serpit, quibusdā etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet aetate est, hoc fere infantibus. Illud vix unquā sine curatione, hoc per se saepe finitur. Quidam hac genera arcarū scalpello exasperant. Quidā illinunt adurentia ex oleo, maximeq; chartam combustā. Quidam resinam terebinthinam cum tapsia inducūt. Sed nihil melius est, quàm nouacula quotidie radere, quæ cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radiculæ. Neq; antè oportet desistere, quàm frequentem pilum nasci adparuerit. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento scriptorio satis est.

De Variis, & Lenticulis, & Ephelide, & eorum curationibus.

CAP. V.

PEnè ineptiæ sunt, curare Varos, & Lenticulas, & Ephelidas. Sed eripi tamen seminis cura cultus sui non potest. Ex his autem quas supra posui, Vari, Lenticuleq; vultu nota sunt, quamuis rariore species est, quàm ξυριοφ Græci vocant, cum sit ea Lenticula rubicundior, & in aq

inaqualior. Epudis verò à plerisque ignoratur, quæ nihil est, nisi asperitas quadam, & durities mali coloris. Cætera non nisi in facie, Lenticula etiam in aliis parte nonnunquam nasci solent. De qua per se scribere alio loco, visum operæ pretium non est. Sed Vari cōmodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quàm ipsa est, aluminis scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum parces portiones habent, contritaq; ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendū, & interpositis pluribus horis mane eluendum est, oleoq; leuiter ungendum. Ephelidē tollit resina, cui tertia pars salis fissilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia verò ista, atque etiam ad colorandas cicatrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem autorem refertur. In ea parces portiones sunt myrobalani, * magna-
 * croco-
 magna-
 tis
 tis, creta cimolia subcerula, nucum amatarum, furina hordei, atque crui, struthij albi, scetula campanæ seminis. Quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquantur, illitumq; à vespere vsque mane eluitur.

De oculorum morbis, curationibusque eorum.
 & primo de his morbis, qui lenibus medicamentis curantur.

C A P. VI.

Sed hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus verò, & varijs casibus oculi nostri patent. Qui cum magnam partem ad vitæ simul &

usum, & dulcedinē cōferant, summa cura tuendi sunt. Protinus autē orta lippitudine quadā nota sunt, ex quibus quid euenturū sit, colligere possimus. Nam simul ac lacryma, & tumor, & crassa pituita cōperint, si ea pituita lacryma mīsta est, & ea lacryma calida est, pituita verò alba, & mollis, tumor nō durus, longa valetudinis metus non est. At si lacryma multa, & calida, pituita paulū, tumor modicus, idq; in uno oculo est, longum id, sed sine periculo futurū est. Idq; lippitudinis genus minime cum dolore est, sed vix ante vigesimū diem tollitur, nonnunquā per duos menses durat, sed quādoq; finitur. Si pituita alba & mollis esse incipit, lacrymaq; miscentur, aut si simul haec utrunq; oculum inuaserūt, potest esse breuior, sed periculum ulcerum est. Pituita autem sicca & arida dolorem quidem mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit. Tumor magnus si sine dolore est & siccus, sine ullo periculo est. Si succus quidem, sed cum dolore est, si rē exulcerat, & nonnunquā ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pupillisve est, ubi super magnū dolorem lacryma salsa, calidaq; eunt, aut etiam si tumore infinito diu lacryma cum pituita profluit. Peius etiamnum est, ubi pituita calida, aut livida est, lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit, nocturno vigilia urget. Siquidem sub

his

his oculus plerūq; rumpitur, votumq; est, ut tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula inuat. Si foras iam ruptus procedit, sine auxilio est. Si de nigro aliquid albidū factū est, diu manet. At si asperū crassum est, etiā post curationē vestigiū aliquod relinquit. Curari verò oculos sanguinis detractiōe, medicamēto, balneo, vino, vetustissimus autor Hippocrates memorię prodidit. Sed eorum tēpora, & causa parum explicuit, in quibus Medicina summa est. Neq; minus in abstinentia, & alui ductiōe sape auxilij est. Hæc igitur interdū inflammatio occupat, ubi cum tumore in his dolor est, sequiturq; pituita cursus nonnunquam copiosior vel acrior, nonnunquā utraque parte moderatior. In eiusmodi causa prima omnium sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet, sic ut a sermone quoq; abstineat. Nullum cibum assumere, si fieri potest, ne aquam quidē: sin minus, certē quam minimum eius. Quod si graves dolores sunt, commodius secundo die, si tamen res urget, etiam primo sanguis mittendus est, utique si in fronte vena tument, si firmo corpori materia superest. Si verò minor impetus, minus acrem curationem requirit, alium, sed non nisi secundo, tertiōe die duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. Satisq; est uti quiete, & abstinentia. Neque tamen in lippientibus longum ieiunium necessarium est, ne pituita

tuita tenuior atq; acrior fiat. Sed secundo die da-
 ri debet id, quod leuissimum videri potest ex his,
 quæ pituitam faciunt crassiorē, qualia sunt oua
 sorbilia. Si minor vis urget, pultrícula quoq; aut
 panis ex lacte. Insequentibus diebus, quantum
 inflammationi detrabetur, tantum adijci cibus po-
 terit. Sed generis eiusdem, utiq; ut nihil salsum,
 nihil acre, nihil ex his, quæ extenuant, sumatur,
 nihil potui præter aquam. Et victus quidem ra-
 tio talis maxime necessaria est. Protinus autem
 primo die croci P. I. ✱. & farina candida quam
 tenuissima P. II. ✱. excipere oportet oni albo, do-
 nec mellis crassitudinem habeat, idq; in linteo-
 lum illinere, & fronti agglutinare, ut compressis
 venis pituita impetum cohibeat. Si crocum non
 est, theus idem facit. Linteolo an lana excipiat,ur,
 nihil interest. Super inungi verò oculi debent, sic
 ut croci quantum tribus digitis comprehendi po-
 test, sumatur: myrrha ad faba, papaueris lacryma
 ad lenticula magnitudinem, eaq; cum passo con-
 terantur, & specillo super oculum inducantur.
 Aliud idem: Myrrha P. I. ✱. mandragora succi
 P. II. ✱. papaueris lacryma P. I. ✱. foliorum ro-
 se, cicuta seninis, singulorum P. III. ✱. acacie
 P. IIII. ✱. gummi P. VIII. ✱. Et hæc quidem in-
 terdin. Noctu verò, quò commodior quies ve-
 niat, non alienum est superimponere candidi pa-
 nis interiorem partem ex vino subactam. Nam
 & pituitam reprimi, & si quid lacryma proces-
 sit,

fit, absorbet, & oculum glutinari non patitur. Si
 grane id, & durum propter magnum oculorum
 dolorem videtur, oui & album, & vitellus in
 vas defundendum est, adijciendumq; eo mulsi pau-
 lum, idq; digito permiscendum. Vbi facta uni-
 tas est, demitti debet lana mollis bene carptæ,
 qua id excipiat, superq; oculos imponi. Ears
 & levis est, & refrigerando pituitam coërcet, &
 non exarescit, & glutinari oculum non pa-
 titur. Farina quoque ordeacea cocta, & cum
 malo cotoneo cocto mīsta, commodè imponi-
 tur. Neque ab ratione abhorret etiam penicil-
 lo potissimum uti expresso: si lenior imperna
 est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fa-
 scia deliganda sunt, ne per somnum cadant, &
 hoc superimponi satis est, quia & reponi ab
 ipso commodè potest: & cum inaruit, iterum
 madefaciendum est. Si tantum mali est, ut so-
 mnus diu prohibeat, eorum aliquid dandum
 est, quæ ἀννώδυæ Græci vocant. Satisq; est put-
 ro, quod erui, viro quod faba magnitudinem
 impleat. In ipsum verò oculum primo die, ni-
 *modica si *immodica inflammatio est, nihil rectè con-
 igitur. Sæpe enim potius concitatur eo pituita,
 quàm minuitur. A secundo die gravi quoque
 lippitudini per indita medicamenta rectè suc-
 curritur, ubi vel iam sanguis missus, vel alius
 ductus est, aut ubi neutrum necessarium esse, ma-
 nifestum est.

De diuersis oculorum collyriis.

Multa autem malorumq; autorum collyria ad id apta sunt, nonisq; etiã nunc mĩstui temperari possunt, cum lenia medicamenta & modice reprimentia, facile & varie misceantur. Ergo nobilissima exequar.

Philonis collyrium.

Estigitur Philonis, quod habet cerussa elota, spodij, gũmi, singulorũ P. I. *. papaueris lacryme cõbusta P. I. *. Illud scire oportet, hic quoq; omnia medicamẽta, singula primũ per se teri, deinde mĩsta, iterũ adiecta paulatim vel aqua vel alio humore: gumme cum quasdã aliàs facultates habeat, hoc maxime præstare, ut ubi collyria facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur. Gummi

Dionysii collyrium.

Dionysij verò collyrium est, papaueris lacryma combusta, donec tenerescat, P. I. *. thuris combusti, gummi, singulorum P. I I. *. spodij P. I I I I. *.

Cleonis collyrium.

Cleonis nobile admodum, papaueris lacryme frielle P. I. *. croci P. I. *. gummi P. I. *. quibus cum teruntur, adicitur rosæ succus. Aliud eiusdem valētius: Squama aris quæ τριφυλλὰ appellant, P. I. *. croci P. I I. *. spodij P. I I I I. *. plumbi & eloti, & combusti P. V I. *. gummi tantundem. Eius aliud quoque ad idẽ est, maxime ubi multa pituita profluit. Castorei P. *. 3. aloës P. L. *. croci * P. L. *. *. P. X I
3 2 myrr

myrrha p. i i. *. lycij p. i i i. *. cadmia curate p. v i i i. *. stibis tantundem, acacia succi p. x i i. *. quod cum gummi miscuit, liquidum in pixidicula servatur. Theodotus vero huic compositioni adiecit papaveris lacryma combusta p. *. aris combusti & eloti p. i i. *. * nucleorum palmarum combustarum p. x. *. gummi p. x i i. *.

* alias:
nucleos

palmæ-
rū cōbu-
stos nu-
mero x.

* p. i i.

p. xvi i i i.

Theodoti collyrium, Acharistum appellatum.
A T ipsius Theodoti, quod à quibusdā ἀχάριστον nominatur, eiusmodi est. Castorei, nardi indici, singulorum p. i. *. lycij * p. *. papaveris lacryma tantundem, myrrha p. i i. *. croci, cerussa elota, aloës, singulorum p. i i i. *. cadmiæ botryodis elota, aris combusti, singulorum p. v i i i. *. gummi * p. v i i i. *. acacia succi p. x x. *. stibis tantundem, quibus aqua pluvialis adiecitur.

Cythion vel Tephron collyrium.

P Rater hac ex frequentissimis collyrijs est id, quod quidam Cythion, quidam à cinereo colore Tephron appellant, amyli, tragacantha, acacia succi, gummi, singulorum p. i. *. papaveris lacryma p. i i. *. cerussa elota * p. i i i. *. spuma elota p. v i i i. Qua æque ex aqua pluviali conteruntur.

* p. vi i i
puma elo-
ta.

p. x i i i i

Enelpidis, collyrium, Trygodes nominatum.

E Velpides autem qui etate nostra maximus fuit oculus medius, utebatur eo, quod ipse cōposuerat, Trygodes nominabat: Castorei p. i i.

P. II. *. lycij, nardi, papaneris lacryma, singulo-
 rum. P. I. *. croci, myrrha, aloes, singulorum P.
 IIII. *. aris combusti. * P. VIII. *. cadmia, & si P. VIII.
 bis, singulorum P. XII. *. acacia succi P. XXVI.
 *. gummi tantundem. Quo grauior verò quaq;
 inflammatio est, eo magis leniri medicamentum
 debet, adiecto vel albo oui, vel muliebri lacte. At
 si neq; medicus, neq; medicamentum praesto est,
 sapius vtrumlibet horum in oculis penicillo ad
 ipsum facto infusum, id malum lenit. Vbi verò
 aliquis releuatus est, iamq; cursus pituita consti-
 tit, reliquiae fort. esse leniores futuras discutiunt
 balneum & vinum. Igitur lauari debet leuiter,
 ante ex oleo perfricatus, diutiusq; in cruribus &
 feminibus, multaq; calida aqua fouere oculos, de-
 inde per caput prius calidum, tum egelida perferri,
 à balneo cauere, ne quo frigore afflatiue ledatur:
 posthac cibo paulo pleniore, quàm ex eorum die-
 rum consuetudine, uti: vitatis tamen omnibus
 pituitam extenuantibus. Vinum bibere lene, sub-
 ansterum, modice vetus, neq; effuse neque timi-
 de, ut neque cruditas ex eo, & tamen somnus fac
 lenianturq; intus latentia acris. Sed si quis in
 balneo sensit maiorem oculorum perturbationem
 quàm attulerat, quod incidere his solet, qui ma-
 nente adhuc pituita cursu scilinarunt, quampri-
 mum discedere debet, nihil eo die vini assumere,
 cibi minus etiam quàm pridie. Deinde cum pri-
 mum scitis pituita subleuit iterum ad usum bal-
 nei

nei redire. Solet tamen euenire nonnunquam sine tempestatum vitio, sine corporis, ut plurimum diebus neq; dolor, neq; inflammatio, & minimi pituita curcibus finiatur. Quod ubi incidit, iamq; ipsa vetustate res matura est, ab his eisdem auxilium petendum est, id est balneo ac vino. Haec enim ut in recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt, & accendere, sic in veteribus qua nullis alijs auxilijs cesserunt, admodum efficacia esse consueverunt. Videlicet hic quoque ut alibi, cum secunda vana fuerint, contrarijs eliduantibus. Sed antè tonderi ad cutem conuenit. Deinde in balneo aqua calida quamplurima caput atq; oculos fovere, tum utrumque penicillo detergere, & ungere caput irino unguento: continereq; in lectulo se, donec omnis calor qui conceptus est, finiatur, desinatq; sudor, qui necessario in capite collectus est. Tum ad idem cibi viniq; genus veniendum est sic, uti potiones meraca sint, obtegendumq; caput, & quiescendum. Sape enim post hac grauis somnus, saepe sudor, saepe alui delictio pituita cursum finit. Si lenatrem malum est, quod aliquanto sapius sit, per plures dies idē fieri oportet, donec ex toto sanitas restituantur. Si diebus eisdem aluus nihil reddit, ducenda est, quo magis superiores partes lenētur. Nonnunquam autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat. $\pi\rho\beta\pi\tau\omega\sigma\iota\mu$ id, quoniam oculi precipidunt, Graeci appellant. His utiq;

utiq; si vires patiuntur, sanguinē mitti: si id fieri non potest, alnū duci, lōgioremq; inediā in dīci necessariū est. Opus autem lenissimis medicamētis est. Ideoq; Cleonis collyrio quidā quod ex duobus antē positū est, vtuntur. Sed optimū est Nilei. Neq; de vllō magis inter omnes autores cōuenit.

Nilei collyrium omnium optimom.

ID habet nardi Indici, pāpaneris lacryma, singularum ꝑ. i. ✱. gummi ꝑ. i. ✱. croci ꝑ. i. i. ✱. foliorum rosa recentium ꝑ. iiii. ✱. Quae vel aqua pluuiatili, vel vino leni subausterō coguntur. Neq; alienū est malicorin, vel sertulam cāpanam ex vino coquere, deinde conterere, aut myrrham nigrā cum rosa folijs miscere, aut hyoscyami folia, cum oui cocti vitello, aut farinā cum acacia succo, vel passo, aut mulsō. Quibus si folia quoq; pāpaneris adyciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo preparato, penicillo fouere oculos oportet, ex aqua calida expresso: in qua antē mel myrti vel rosa folia decocta sint. Deinde ex illis aliquid imponi. Prater hac ab occipitis incisa cute, cucurbitula admonēda est. Quod si per hac restitutus oculus in sedē suam non est, eodēq; modo prolapsus permanet, scire oportet, lumē esse amissum. Deinde futurum, vt inarescat is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo qui propior tempore est, incidi oculus debet: vt effuso pure & inflammatio, ac dolor finiatur, & intus tunica residant, quo minus feda postea facies

facies sit. Utendum deinde vel iisdem collyriis, ex lacte, aut ovo, vel croco, cui album oui miscetur. Ac si induruit & sic emortuus est, ne in putr verteretur, quatenus sæde prominebit, excidendum erit, sic ut hamo summa tunica apprehendatur: infra id deinde scalpellus incidat, tantundem medicamenta erunt coniicienda, donec omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis in eo quoq; oculo utendum est, qui primum procidit, deinde per plura loca fixus est.

De carbunculis oculorum, & eorum
curatione.

Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in palpebris: & in his ipsis oculis modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu alius ducenda est, cibus minuendus, lac potui dandum, ut acria qua laeserunt, leniantur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet, his utendum, quæ aduersus inflammationes proposita sunt. Atq; hic quoq; Nilei collyrium optimū est: si tamen carbunculus in exteriori palpebra parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen, ex mulso coctum: aut si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum & curatione earum.

Pustula quoque ex inflammationibus interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam seruanda sunt, quæ de sanguini

sanguine, & quiete supra posui. Sin serius quàm
ut sanguis mitti possit, alius tamen ducenda est.
Si id quoq; aliqua res inhibet, utiq; victus ratio
servanda est. Medicamentis autem hic quoq; le-
nibus opus est, quale Ni'ei, quale Cleonis est.

* φιλαι-

λκθς.

* Philale

thos

ID quoq; quod * Philetis vocatur, huic aptum
est, Myrrha, papaveris lacryma, singulorum
P. I. * plumbi eloti, terra samia, quæ ἀγὰρ voca-
tur, araganthæ, singulorum P. IIII. *. stibis co-
cti, amyli singulorum P. XV I. *. spodij eloti, ce-
russa elota, singulorum P. VIII. *. Quæ aqua plu-
viali excipiuntur. Vsus collyrij, vel ex ovo, vel
ex lacte est.

De ulceribus oculorum. & eorum curatio-
ne, & de διαβάλανος, collyrio.

EX pustulis ulcera interdum fiunt, eaq; reiē-
tia aque lenibus medicamentis nutrienda
sunt, & iisdem fere quæ supra in pustulis posui.

Fit quoq; proprie ad hæc quod * diabalann voca- * διὰ βάλανον
tur. Habet aris combusti & eloti papaveris la-
cryma friella, singulorum P. I. *. spodij eloti, thu-
ris, stibis, combusti & eloti, myrrha, gummi, sin-
gulorum P. II. *.

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.

EVenit etiam, ut oculi vel ambo, vel singuli,
minores fiant, quàm esse naturaliter debeant.
Idq; & acer pituita cursus in lippitudine effluit
& continuati sletus, & ietus parum bene curati.
In his quoq; iisdem lenibus medicamentis ex mu-

liebri lacte utendum est. Cibis verò his qui maxime corpus alere, & implere consueverunt. Vitandaq; omni modo caussa, quæ lacrymas excitet, curaq; domesticorum, quorum etiam si quid tale incidit, eius notitia subtrahendum: atque acris quoq; medicamenta, & acres cibi non alio magis nomine his nocent, quàm quòd lacrymas movent.

De pediculis palpebrarum.

Genus quoq; vitij est, qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. Id *φθρίαι* Græci nominant. Quod cū ex malo corporis habitu fiat, raro non ultra procedit. Sed fere tempore interposito, pituita cursus acerrimus sequitur, exulceratisq; vehementer oculis, aciem quoq; ipsam corrumpit. His alvus ducenda, caput ad extem tendendum, diuq; quotidie ieiunis perfricandum. His, ambulationibus, alijsq; exercitationibus diligenter utendum, gargari & anduq; ex mulso, in quo nepeta & pinguis ficus decocta sit: sepe in balneo multa calida aqua foveandum caput. Vitandi acres cibi, lacte vinoq; pingui utendum, bibendumq; liberalius quàm edendum est. Medicamenta verò intus quidem lenia danda sunt, *ne
 * Alias, acriorem pituitam concitēt. Super ipsos verò pediculos alia, qua necare eos & prohibere ne similes nascantur, possint. Ad id ipsum spuma nitri
 concientur. P. I. *. sandaraca P. I. *. una tamenia P. *. I. simul teruntur, adijciturq; vetus oleum pari portione, atq; acetum, donec ei mellis crassitudo sit.

De

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & validioribus medicamentis curantur, & de Andreae collyrio, & de *diacerato.

* δια νί-

παι &.

* curatur

Hastenius oculorum morbi lenibus medicamentis *nutriuntur. Genera deinde alia sunt, quae diuersam curationē desiderāt, frequē; ex inflammationibus nata sunt, sed finitis quoq; his manentia. Atq; in primis in quibusdam persene- rat tenuis pituita cursus, quibus alius ab inférieure parte euocanda est, demendum aliquid ex cibo. Neque alienum est illini frontem compositione Andreae. Quae habet gummi P. I. *. cerussa, stibis, singulorum P. II. *. Spuma argenti & cocta, & elotæ P. III. *. Sed & ea spuma ex aqua pluuiali coquitur, & arida haec medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoq; super iniiciendū ex farina quae frigida aqua coacta sit, cuiq; aut acacia succus, aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoq; inciso vertice, recte accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi verò eo debet quod habet squama aris, papaneris lacryma, singulorum P. *. ceruini cornu combustū & eloti, plumbi eloti, gummi, singulorum P. IIII. *. thuris P. XII. *. Hoc collyrium quia cornu habet, δια νίπαι & nominatur. Quotiescunq; non adyccio quod genus humoris adijciendū sit, aquam intelligi volo.

Metemigmetnon, Euclidis collyrium.

Ad

Ad idem Euelpidis, quod μεμυρμύρον ^{ar-}
 minabat. In eo papaveris lacryma, & ^{albi}
 piperis, singula uncia sunt, gummi libræ, æris
 combusti P. I. ✱. Inter has autem curationes, post
 intermissione aliquā prosunt balneum & vi-
 nū. Cumq; omnibus lippiētibus vitādi cibi sunt,
 qui extenuant, tum præcipue quibus tenuis hu-
 mor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum,
 quæ pituitam crassiorē reddunt, sicut in hoc ge-
 nere materia maxime promptū est, confugiendū
 est ad ea, quæ quia ventrē, corpus quoq; astringūt.

De oculorum ulceribus supercrescentibus,
 sordidis, canis, veteribus, & cura-
 tionibus singulorum.

At ulcera si cum inflammatione finita non
 sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut
 cana, aut certe vetera esse consueverunt. Ex his
 supercrescentiæ collyrio, quod Memigmenon vo-
 catur, optime reprimuntur. Sordida purgantur
 & eodem, & eo quod Similion nominatur.
 Similion collyrium.

Habet aruginis P. I I I. ✱. gummi tanten-
 dem, ammoniaci, minij sinopici, singulorū
 P. X V I. ✱. Quæ quidam ex aqua, quidam, quo
 vehementiora sint, ex aceto terunt.

Phynon collyrium Euelpidis.

Aliās, **I**d quoq; Euelpidis, quod * Phynona adpella-
 rron, bat, huic utile est: Croci P. I. ✱. papaveris la-
 cryma, gummi, singulorum P. I I. ✱. æris combusti
 & eloti, myrrha, singulorū P. I I I I. ✱. piperis albi
 P. V I. ✱

P. VI. *. Sed ante linitum hoc unguendum est.

Sphæzion collyrium Euelpidis.

ID quoq; eiusdē, quod Sphæriō nominabat, eodē valet. Lapidis hematitici cloti P. II. *. piperis grana sex, cadmia elota, myrrhæ, papaueris lacryma, singulorū P. III. *. croci P. II. *. gummi. P. VIII. *. Quæ cum vino amineo cōterūtur.

Liquidum Euelpidis collyrium.

Liquidum quoque medicamentum ad idem componēbat, in quo erant, hæc, eruginis P. *. minij combusti, atramenti sutorij, cinamomi, singulorū P. III. *. croci, nardi, papaueris lacryma, singulorū P. I. *. myrrhæ P. II. *. aris combusti P. III. *. cineris ex odoribus P. II. *. piperis grana * XV. Hæc ex vino austero teruntur: * V. deinde cum passi tribus heminis decoquuntur, donec corpus unum sit. Idq; medicamentum vetustate efficacius fit.

De causis oculorum ulceribus, & curationibus.

Causa vero ulcera commodissime implent ex his quæ supra posita sunt, Sphæzion, & id quoq; * Philæti vocatur. Idem Sphæzion vetustis ulceribus, & vix ad cicatricem venientibus optime succurrit. * aliās, Philæti, φιλæτις

Hermonis collyrium.

Est etiam collyrium quod cum ad plura valeat, plurimum tamen proficere in his ulceribus videtur. Refertur ad Hermonem acutorem, habet piperis longi P. I. 3. *. albi * P. *. cinnamomi, casti, singulorū P. I. *. atramenti sutorij, nardi, * P. V.

nardi, casia, castorei singulorum P. I. I. *. ^{gala}
 P. V. *. myrrha, croci, thuris, lycij, cerussa, singu-
 lorum P. V I I I. *. papaveris lacryma P. XII. *.
 aloës, aris combusti, cadmia, singulorum P. XVI.
 *. acacia, stibis, gummi, singulorum P. XXV. *.

De cicatricibus oculorum, quæ ex ulceribus fa-

ciæ sunt, & quomodo curari debeant,

& de Asclepia, & Canopite &

Pyxino, collyriis.

Facta verò ex ulceribus cicatrices, dantur
 vitijs periclitantur, ne aut caua, aut
 crassa sint. Si caua sunt, potest, eas implere, id
 quod spharion vocari dixi, vel id quod Ascle-
 pias nominatur. Habet papaveris lacryma P. I. I.
 *. sagapeni, opopanacis, singulorum P. III. *. er-
 ginis P. IIII. *. cumini P. VIII. *. piperis P. XII.
 *. cadmia elota, cerussa, singulorum P. X V I. *.
 At si crassa cicatrices sunt, extenuat vel Smi-
 lion, vel Canopite collyrium quod habet cinamo-
 mi, acacie, singulorum P. I. *. cadmie elote, cro-
 ci, myrrhe, papaveris lacryme, gummi, singulo-
 rum P. I I. *. piperis albi, thuris, singulorum P.
 III. *. aris combusti P. I X. *. cum aqua pluuiæ
 tili. Vel Euelpidis Pyxinum, quod ex his constat:
 Salis fossilis P. IIII. *. ammoniaci, thymiamatis
 P. VIII. *. papaveris lacryma P. XII. *. cerussa
 *. Alias, P. X V. *. piperis albi, croci siculi, * singulorum
 P. LII. *. gummi P. XIII. *. cadmia elota P. I X.
 *. Maxime tollere cicatricem videtur, id quod
 habet gummi P. I I I. *. aruginis P. I. *. croco-
 magm

magnatis P. I I I I. ✕.

De alio genere inflammationis oculorum.

Est etiam genus inflammationis, in qua si cui tument ac distenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti necessarium, multaq; aqua calida caput atq; oculos fouere, gargarizari ex lenticula, vel ex fici cremore, inungi acribus medicamentis, quae supra comprehensa sunt, maximeq; eo quod Spharion nominatur, quod lapidem hamatiten habet. Atque alia quoq; utilia sunt, quae ad extenuandā aspritudinem sunt, de qua protinus dicam. Hanc autem inflammatio oculorum fere sequitur, interdum maior, interdum lenior, nonnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit, deinde aspritudinem ipsam auget, fitq; ea in alijs brevis, in alijs longa, & quae vix unquam finiatur. In hoc genere valetudinis quidā crassas durasq; palpebras, & fuculco folio & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt, versasq; quotidie medicamentis suffricant. Quae neq; nisi in magna vetustaq; aspritudine, neque saepe facienda sunt. Nam melius eodē ratione vitus & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore, multaq; oculorum palpebras aqua calida fovebimus. Cibos autē sumemus acres, & extenuantes.

Cæsarianum collyrium.

AT medicamentum id quod Cæsarianum vocatur, habet atramenti suiorij P. I. ✕. mi-
hos

syos p. *. piperis albi p. v. *. papaveris lacrymas
gummi, singulorum p. ii. *. cadmia lota p. iii. *.
stibis p. vi. *. Satisq; constat, hoc collyrium ad-
versus omne genus oculorum valetudinis idoneum

* Alias, esse, exceptis his quae lenibus * nutriuntur.
curantur

Hieracis collyrium.

ID quoq; quod Hieracis nominatur, ad aspri-
tudinem potest: Habet myrrhae p. i. *. ammo-
niaci, thymicimatis p. ii. *. eruginis rasa p. iii.
*. cum aqua pluviali. Ad idem idoneum est
etiam id quod Canopite est, & id quod Similium
vocatur, & id quod Pyxinum, & id quod Sphero-
rion. Si composita medicamenta non adsunt, felle
caprino, vel quam optimo melle satis commode
aspritudo curatur.

De Xerophthalmia, genere aridae lippitudinis.

Est etiam genus aridae lippitudinis, quae
ἄρμηξ Græci appellant: neque tument,
neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum
dolore quodam grauescunt, & noctu prae gravi pi-
ritu * inhaerent: quantoq; minor generis huius
imperius, tanto finis manus expeditus est. In hoc
vitio multum ambulare, multum exerceri, lau-
ri saepe, ibiq; desudare, multaq; frictione uti ne-
cessarium est. Cibi neq; qui implent, neq; nimium
acres apti sunt, sed inter hos medij. Mane ubi
concoxisse manifestum est, non alienum est ex si-
* Alias, napi gargari, tum deinde caput atq; os diu-
lefricare tius * perfricare.

Rhin

Rhinion collyrium.

Collyrium verò aptissimū est, quod Rhinion vocatur. Habet myrrhæ P. I. *. papaveris lacryma, acacia succi, piperis, gummi, singul. P. I. *. lapidis hematitis, lapidis phrygi, lixi, lapidis scissilis, singulorū P. I I. *. aris combusti P. I I I I. *. Ac pyxinum quoque eodem accommodatum est.

Ad oculos scabros, collyria.

SI verò scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion, id quod supra positum est: potest similiter prodesse id quod habet aruginis rasa, piperis longi, papaveris lacryma, singulorum P. *. I I. piperis albi, gummi, singulorum P. *. I I I I. cadmia elota, cerussa, singulorum P. v I. *. Nullum tamen melius est quam Euelpidis, quod Basilicon nominabat. Habet papaveris lacryma, cerussa, lapidis Asij, singulorum P. I I. *. gummi P. X I I I. *. piperis albi P. I I I I. *. croci P. v I. *. psorici P. X I I I. *. Nulla autem per se materia est, quæ psoricum nominetur, sed chalcitidis aliquid, & cadmia dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idq; in vas fictile additum, & contextum ficulneis folijs sub terra reponitur, sublaturūq; post dies viginti rursus teritur, & sic appellatur. Verum in basilico quoque collyrio convenit, ad omnes afflicti oculorum id esse idoneum, qui non
* lenibus medicamentis curantur. Vbi non sunt
item medicamenta composita, scabros angulos
levant

¶ sequens
descriptio,
quæ eadem
fere & a
Dioscori-
de tradi-
tur.

lenant & mel & vinum. Succurritq; & his, & aride lippitudini, si quis panem ex vino subactum super oculum imponit. Nam cum fire sit humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulat, aut palpebras exasperat, sic, & si quid prodit humoris, extrahitur, & si quid iuxta est, repellitur.

Ad Caligationem oculorum, quæ propter lippitudinem oritur, remedia & collyria.

Caligare verò oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac propter senectutem, imbecillitatemve aliam consueverunt. Si ex reliquis lippitudinis id vitium effluat, adiuvat collyrium, quod Asclepias nominatur. Adiuvat id quod ex crocomagmate fit.

Sic xpiro collyrium.

Propriè etiam ad id componitur, quod dixerunt vocant: habet piperis P. I. * croci cilivis, papaveris lacryma, cernissa, singulorum P. II. * psorici, gummi, singulorum P. III. *.

Ad caligationem oculorum, quæ propter senectutem, aut aliam imbecillitatem fit.

At si ex senectute, aliave imbecillitate id est, rectè inungi potest, & melle quàm optimo, & cyprino, & oleo vetere. Commodissimum tamen est, balsami partem unam, & olei veteris, aut cyprini partes duas, mellis quàm acerrimi partes tres miscere. Utilia quoq; huic medicamenta sunt, quæ ad caliginem proxime, quæq; ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. Cuiusq; verò oculi caligabunt, huic opus erit multa ambulatione

tione atque exercitatione, frequenti balneo, ubi totum quidem corpus perfricandum est, precipue tamen caput, & quidem irino, donec insudet, velandumq; postea, nec delegendum antequam sudor, & calor domum conquierint. Tum cibus utendum acribus, & extenuantibus, interpositisq; aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum.

De suffusione oculorum.

Suffusio quoq; (quam Graeci ὑπόχυσσις nominant) inter autem oculi* potentia, qua cernit, *pituita se opponit. Quod si inueterauerit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam certis observationibus discutitur. Sanguinem ex fronte vel naribus mittere, in temporibus venas adurere, gargarizando pituita euocare, suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. Vitiis optimus est, qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum, quae Paralysis dicitur.

Ac ne resolutio quidem oculorum, quā πᾶσις ὀφθαλμοῦ Graeci nominant, alio vitio modo, vel alijs medicamentis curanda est. Exposuisti iam genus vitii satis est. Igitur interdum evenit, modo in altero oculo, modo in utroque, aut ex icteru aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex dissectione nervorum, quae vehementer oculum ipse commissus est, ut his neque quoquam intendi possit, nec omnino consistat: sed hoc illud sine ratione moueatur, ideoq; ne conspectum quidem rerum praestet.

De Mydriasi oculorum.

Non multū ab hoc malo distat id, quod per
Ἀπῑασις Græci vocant. Pupilla effunditur
 & dilatatur, aciesq; eius hebescit: ac penē difficil-
 lime genus id imbecillitatis eliditur. In utraque
 verò, id est, & paralyssi & mydriasi, pugnandum
 est per eadem omnia, quæ in caligine oculorū præ-
 cepta sunt, paucis tantū mutatis: siquidem ad er-
 put irino interdum acetum, interdum vitrū adq-
 ciendum est, melle inungi satis est. Quidā in præ-
 steroire vitio calidis aquis vti relenatiq;. Quidam
 sine ulla manifesta causa subito obcecati sunt.
 Ex quibus nonnulli cum aliquandiu nihil videret-
 sent, repētina profusione alui lumē receperūt. Quo-
 minus alienū videtur, ex recēti re & interposito
 tēpore medicamētis quoq; moliri deiectiones, quæ
 omnem noxiam materiā in inferiora depellant.

De imbecillitate oculorum.

Preter hac imbecillitas oculorum est, ex qua
 quidam interdum satis, noctū nihil cernunt,
 quod in faminam bene respondentibus men-
 struis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet
 *aliās hu-
 more io-
 cin.
 ter* sanguine iocinoris, maxime hircini: si mi-
 nus, caprini: ubi id assum coquitur, excepto:
 atque edī quoque ipsum recur debet. Licet tamen
 etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti,
 quæ vel cicatrices, vel asperitudinem extenuant:
 quidam contritō semine portulacæ mel adijciunt,
 eatenus ne id ex specillo distillet, eoq; inungunt.

Exeri

Exercitationibus, balneo, frictionibus, gargari-
zationibus iisdem, his quoq; utendum est.

Ad oculos, qui extrinsecus offenduntur, cum
sanguine suffusi sunt.

EThac quidem in ipsis corporibus oriuntur.
Extrinsecus verò interdum si ictus oculum
ledit, ut sanguis in eo suffundatur, nihil commo-
dius est, quam sanguine vel columba, vel palum-
bi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa
fit, cum horum acies extrinsecus laesa interposito
tempore in antiquū statum redeat, celeberrimeq;
hirundinis. Vnde etiā locus fabula factus est, aut
per parentes, aut id herba chelidonia restitui,
quod per se sanescit. Eorum ergo sanguis nostros
quoq; oculos ab externo casu commodissime tue-
tur, hoc ordine, ut sic hirundinis optimus, deinde
palumbi, minime efficax columba & illi ipsi, &
nobis. Supra percussū verò oculum ad inflam-
mationem leniendam, non est alienum imponere
etiā cataplasmata. Sed* ammoniacus, vel qui-
libet alius quā optimus teri debet, sic ut ei pau-
latim oleū adyiciatur, donec crassitudo strigmenti
fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea fari-
na, qua ex mulso decocta sit. Facile autē recogni-
tis omnibus, qua medici quoq; prodiderunt, ap-
parere cuilibet potest, vix ullum ex his, quæ supra
cōprehensa sunt, oculi vitium esse, quod nō simpli-
tibus quoq; & prōptis remedijs submoueri possit.

*Armenia-
cus legen-
dū, ut sub-
audiatur
lapis.

De auctum morbis, & curationibus. CAP. VII.

Hætenus in oculis ea reperiuntur, in quibus
 medicamenta plurimum possint. Ideoq; ad
 aures trāseundum est, quarum usum proximam
 à luminibus natura nobis dedit. Sed in his ali-
 quāto maius periculum est: nam vitia oculorum
 intra ipsos nocēt. Aurium inflammationes dolo-
 resq; , interdum etiam ad dementiam mortemq;
 precipitant. Quo magis inter initia protinus suc-
 currendum est, ne maiori periculo locus sit. Ergo
 ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere &
 continere se debet. Postero die, si vehemētius ma-
 lum est, caput tondere, idq; irino unguento ca-
 lido perungere & operire. At magnus cum fibre
 vigiliaq; dolor exigit, ut sanguis quoq; mittatur.
 Si id aliqua caussa prohibent, alvus solvenda est.
 Cataplasmata quoq; calida subinde mutata pro-
 ficiunt, siue scæni Græci, siue lini, siue alia farina ex
 mulso decocta est. Recte etiam subinde admonen-
 tur spongia, ex aqua calida expressa. Tum lenato
 dolore, ceratum circumdari debet ex irino aut cy-
 prino factum. In quibusdam tamen melius, quod
 ex rosa factum est, proficit. Si vehemens inflam-
 matio somnū ex toto prohibet, adijci cataplasma-
 ta debent, papaveris, corticis fricti atq; contriti, sic
 ut ex his pars dimidia sit, eaq; tunc simul ex pas-
 sa mislo decoquatur. In aurem verò infundere
 aliquod medicamentū oportet, quod semper ensē
 reperiendi convenit, commodissimūq; per strigilem
 instillatur. Ubi auris repleta est, super lina mol-
 lis

lis addenda est, quæ humorem intus contineat. Et hæc quidem communia sunt. Medicamentū verò est & rosa, & radicū arundinum succus, & oleum in quo lubrici cocti sunt, & humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali persici expressus. Composita verò ad inflammationem doloremq; leniendum hæc sũt: Castorei, papaveris lacryma pares portiones conteruntur, deinde adijci-
tur bis passum. Vel papaveris lacryma, croci, myr-
tha par modus, sic teritur, ut inuicem modo rosa,
modo passum instilletur. Vel id quod amarum
in ægyptia faba est, cõteritur rosa adiecta. Quibus
myrrha quoq; paulum à quibusdam miscetur, vel
papaveris lacrymæ, aut thus cū muliebri, lacte vel
amararum nucum cū rosæ succo. Vel castorei,
myrrha, papaveris lacrymæ pares portiones cū pas-
so. Vel croci p. i. ✱. myrrha, aluminis scissilis, sin-
gulorum p. ✱. 3. quibus cū teruntur, paulatim
miscentur passi cyathi tres, mellis minus cyatho.
Idq; ex primis medicamētis est. Vel papaveris la-
cryma ex aceto. Licet etiam compositione uti The-
misonis, quæ habet castorei, opopaniacis, papaveris
lacrymæ ex aceto, singulorum p. i i. ✱. spuma
leyi p. i i i i. ✱. Quæ contrita passo excipiun-
tur, donec ceratæ crassitudinem habeant, atq; ita
reponuntur. Ubi usus requiratur, rursus idem
medicamentum adiecto passo, specillo teritur.
Illud perpetuum est, quotiescunq; crassius medi-
camentum est, quàm ut in aurem instillari pos-
sit,

sit, adijciendum eum esse humore, ex quo id com-
 poni debet, donec satis liquidum sit. Si verò pri-
 quoq; aures habent, recte lycium per se infundi-
 tur, aut irinum unguentum, aut porri succus cum
 melle, aut centaurea succus cum passio, aut dulcis
 punici mali succus in ipsius cortice tepesfactus:
 adiecta myrrha exigua parte. Recte etiam miscen-
 tur myrrhæ (quam Sardinio cognominat) p. i. *.
 croci tantundem, nuces amara xv. mellis sesqui-
 cyathus. Quæ contrita, cum utendum est, in corti-
 ce punici mali tepesant. Ea quoq; medicamenta
 quæ oris exulcerati causa compennuntur, æque ul-
 cera auriû sanât. Quæ si vetustiora sunt, & mul-
 ta sanies fluit, apta compositio est, quæ ad auto-
 rem Erasistratum refertur, piperis p. *. croci p. i.
 3. *. myrrhæ, misyos colli, singulorum p. ii. *. æri
 cõbusti p. ii. *. Hæc ex vino teruntur. Deinde ubi
 intraerunt, adijciuntur passi hemina tres, & si-
 mul coquantur. Cum utendum est, adijcitur hi-
 mel & vinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi me-
 dicamentum, quod habet lentisci p. i. *. gallæ p.
 i. *. omphacis p. i. *. succum punici mali. Est
 Menophili validum admodum, quod ex his con-
 stat, piperis longi p. i. *. castorei p. i i. *. myr-
 rhæ, croci, papaveris lacryma, nardi Syriaci, thu-
 ris, malicory, ex Aegyptia faba partis interio-
 ris, nucum amararum, mellis quàm optimi, sin-
 gulorum p. i i i i. *. Quibus, cum teruntur, ad-
 jicitur acetum quàm acerrimum, donec crassitu-
 do.

do in his passu fiat. Est Cratonis, cinamoni, casia, singulorū P. I. * . lycij, nardi, myrrha, singul. P. I. * . aloës P. II. * . mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus vinum cum lycio decoquitur, deinde his alia miscentur. At si multum puris, malusq; odor est, eruginis rassa, thuris, singulorū P. I I. * . mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquantur. Vbi videndum est, dulce vinum miscetur. Aut aluminis scissilis, papaveris lacryma, acaciae succi par pōdus miscetur, hisq; adijcitur hyoscyami succi dimidio minor quam unius ex superioribus portio, eaq; trita, ex vino diluuntur. Per se quoq; hyoscyami succus satis proficit. Cōmune vero auxilium aduersus omnes aurium casus, iamq; vfu comprobatū Asclepiades composuit. In eo sunt cinamomi, casia, singulorum P. I. * . flores iunci rotundi, castorei albi piperis longi, amomi, myrobalani, singulorū scrupuli duo, thuris masculi, nardi syriaci, myrrha pinguis, croci, spuma nitri, singulorum P. I I. * . Quae separatim contrita, rursus mista ex aceto conteruntur, atq; ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est, Polybique spbragis ex dulci vino liquata. Quae compositio priore libello cōtinetur. Quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est, misto vino per oricularium chysterem eluere, & tum infundere vinum austerum cum rosa mistū, cui spodij paulum sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut her-

ba sanguinalis succum cum rosa, aut mali puniti
 succum cum exigua parte myrrhæ. Si sordida quoq;
 ulcera sunt, melius mulso eluuntur, & cum ali-
 quod ex his, quæ supra scripta sunt, quod mel ha-
 beat, infunditur. Si magis pus profuit, & caput
 vniq; totēdū est, & multa calida aqua perfunden-
 dū, & gargarizandū, & usq; ad lassitudinē am-
 bulandum, & cibo modico viuendum est. Si cruor
 quoq; ex ulceribus apparuit, lycii cum lacte debet
 infundi, vel aqua, in qua rosa decocta sit, succo
 aut herbe sanguinalis, aut acaciæ adiecto. Quid si
 super ulcera caro increuit, eaq; mali odoris sangui-
 nē fundit, aqua tepida elui debet: tamē infundi
 id, quod ex thure & arugine, et aceto, & melle sit,
 aut mel cum arugine incoctū. Squama quoq; aris cum
 sandaraca contrita per fistulam recte instillatur.

Aduersus aurium vermes.

Vbi verò vermes orti sunt, si iuxta sunt,
 protrahendi oriculario specillo sunt. Si lon-
 gius, medicamentis necandi, cauendumq; ne post-
 ea nascentur. Ad utrumq; proficit album vera-
 trum cum aceto contritum. Elui quoque autem
 oportet vino, in quo marrubium decoctum sit. Sic
 emortui vermes in primam auris partem prouo-
 cabuntur, unde facillime educi possunt.

Ad compressa aurium foramina.

Sin foramen auris compressum est, & intus
 crassa sanies subest, mel quàm optimum ad-
 dendum est. Si id parum proficit, mellis cyatho
 &

& dimidio, eruginis rase P. I I. ✕. adijciendum est, incoquendumq; , & eo utendum . Iris quoque cum melle idem præficit. Item mellis & rose scrupuli duo. Item galbani P. I I. ✕. myrrhæ cum melle & fellis taurini, singulorum P. I I. ✕. vini quantum satis est ad myrrham diluendam.

Ad granem auditum.

Vbi verò gravius aliquis audire capit, quod maxime post longos capitis dolores evenire consuevit. In primis aurē ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta, qualis super ulcera innaſcitur, aut sordiu coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle erugo, vel perri succus, aut cū mulso nitri paulū. Atq; ubi crusta a corpore iam recedit, eluēda auris aqua tepida est, quo facilius ea per se diducta oriculario specillo protrahatur. Si sordes aque molles sunt, eodem specillo eximende sunt. At si dura sunt, aceti & cum eo nitri paulū coniiciendum est. Cumq; emollita sunt, eodē modo elui aurē purgariq; oportet. Quod si capitis gravitas manet, attundendum idem, & leniter, sed diu perfricandum est: aduēto vel irino vel laureo oleo, sic ut virilibet paulū aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterq; post iritionem aqua calida caput foveadu. Cibusq; utendu ex imbecillissima, & media materia, magisq; effumeda diluta portiones, nonnunquam carginandum est. Infundendum autē in aurē castoreū cū aceto, & lauro oleo, & succo
radio

radicula corticis. Aut cucumeris agrestis succus, adiectis contritis rosa folijs. Immatura quoque
** sordi- una succus cum rosa indistillatus, aduersus * sordiditatem*
ditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra seipfas.

Aliud vitij genus est, ubi aures intra seipsas sonant. Atque hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant. Lenissimum est, ubi id ex grauedine est. Peius, ubi ex morbis, capitisque longis doloribus incidit. Pessimum, ubi magnis morbis venientibus, maximeque comitiali, prouenit. Si ex grauedine est, purgare aurem oportet, & spiritum continere, donec inde humor aliquis expumat. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad exercitationem, frictionem, perfusionem, gargarizationemque pertinet, eadem facienda sunt. Cibis non vrendum nisi extenuantibus. In aurem dandus radicle succus cum rosa, vel cum succo radicle ex cucumere agresti, vel castoreum ex aceto, & laureo oleo. Veratrum quoque cum aceto conteritur, deinde melle cocto excipitur, & inde collyrium factum in aurem demittitur. Si sine his capit, ideoque nouo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto, vel irino, vel laureo oleo, aut huic mistum castoreum cum succo nucum amararum, aut myrrha & nitrum cum rosa & aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit victus ratio. Eademque facienda sunt, quae supra comprehendi, cum maiore quoque diligentia: & praeterea donec his sonus finitur, a vino abstinentiam.

nendum. Quòd si simul & sonus & inflammatio est, laureum oleum coniecisse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus exprimitur, quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

Ad ea quæ in aurem inciderunt extrahenda.

Solet etiã interdum in aurem aliquid incidere ut calculus, aliquòdve animal. Si pulex intus est, cõpellendũ eo lana paulũ est, quò ipse is subit, et simul extrahitur. Si nõ est secutus, aliòdve animal est, specillũ lana involutũ in resinã quã glutinosissimã, maximeq; terebinthinã demittendum, idq; in aurem inijciendũ, ibiq; vertendum est. Utq; enim comprehendet & eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendũ est, aut hamulo retuso paulum recurvato. Si ista nihil proficiunt, potest eodẽ modo resina protrahi. Sternutamenta quoq; admota id commode elidũt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoq; collocatur media inhaerens capitibus utrinq; pendẽtibus, superq; eam homo deligatur in id latus versus, cuius auris eo modo laborat, sic ut extra tabulam emineat. Tum malleo caput tabule, quod a pedibus est, fricitur: atq; ita concussa aure, id quod inest, exidit.

De Narium morbis, & curationibus. CAP. VIII.

Nares verò exulceratas fovere oportet vapore aquæ calidæ, id est spongia expressa atq; admota. Fit & subiecto vase oris angustis, calida aqua repleto. Post id fomentum illinenda

nendumq; ceratum ex cyprino aut irino factum,
 lanaq; id comprehendendum, caputq; velandum
 est. Quod si gravior is dolor est, vtiliter & alius
 ducitur, & calida cataplasinata super maxillas
 iniiciuntur, & ore humor calidus cū medicamen-
 tis aliquibus continetur, sæpiusq; mutatur. Cuius
 rei causa & quinq; folij radix, in vino misto co-
 quitur, & hyoscyami radix, vel in posca, vel in
 vino misto coquitur, sic ut paulum his salis adji-
 ciatur, & papaveris non nimium: aridi cortices, &
 mādragora radix, eodem modo. Sed in his tribus
 vtiq; vitandū est, ne quod haustū erit denoretur.
 Ex populo quoq; alba, cortex radice in hūc usum
 in vino misto rectē coquitur, & in aceto cornu cer-
 uinum rasum, & nepeta cū teda pingui: ac sius
 itē pinguis vel in mulso, vel in aceto & melle, ex
 quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur.
 Specillum quoq; lana inuolutum in calidum oleū
 demittitur, eoq; ipso dens fonetur. Quin et iā que-
 dam quasi cataplasmata in dentē ipsum illinun-
 tur. in quē usum ex malo punico acido atq; arido,
 malicorij pars interior cum pari portione, & galla
 & pinei corticis conteritur, misceaturq; his minium:
 eaq; contrita aqua pluviali coquantur. Aut pa-
 naci, papaveris lacryma, pencedani, vna taminiæ
 sine seminibus, pares portiones conteruntur. Aut
 galbani partes tres, papaveris lacryma pars
 quarta. Quicquid dentibus admotū est, nihilomi-
 nus supra maxillam, ceratum, quale supra posui,
 effi

esse debet lana obiectum. Quidam etiam myrrha,
 cardamomi, sing. P. I. * croci, pyrethri, * ficorum * * ficorum
pinguium,
fortasse le-
gendū, aut
paruarum
 partes, singulorum P. I I I I. * sinapis P. VIII. *
 contrita linteolo illinunt, imponuntq; in humero
 partis eius qua dens dolet. Si is superior est, à sca-
 pulis: si inferior, à pectore. Idq; dolorem leuat: &
 cum leuauit, protinus submouendum est. Si verò
 excusus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi
 res coëgit, non est necesse. Sed cum omnibus fo-
 menti, quæ suprâ posita sunt, adijcienda quadâ
 valentiores compositiones sunt, quæ dolorem le-
 uant, quales hæ sunt. Habet autem papaueris la-
 cryma P. I. * piperis P. II. * p. oreos P. X. * quæ
 contrita galbano excipiuntur: idq; circumdatur.
 Aut Menemachi maxime ad maxillares dentes,
 in quæ sunt croci P. I. * cardamomi, thuris fuligi-
 nis, ficorum * partes, pyrethri, singulorum P. I I I I. * * parua-
rum, vel
pinguiū:
 * sinapi P. V I I I. *. Quidam autem immiscent
 pyrethri, piperis, elaterij, singulorum P. I. *. alu-
 minis scissilis, papaueris lacryma, vna taminia, ut suprâ.
 sulphuris ignem non experti, bituminis, luri bac-
 carum, sinapis, sing. P. I I. *. Quod si dolor eximi-
 eum cogit, & piperis semen cortice liberatum, &
 eodem modo bacca hedera coniecta in id foramen,
 dentem findit, itq; forte stans excidet. Et plani pis-
 cis, quam pastinacam nostri, τρυγώνα Græci Πασινοα
 vocant, aculeus torretur, deinde conteritur, re-
 sin. q; excipitur, quæ denti circumdata hunc sol-
 uit. Et alumen scissile in id foramen coniectum

demitti commodius est, quia sic dente servato, dolorem leuat. Hac à Medicis accepta sunt. Sed agrestium experimento cognitū, cum dens dolet, herbam mentasirum cum suis radicibus velli debere, & in peluem conijci, supraq; aquam in fundi, collocariq; iuxta sedentem hominē undiq; veste contractum, tum in peluem candentes siliques demitti, sic ut aqua tegantur, hominemq; eum biente ore vaporem excipere, ut supra dictum est, undiq; inclusum. Nam & sudor plurimus sequitur. & per os continens pituita defluit, idq; saepe longiorem, saepe annuam valetudinem bonam praestat.

De Tonsillis, & eorum cura.

CAP. X.

Si verò tonsilla sine exulceratione per inflammationem intumuerūt, caput velandum est extrinsecus, is locus vapore calido fouendus, multa ambulatione utendum, caput in lecto sublimiter habendum, gargarizandumq; est ex reprimentibus. Radix quoq; ea, quam dulcem appellant, confusa & in posso, mīlso ve decocta idem praestat. Leniterq; quibusdam medicamentis eas illini non alienum est, quae hoc modo sunt: Ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit, cum croci, myrrhae, aluminis scissilis, singulorum P. 11. * per se conteruntur, & anulatūq; his adijciuntur vini lenis cyathi duo, mellis vnius, deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur. At eiusdem succi sextarius eodem modo co-

Radix dulcis.

quit

quitur, atq; eadē rztione trita ei adijciuntur hac:
 Nardi* P.*. omphacij P. I.*. cinamonii, myrrha,
 casia, singulorum P. I.*. Eadem autem hac & au-
 ribus, & naribus purulentis accommodata sunt.
 Cibus quoq; in hac valetudine lenis esse debet, ne
 exasperet. Quod si tanta inflammatiō est ut spiritū
 impediat, in lecto conquiescendum, à cibo aboli-
 nendum, neq; adsumendum quicquā prater aquā
 calidam est. Aluus quoq; ducēda est. Gargariān-
 dum ex fico & mulso. Illinendū mel, cum ompha-
 cio. Interimsecus admonendus, sed aliquanto diu-
 tius, vapor aqua calida, donec ea suppurent, &
 per se aperiantur. Si pure substante non riuntur
 hi tumores, incidēdi sunt, deinde ex mulso calido
 gargariāndum ex fico. At si modicus quidem tu-
 mor & exulceratio est, fursurum cremori ad garga-
 riāndum paulum mellis adijciendum est, illinen-
 daq; ulcera hoc medicamento. Posti quamdulcis-
 simi tres heminae ad unam coquantur, tum adij-
 citur thuris P. I.*. croci, myrrha, singulorum P. I.
 *. leniterq; omnia rursus fervescent. Vbi plurimz
 ulcera sunt, eodem fursurum cremore, vel lacte
 gargariāndum est. Atq; hic quoq; cibus lenibus
 opus est, quibus adijci dulce vinum potest.

De Oris ulceribus, & curationibus, & quæ Anthe-
 rz sunt.

C A P. XI.

Vlcera autem oris, si cum inflammatione
 sunt, & parum pura ac rubicunda sunt,
 rztine bis medicamentis curantur, quæ supra po-

capitis exposita sunt. Sed quæ in latere eius nascuntur, distinctissime durant. Videntiumq; est, nam contra dens aliquis acutior sit, qui sane ferre sepius co loco non sinit, ideoq; limandus est.

De parodontidibus gingivarum tuberculis, & aliis ulceribus gingivarum. CAP. XII.

Aldus con
iangit hoc
caput cum
preceden-
te, neq; ti-
bolum ad-
dit.

Solent etiam interdum iuxta dentes in gingivâ tubercula quædam oriri dolentia, παροδοντίδα Greci appellant. Hac initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut inter se misitis sale fissili, cōbustio cupresso, nepeta, deinde eluere os eremote lenticule, & inter hæc biare, donec pituita satis profluet. In maiore verò inflammatione iisdem medicamentis utendum est, quæ ad ulcera oris supraposita sunt: & mollis linamenti paulum involuendum aliqua compositione ex his, quas anthemas vocari dixi, demittendumq; id inter dentem & gingivam: quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admouendus erit spongiæ vapor calidus, imponendumq; ceratū. Si suppuratio se ostendet, diutius eo vapore utendum erit, & continendum ore calidū mulsum, in quo ficus decocta sit. Itemq; subcrudum incidendum, ne si diutius ibi permanserit, os ladat. Quod si minor is tumor est, commodius totus exciditur, sic ut ex utraque parte dens liberetur. Pure exempto, si levis plaga est, satis est ore calidam aquam continere, & extrinsecus fovere eodem vapore. Si maior est, lenticulo eremore: ut iisdem medicamentis, quibus carum

ulcerz

Ulcera oris curantur. Alia quoq; Ulcera in gingi-
uis pleriq; oriuntur, quibus eadem quæ in reliquo
ore succurrunt. Maxime tamen mandere ligustum
oportet, succumq; eum ore continere. Fit etiam in-
terdum, ut ex gingivæ ulcere, sine *parodontides *παροδον-
tis sit, sine non sit, diutius pus feratur. Quod aut
dente corrupto, aut fracto, vel aliter vitiato osse, siue non
maximeq; id per fistulâ venire consuevit, ubi in-
cidit, locus aperiendus, dens eximendus: testa ossis,
si qua excessit, recidenda est: si quid vitiosi est, ra-
dendum. Post quæ, quid fieri debeat, supra in alio-
rum ulcerum curatione cõprehensum est. Si verò
à dentibus gingivæ recedunt, eadem anthere suc-
currunt. Utile est etiã pyra, aut mala non perma-
tura mādere, & ore eum humore continere. Idẽq;
prestare non acere acetum in ore retentum potest.

De Voz morbo, & curatione. CAP. XIII.

Vox vehemens inflammatiõ terrere quoq; de-
bet. Itaq; in hac abstinentia necessaria est,
& sanguis recte mittitur: & si id aliqua res pro-
hibet, alius utiliter ducitur, caputq; super hac ve-
landum, & sublimius habendus est: tum aqua gar-
garizandum, in qua simul rubus & lenticula de-
cocta sit. Minenda autem ipsa vix vel omphacio,
vel galla, vel alumine scissili, sic ut cuilibet eorũ
mel adiciatur. Est etiam medicamentum huic
aptũ, quod Andronium appellatur. Cõstat ex his, Andronit
alumine scissili, squama aris rubri, etramẽto su-
riorio, galli, myrrba, nps. Quæ per se contrita mĩ-
stis.

stiq; rursus paulatim adiecto vino austero terantur, donec his mellis crassitudo sit: ubi horum aliquo illita una est, chelidonia quoq; succo per cochlear illita una maxime prodest. Fere multa pituita decurrit, cumq; ea quieuit, ex vino calido gargarizandum. Quod si minor in ea inflammatio, laser terere, eiq; adycere frigidā aquā satis est, eāq; aquam cochleario exceptam ipsi una subijcere: Ac mediocriter eam tumentem aqua quoq; frigida, eodem modo subiecta, reprimat. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoq; est, vel cum lasce, vel sine eo hac curatione una subiecta est.

De Cancro oris.

CAP. XV.

SI quando autem ulcera oris cancer inuasit, primo considerandum est, num malus corporis habitus sit, eiq; occurrendum, deinde ipsa ulcera curanda. Quod si in summa parte id vitium est, satis proficit anthera humido ulceri arida inspersa: sicciori cum exigua parte mellis illita. Si paulo altius, charta combusta partes duae, auripigmenti pars una. Si penitus malum descedit, charta combusta partes tres, auripigmenti pars quarta. Aut pares portiones salis frieti, & iridis frieti. Aut item pares portiones chalcitidis, calcei, auripigmenti. Necessarium autem est linamentu in rosa tingere, & super adurentia medicamenta imponere, ne vicinum & sanum locum ledant. Quidam etiam in acris aceti heminam frictum saltem conijciunt, donec tabescere desinat: deinde id accuturum

tum coquunt, donec exiccetur, eumq; salem contritum inspergunt. Quoties autem medicamentum inijcitur, & ante & post os diluendū est, vel cremore lenticulae, vel aqua in aqua aut cruum, aut olea, aut verbenae decocta sint sic, ut cuilibet eorū paulum mellis misceatur. Acetum quoq; ex scilla retētum ore, facis aduersus haec vlcera proficit. Ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratū est, rursus mistum acetum. Sed & diu cōtinere virumlibet, & id bis aut ter die facere, prout vehemens malum est, necessarium est. Quod si puer est, cui id incidit, specillum lana inuolutū in medicamentum demittendum est, & super vlcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia denoret. Et si dolor in gingiuis est, mouenturq; aliqui dētes, refici eos oportet: nam curationes vehementer impediunt. Si nihil medicamēta proficiēt, vlcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere cōmodius est. Et id quidem aque adustum atq; excisum, sine ea curatione, qua corpori manu adhibetur, impleri non potest. Gingiuarum verò ossa, quae hebetia sunt, in perpetuum ussione nudantur. Neq; enim postea caro increscit. Imponēda tamen adustis lenticula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

De Parotidibus, quae sub auribus oriuntur.

C A P.

XVI,

Haec in capite fere medicamentis egent. Sub ipsis verò auribus oriri parotida solent.

A 5

modo

modo in secunda valetudine ibi inflammatione
 oria, modo post longae febres, illuc impetu morbi
 conuersio. Id abscessus genus est. Itaq; nullam no-
 uam curationem desiderat. Animaduersionem
 tantummodò hanc habet necessariam, quia si
 sine morbo id intumuit, primum reprimendum
 experimentum est. Si ex aduersa valetudine, illud
 inimicum est, maturariq; & quàm primum aper-
 iri commodius est.

De Umbilici prominentis curatione.

C A P. XVII.

AD Umbilicos verò prominentes, ne manu
 ferroq; utendum sit, antè tentandum est, ut
 abstineant, alius bis ducatur, impenatur super
 umbilicum id, quod ex his constat: Ciute & fa-
 liginis, singulorum P. I. ✱, cerussa elota P. I. II. ✱.
 plumbi eloti P. VIII. ✱. ovis duobus, quilibet etia
 solani succus adyicitur. Hoc diutius imposuisse
 oportet, & interim conuiescere hominem, cibo
 modico uti, sic ut vitentur omnia inflantia.

De obsecratum partium viuis, & curationibus.

C A P. XVIII.

Proxima sunt ea, quae ad partes obsecratas
 pertinent, quarum apud Gracos vocabula
 & tolerabilius se habent, & accepta iam usu
 sunt, cum omni ferè medicorum volumine atque
 sermone iactentur: apud nos scèdiora verba, ne
 consuetudine quidem aliqua verecundius lo-
 quentium* commèdata sunt: ut difficilis hac ex-
 * accom-
 modat. plenatio sit, simul & pudorem, & artis præcepta
 seruat

seruantibus. Neq; tamen ea res à scribendo deter-
tere me debuit. Primum, ut omnia quæ salutaria
accepi, comprehenderem, dein quia in vulgus eo-
rum curatio etiam præcipuè cognoscenda est, quæ
inuitissimus quisq; alteri ostendit.

De Collis morbis, & curationibus.

Igitur si ex inflammatione Coles intumuit, re-
duciq; summa cutis, aut rursus induci non po-
test, multa calida aqua foveendus locus est. Vbi
vero glans contecta est, oriculario quoq; chyltere
inter eam, cutemq; aqua calida infrenda est. Si
mollita sic & extenuata cutis, ducenti paruit, ex-
peditior reliqua curatio est. Si tumor vicit, im-
ponenda est vel lenticula, vel marrubium, vel
olia folia ex vino cocta, sic ut cuilibet eorum,
dum teritur, mellis paulum adijciatur. Sursumq;
coles ad ventrem deligandus est. Quod in omni
curatione eius necessarium est. Isq; homo conti-
nere se debet, & abstinere à cibo, & potione aquæ
tantum a siti vindicari. Postero die rursus adhi-
bendum ejusdem rationibus aqua fomentum est,
& cum vi quoque experiundum, an cutis sequa-
tur. Ea q; si non parebit, leuiter summo scalpello
concidenda erit. Nam cum sanies profluxerit, ex-
tenuabitur is locus, & facilius cutis ducetur. Sine
autem hoc modo vilita erit, siue nunquam repu-
gnauerit, vlcera vel in cutis ulteriore parte, vel
in glande ultrâve eam in cole reperientur: quæ
neceffe est, aut pura siccâve sint, aut humida, &
purulen

purulenta. Si sicca sunt, primum aqua calida fo-
 uenda sunt: deinde imponendum lycium ex vino
 est, aut amurca cocta cum eodē, aut cum rosa bu-
 tyrum. Si leuius humorineſt, vino eluenda sunt,
 tum butyri, & rose mellis paulum, & resina te-
 rebinthina pars quarta adijcienda est, eoq; uten-
 dum. Aut si pus ex his proſluit, ante omnia elui
 mulſo calido debent. Tum imponi pīperis P. I. ✱.
 myrrha P. II. ✱. croci, misſos cocti, ſingulorum P.
 II. ✱. Quæ ex vino aſtero coquuntur, donec mel-
 lis craſſitudinem habeant. Eadem autem compo-
 ſitio conſillis, vna madētiori, nariniq; vlceribus
 accommodata eſt. Aliud ad eam pīperis P. I. ✱.
 myrrha P. I. ✱. croci P. I. ✱. misſos cocti P. I. ✱.
 aris combuſti P. I. ✱. primum ex vino aſtero
 conteruntur, deinde ubi inaruerunt, iterum te-
 runtur ex paſſi tribus cyathis, & incoquantur,
 donec viſci craſſitudinem habeant. Aerugo quoq;
 cum cocto melle, & ea quæ ad oris vlcera ſuprà
 comprehenſa ſunt, curant. Aut Er: ſiſtrati com-
 poſitio, aut Cratonis recte ſuper purulēta natura-
 lia imponitur. Folia quoq; olea ex nouem cyathis
 vini coquuntur. His adijcitur aluminis ſciſſilis P.
 IIII. ✱. lycij P. V I I I. ✱. mellis ſeſquicyathus. Ac
 ſi plus puris eſt, id medicamentum ex melle: ſi mi-
 nus, ex vino diluitur. Illud perpetuum eſt, poſt
 curationem dum inflammatio manet, quale ſup-
 rapoſitum eſt, cataplaſma ſuprà dare, & quo-
 tidie vlcera eadem ratione curare. Quod ſi pus
 & mul

& multum, & cū malo odore cæpit profluere, elui
 cremore lenticula debet, sic, ut ei mellis paulū ad-
 jiciatur: aut olea, aut lentisci folia, vel marrubiū
 decoquendum est, eoq; humore eodem modo cum
 melle utendum, imponendaq; eadem, aut etiam
 omphacium cum melle, aut id quod ex arugino
 & melle ad aures fit, aut compositio Andronis,
 aut anthera, sic, ut ei paulum mellis adjiciatur.
 Quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum
 est, lycio ex vino curant. Si verò ulcus latius atq;
 altius serpit, eodem modo elui debet. Imponi verò,
 aut arugo, aut omphacium cum melle, aut An-
 dronis compositio, aut marrubij, myrtha, aut cro-
 ci, aluminis scissilis cocti, rosa foliorum aridorum,
 galle, singulorum P. I. ✱. minij sinopici P. II. ✱.
 Qua per se singula primum teruntur, deinde iun-
 cta iterū melle adiecto, donec liquidi cerati crassi-
 tudinē habeant: tum in arco vase leniter coquū-
 tur, ne superfluant. Cū iam gutta indurescūt, vas
 ab igne remouetur, idq; medicamentū, prout opus
 est, aut ex melle aut ex vino liquatur. Idem autē
 per se etiam ad fistulas utile est. Solet etiam inter-
 dum ad neruos ulcus descendere, profusiq; pitui-
 ta multa, sanies tenui maliq; odoris, non cocti,
 aut aqua similis, in qua caro recens lota est. Dolo-
 resq; is locus & pūctiones habet. Id genus quāuis
 inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis
 curādum est, quale est emplastrū τίσσαφάρακον
 ex rosa liquatum, sicut thuris quoque paulum e-
 musca

miscetur. Aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit, supra vero à me positum est. Precipueq; id vlcus multa calida aqua fouendum est, velandumq; neq; frigori committendum. Interdum autem per ipsa vlcera, coles sub cute exesus, sic vglans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuumq; est, quoties glans, aut ex cole aliquid vel excidit, vel absinditur, hanc non esse seruandā, ne cōsodat, vlceriq; agglutinetur, ac neq; reduci possit postea, & fortasse fistulā quoq; vrinā includat. Tubercula etiam, quæ quædam Græci vocāt, circa glandē oriūtur, quæ vel medicamentū vel ferro adurūtur: & cum crusta exciderūt, squama aris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

De Cancro, qui in colo nascitur, curatione.

Hæc citra cancerū sunt, qui cum in reliquis partibus, tum in his quoq; vel præcipue vlcera infestat. Incipit à nigritie, quæ si cutem occupauit, proinus specillum subiciendum, eaq; incidenda est, deinde ora vulsellæ prehendenda: tum quicquid corruptum est, excidendum, sic et ex integro quoq; paulum demat, idq; adurendū. Quoties quid vltum est, id quoq; sequitur, ut impetnenda lenticula sit, deinde vbi crusta exciderunt, vlcera sic, ut alia, curentur. At si cancer ipsum colē occupauit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, ne eximeq; id quod ex calce, chalcide, auripigmento componitur. Si medicamenta videntur, hic quoq; si alpello quicquid corruptum est, sic

sic ut aliquid etiam integri trahat, præcidi debet. Illud quoque aque perpetuum est, exciso cancro vulnus esse adurendum. Sed siue ex medicamentis, siue ex ferro crustæ occalluerunt, magnum periculum est, ne his decidentibus ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili penè corpore opus est, donec ex ipso crustæ pura leniter resoluantur. At si vel volēs aliquis, vel imprudens, dum ingreditur, immatura crustas dēduxit, & strit sanguis, frigida aqua adhibenda est. Si hac parū valet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinē supprimunt. Si ne hac quidē succurrit, aduri diligēter & timide debet, neque ullo postea motu dādus eidē periculo locus est.

De Phagedænx in cole nascentis curatione.

Nonnunquam etiam id genus ibi cancri, quod *φάγιδαινα* à Græcis nominatur, oriri solet, in quo minime differendum, sed protinus eisdem medicamentis occurrendum est, & si parum valent, ferro adurendum. Quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, & serpit, ac si sustinuitur, usque ad vesicam tendit, neque succurri postea potest. Sed in summa glande circa fistulam urina est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde ferro adurendum. Si vero alie penetravit, quicquid occupatum est præcidendum est. Caterum eadem, quæ in alijs carnis, faciendæ sunt.

De Carbunculo, qui cole nascitur.

Occalle

Occallescit etiam in cole interdum aliquid, idq; omni penè sensu caret, quod ipsum quoq; excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est. Deinde ipse quoque medicamentis vrendus, maximeq; chalcitide cum melle, aut arugine cum cocto melle. Ubi is excidit, liquidis medicamentis vrendum est, quæ ad ora ulceris componuntur.

De Testiculorum morbis, & eorum curatione.

In testiculis verò, si qua inflammatio sine illu-
orta est, sanguis ex t. alo mittendus est, à cibo ab-
stinendum, imponendum ex faba farina ex mulso
cocta, cum cumino contrito ex melle cocto. Aut co-
tritum cuminū cum cerato ex rosa facto. Aut lini
semen frictum, cōtritum, & in mulso coctum, aut
tritici farina ex mulso cocta cum cupresso, aut li-
lij radix contrita. Aut si ydem induruerant, im-
poni debet lini vel sœnigraci semē ex mulso coctū,
aut ex cyprino ceratū: aut similia ex vino cōtrita,
cui paulum croci sit adiectum. Si vetustior duri-
ties est, maxime proficit cucumeris agrestis radix
ex mulso cocta, deinde contrita. Si ex iltu tumēt,
sanguinem mitteri necessarium est, magisq; si etiam
liuent. Imponendum verò utrumlibet ex his, quæ
cum cumino componuntur, supraq; proposita sunt.
Aut ea compositio quæ habet nitri cocti p. i. *. re-
sina pineæ, gummi, singulorū p. i. i. *. vna tami-
nia sine seminibus p. iiii. *. mellis quæntiū sat
sit ad ea cogēda. Quod si ex iltu testiculis aliqui d
desic

desit, fere quoq; increfcit, neq; aliter succurri potest, quàm si inciso scroto, & pus emiffum, & ipfe testiculus excifus est.

De Rhagadiis, & Condylomate, & Hæmorrhoidibus, aliisq; ani morbis, & curationibus eorum:
& primo de Rhagadiis.

ANus quoq; multa tadiq; plena mala recipit, nec in se multum abhorrentes curationes habet. At primū in eo sepe, & quidem pluribus locis, cutis exciditur, Πάγὰ Αἰαῖ Græci vocāt. Id si recens est quiescere homo debet, & in aqua calida desidere. Colūbina quoq; ova coquenda sunt, & ubi induruerunt purganda : deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus, sic ut invicem utroq; aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut rhyodes rosa diluendum est, aut hyssopum recens miscendū cum cerato liquido ex rosa factō. Aut eidem cerato liquido plumbum elotum adijciendum. Aut resina terebinthina myrrha, aut spuma argēti vetus oleum. Et quolibet ex his id perungendum. Si quicquid laesum est, extrā est, neq; intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamētum superdandum est, & quicquid antè adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem casu neq; acerbis cibis utendum, neq; asperis, nec aluum comprimentibus: ne aridum quidem quicquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

De Condylomate.

Condyloma autem est tuberculum, quod ex
 quadā inflammatione nasci solet. Id ubi ortū
 est, quod ad quietē, cibos, potionesq; pertinet, ea-
 dem seruari debent, qua proxime scripta sunt. Is-
 dem etiā omis recte tuberculum id fouetur. Sed de-
 sidere antè homo in aqua debet, in qua verberae
 decocta sunt ex reprimētibus. Tum recte imponi-
 tur & lenticula cum exigua mellis parte, & ser-
 tula campana ex vino cocta, & rubi folia contrita
 cum cerato ex rosa facto, & cum eodem cerato con-
 tritum vel cotonei malum, vel malicorij ex vino
 cocti pars interior, & chalcitis cocta atq; contrita,
 deinde hyssopo ac rosa excepta. Et ex ea composi-
 tione, qua habet thuris P. I. ✱. aluminis scissibilis.
 P. II. ✱. cerussæ P. I I I. ✱. spuma argenti P. V. ✱.
 Quibus dū teruntur, inuicē rosa & vinū instil-
 latur. Vinculum autem ei loco lintecolum, aut pan-
 niculus quadratus est, qui ad duo capita duas an-
 sas, ab altera verò parte totidē fascias habet: cuiq;
 subiectus est, ansis ad ventrem datis à posteriore
 parte in eas adductæ fasciæ coniunguntur, atq; ubi
 artatae sunt, dexteriori sinistra, sinisteriori dextra
 procedit, circumdataq; circa aluum inter se nouis-
 sime modo delignantur. Sed si vetus condyloma iā
 induruit, neq; sub his curationibus desidit, aduri
 medicamento potest, quod ex his constat, aruginis
 P. I I. ✱. myrrha P. I I I I. ✱. gummi. P. V I I I. ✱.
 thuris P. X I I. ✱. stibis, papaneris lacryma, acacia

et, sing. P. XVI. *. quo medicamento quidam etiā
ulcera, de quibus proxime dixi, renouant. Si hoc
parum in condylomate proficit, adhiberi possunt
etiā vehementius adurentia. Vbi consumptus
est tumor, ad medicamēta lenia transeundum est.

De Hemorrhoidibus.

Tertium autem vitium est, ora venarū tanquam
ex capitulis quibusdam surgentia, quæ sape
sanguinē fundunt, αἱμορροΐδης Græci vocāt. Idq;
etiā in ore vulua faminarū incidere consuevit.
Atq; in quibusdam parum tantō supprimitur, qui
sanguinis proflusio imbecilliores non sunt. Habēt
enim purgationem hanc, non morbum. Ideoq; cu-
rati quidam cum sanguinis exitum non haberent
inclinata in præcordia ac viscera materia, subitis
& grauissimis morbis correpti sunt. Si cui verò id
nolet, id desiderare in aqua ex verbenis debet: im-
ponere maxime maliceriū cum aridiæ rosæ folijs con-
tritum, aut ex his aliqua quæ sanguinem suppri-
munt. Solet autem oriri inflammatiō, maxime ubi
dura alius eum locum laesit. Tum in aqua dulci
desidendum est, & id fouendum ouis, imponendi
vitelli cū rosæ folijs ex passo* subactō: idq; si intus * subact
est, digito illinendum: si extra, super illitum pan-
niculum imponendum est. Ea quoq; medicamenta
quæ recētibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt.
Cibis verò in hoc casu ipsædem, quibus in priori-
bus, utendum est. Si ista parum iuuant, solent im-
posita medicamenta adurentia, eā capitula abster-
gere.

mere. Ac si iam vetustiora sunt, sub autore Dionysio inspergenda sandaraca est, deinde imponendum, quod ex his constat: Squama aris, auripigmenti, sing. p. v. ✱. saxi calcis p. viii. ✱. postero die acu compungendum. Adustis capitulis sit cicatrix, quæ sanguinē fundi prohibet. Sed quoties is suppressus est, ne quid periculi afferat multa exercitatione digerenda materia est. Prætereaq; & viri & sæminis, quibus menstrua non proveniunt interdum ex brachio sanguis mittendus est.

Si anus vel os vulvæ procidit, qua curatione utendum sit.

AT si anus ipse, vel os vulvæ procidit (nam id quoque interdum fit) considerari debet purumne id sit, quod prolutū est, an humore mucoso circumdatum. Si purum est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cū verbenis, vel malicorio incocta. Si humidum, vino austero subluendum est, illinendumq; fœce vini cōbusta. Ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponendaq; plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta, tum linteolum, & supèr lana aque deliganda, cruribus inter se devinctis.

De vlere fungo simili, in ano.

Fungo quoq; simile vlcus in eadem sede nasci solet. Id si hyems est, egeida: si aliud rempus, frigida aqua fouendum est: deinde ✱ spuma aris inspergenda, supraq; ceratum ex myrteo factum, cui paulum squama fuliginis, calcis sit adiectum: Si id hac ratione non tollitur, vel medicamentis

mentis uehementioribus, uel ferro adurendū est.

De digitorum ulceribus.

CAP. XIX.

Digitorum autem uetera ulcera cōmodissime curantur, aut lycio, aut myrrha cocta, cum uirilibet uinū adiectum est. In ijsdē recedere ab ungue caruncula cum magno dolore cōsuevit, αἰσχυρία Græci appellant. Oportet alumen melinum rotundū in aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat: tum quantum eius aridi fuit, tantūdem mellis infundere & radiculam miscere, donec similis croco colore fiat, eoq; illinere. Quidam ad eundem usum decoquere simul maluam solent: cum paria pōdera aluminis aridi & mellis miscuerint. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fouēdi aqua ex uerbeni, imponendumq; super medicamentū ita factū: Chalcitis, malicoriū, squama aris excipiuntur fisco pingui leniter cocto ex melle. Aut charta cōbusta, auripigmēti, sulphuris ignem non experti par modus cerato miscetur ex myrteo facto. Aut aruginis rase P. I. ✱. squame P. II. ✱. mellis cyatho coguntur, aut pares portiones miscētur, saxi calcis; chalcitidis, auripigmēti. Quicquid horū impositū est, tegendū linteolo aqua madefacto est, tertio die digitus resoluendus est. Si quid aridi est, iterū excidendum, similisq; adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgādu scalpello, tenuibusq; ferramentis adurendus est, & sicut reliqua uista curādu est, ut ubi scabri ungues sunt, circū aperiri debent,

quæ corpus contingunt, tunc super eos ex hac compositione aque imponi sandaraca, sulphuris sing.
 * aliàs, P. II. ✱. nitri, auripigmēti, singulorum * P. II. ✱.
 P. IIII. resina liquidā P. VIII. ✱. Tertioq; id die resoluendum est. Sub quo medicamento vitiosi vngues cadunt, & in eorum locum meliores renascuntur.

LIBER VII.

De Chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis esse Chirurgus debeat, & quid in hoc libro describatur.



ERTIAM esse medicina partem, qua manu curet, & vulgo notum, & à me prapositum est. Ea non quidem medicamenta atque virtus rationem omittit, sed manu tamen plurimum prestat, estq; eius effectus inter omnes medicina partes evidentissimus. Siquidem in morbis cum multum fortuna consrat, eademq; sape salutaria, sape vana sint, potest dubitari secunda valetudo medicina, an corporis beneficio contigerit. In his quoque, in quibus medicamentis maxime nitimur, quamvis profectus evidentior est, tamen sanitatem & per hac frustra queri, & sine his reddi sape manifestum est. Sicut in oculis quoq; deprehendi potest, qui à medicis diu vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea parte, qua manu curat, evidens est, omnem profectum, ut aliquid ab alijs adiuvetur, hinc tamen plurimum

num trahere. Hac autem pars cum sit vetustissima, magis tamen ab illo parēte omnis medicina Hippocrate, quā à prioribus exulta est. Deinde posteaquam diducta ab alijs habere professores suos cepit, in Aegypto quoque increvit, Philoxeno maxime autore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissime cōprehendit. Gorgias quoque & Sosistratus, & Hieron, & Apollonij duo, & Ammonius Alexandrinus, multiq; alij celebres viri, singuli quadam repererūt. Ac Roma quoque non mediocres professores, maximiq; nuper Tryphon pater, & Euelpisthus, & ut ex scriptis eius intelligi potest, horū eruditissimus Megetes, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplina adiecerūt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentia propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremescite, eaq; non minus sinistra, quā dextra promptus, acie oculorū acri, claraq; animo intrepidus, immisericors, sic, ut sanari velit eum, quem accipit, non ut clamore eius motus, vel magis quā res desiderat, properet, vel min⁹ quā necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius afflētus oriaturs. Potest autem requiri, quid huic parti proprie vendicandū sit, quia vulnerū quoque ulcerūq; multorum curationes, quas alibi executus sum, chirurgi sibi vendicant. Ego eundē quidē hominē posse omnia ista prestare concipio. Atq; ubi se dimiserunt, eū laudo, qui quā plurimum

rimū percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit, & in quibus vulneribus ulceribusue plus perfici manū, quā medicamento credo: tum quicquid ad ossa pertinet, quæ deinceps exequi adgrediar, dilatisq; in aliud volumē ossibus, in hoc cetera explicabo: praposisq; his, quæ in qualibet parte corporis sūt, ad ea, quæ proprias sedes habēt, trāsibo.

De Luxatis.

CAP. I.

Luxata igitur, in quacunq; parte corporis sunt, quamprimū sic curari debent, ut quā dolor est, eā scalpello cutis crebro incidatur, detegaturq; eodem aduerso profluens sanguis. Quid si paulō tardius subuenitur, iamq; etiam rubor est, quæ rubet corpus, si tumor quoq; accessit, quacunq; is est, id optimum auxilium est. Tum superdanda reprimentia sunt: maximeq; lina succida ex aceto & oleo. Quod si lenior is casus est, possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoq; maxime ex sarmentis. Si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coctus.

De his quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, & curanda sūt.

CAP. II.

Verum hoc quidem promptū est. In his autem negotium maius est, quæ per se vitio intus orto intumescunt, & ad suppurationē spectant. Ea omnia genera abscessū esse aliis proposui, medicamentaq; eis idonea executus sum.

Nunc

Nunc superest, ut dicā in iisdem qua manu fieri debeant. Ergo priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet, qua quicquid illuc male corruptaq; materia coit, extrahat, idq; iterū tertioq; recte fit, donec omne indicium inflammationis excidat. Neq; tamen fas non est, nihil cucurbitula agere. Interdum enim, sed raro quicquid abscedit, velamento suo includitur, id antiqui tunicam nominabant. Meget, Tunica. quia tunica omnis nervosa est, dicit non nasci sub eo vitio nervū, quo caro consumeretur, sed subiecto iam vetustiore pure callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem si callus est, fieri debet. Neq; vlla res prohibet, etiam si callus est, tamen quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoq; maturiore hac interdū esse cōsuevit. Ideoq; quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. Sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo siue id incidit, siue iam durities est, in hac auxilij nihil est. Et ut aliās scripsi, vel auerenda concurrens eō materia, vel digerenda, vel ad maturitatē perducenda est. Si priora contigerunt, nihil prater ea necessarium est. Si pus maturuit in alis quidem & in inguinibus, raro secandum est. Item ubicunq; mediocris abscessus est. Item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est, nisi festinare curantis imbecillitas cogit. Satisq; est cataplasmata efficere, ut per

se pus aperiatur. Nam fere sine cicatrice potest esse
 is locus, qui expertus firrum non est. Si autem al-
 tius malum est, considerari debet, nervosusne il-
 locus sit, an non sit. Nam si sine nervis est, candē-
 ti ferramento aperiri debet. Cuius hac gratia est,
 quod exigua plaga diutius ad pus evocanda per-
 tet, parvaq; postea cicatrix sit. At si nervi intra-
 * ignis a- sunt, * in his periculum est, ne vel distendantur
 lienū est bi, vel membrū debilitent. Necessaria veri operi
 scalpelli est. Sed cetera etiam suberuda aperi-
 possunt. Inter nervos verò ultima expectanda ma-
 turitas est, qua cutem extenuet, eiq; pus iungat,
 * alia quò propius reperiatur. Itemq; * aliam rectè i pla-
 gam desiderat in carne, quia fere vehementer cu-
 tem extenuat, tota ea super pus excidenda est.
 Semper autē ubi scalpellus admoventur, id agendū
 est, ut & quamminime, & quam parcissime pla-
 ga sint: cum eo tamen ut necessitati succurramus,
 & in modo & in numero. Nam maiores sinus,
 latius interdū etiam duabus aut pluribus lineis
 incidēdi sunt. Dandaq; opera, ut inus sinus exi-
 tū habeat, nequis humor intus subsidat, qui pro-
 xima & adhuc sana rodēdo sinuet. Est etiā in re-
 rō natura: ut cutis latius excidenda sit. Nam ebi
 post longos morbos totus corporis habitus vitiatus
 est, lateq; se sinus diffundit, & in eo pars cutis
 pallet, scire licet eam iam emortuā esse, & inuti-
 lem futurā. Ideoq; excidere cōmodius est, maxime
 si circa articulos maiores id evenit, cubantemq;
 agrum

egrum fluens aluus * exercuit, neq; per alimenta * exhaur-
 quicquā corpori accedit. Sed excidi ita debet, ut rit
 plaga ad similitudinē myrtei folij fiat, quo faci-
 lius sanesciat. Idq; perpetuum est. Ubicunq; medi-
 cus ex quacunq; caussa cutem excidit, pure effuso
 in alis vel inguinibus, linamento opus non est.
 Spongia ex uino imponenda est. In ceteris parti-
 bus, si aquē ea linamenta superuacua sunt, pur-
 gationis caussa paulum mellis infundendū, dein
 glutinantia super danda. Si illa necessaria sunt,
 super ea quoq; similiter dari spongia eodē modo
 ex uino expressa debet. Quando autē linamenti
 opus sit, quando non sit, alias dictū est. Cetera ea-
 dem, incisa suppuratione, faciēda sunt, quae ubi
 per medicamēta rupta est, faciēda esse proposui.

De bonis malisque signis exulcratorum:

C A P. III.

Protinus autem quantum curatio efficiat,
 quantūq; aut sperari aut timeri debeat, ex
 quibusdam signis intelligi potest, freq; iisdē quae
 in vulneribus exposita sunt. Nam bona signa
 sunt, somnum capere, facile spirare, sui non con-
 fici, cibū non fastidire, si fibrícula fuit, ea vacare.
 Itemq; habere pus album, leue, non sædi odoris.
 Mala sunt, vigilie, spiritus grauitas, suis, cibi
 fastidium, febris, pus nigrum, aut seculentum,
 & sædi odoris. Item procedente curatione eruptio
 sanguinis: aut si antequam sinus carne implea-
 tur, ora carnosae fiunt. Illa quoq; ipsa carne hebetē

nec firma, deficere tamen animam, vel ipsa curatione vel postea, pessimum omnium est. Quia etiam morbus ipse siue subito solutus est, dein suppuratio exorta est, siue effuso pure permanet, non iniuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut hac ipsa fortuna huc illucve discernit, sic medici partium conuenienti ad reperiendam sanitatem. Ergo quoties videri resiliuerit, eluere id: si reprimendus humor videtur, vino ex aqua pluuiali misto, vel aqua in qua lenticula cocta sit, debet. Si purgandum erit, mulso: rursusque imponere eadem. Vbi iam repressus videbitur humor, vlcerisque purum erit, produci carnem conueniet, & foueri vulnus pari portione vini ac mellis, superque impenni spongia ex vino & rosa tineta. Per quam cum caro producat, plus tamen (ut alias quoque dixi) vultus ratio eo confert, id est solutis iam febribus & cibi cupiditate reddita, balneum rarum, quotidiana, sed lenis gestatio, cibi potionesque corpori reficiendo. Apertaque omnia quae per medicamenta suppuratione quoque rupta sequuntur, sed quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reseruata sunt.

De Fistulis.

CAP. IIIL.

ADuersus Fistulas quoque, si altius penetrant, ut ad ultimas demitti collirium non possit, si tortuosae sunt, si multiplices, maiores in manu quam in medicamentis praesidium est, minusque opera est, si sub cute transversae feruntur, quam si recte

necē intus tendunt. Igitur si sub cute transversa
fistula est, demitti specillum debet, supraq; id ea
incidit: si flexus reperiuntur, hi quoq; simul specillo
& ferro persequendi sunt. Idemq; faciendum, si
plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fi-
stula ventum est, excidendus ex toto callus est,
superq; fibula danda, & medicamentū quo glu-
tinetur. At si recta subter tēdit, ubi, quō maxi-
me ferat, specillo exploratū est, excidi is sinus de-
bet, dein fibula oris cutis injicienda est, & aquē
glutinātia medicamēta superdanda sunt. Aut si
corruptius vlcus, q̄ interdum osse vitiato fit, ubi
id quoq; curatū est, pus mouentia. Solent autem
inter costas fistula subter exire, q̄ ubi incidit, eo
loco cōsta ab utraq; parte decidenda & eximēda
est, ne quid intus corruptū relinquantur: solēt ubi
costas transierunt, septum id, quod transversum
à superioribus visceribus intestina discernit, vio-
lare. Quod intelligi & ex loco, & ex magnitudi-
ne doloris potest, & quia nonnunquā spiritus eo,
cum humore quasi bullāte prorumpit, maximeq;
si hunc ore ille continuit. In eo medicamini locus
nullus est. In ceteris verò quæ circa costas sanabi-
lia sunt, pingua medicamenta inimica sunt, cæ-
teris quæ ad vulnera accommodantur, uti licet.
Optime tamen sicca linamenta, vel si purgandum
aliquid videtur, in melle tinēta imponuntur. Ven-
ni nullis os sub-est, sed illi pernicioſa admodum fi-
stula sunt, adeo ut Sostratus insanabiles esse cre-
didit

allderit. Id nō ex toto ita se habere usus ostēdit. Et quidē (quod maxime mirū videri potest) tutior fistula est contra iecur, & lienē, & ventriculam, quā cōtra intestina: non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locū faciat. Cuius experimento moti quidā auctores parum modum rē cognoverūt. Nam vēter saepe etiā telo perforatur, prolapsaq; intestina conduntur, & oras vulnū sutura cōprehendunt, quod quemadmodum fiat in ex indicabo. Itaq; etiā ubi tenuis fistula abdomē perumpit, excidere eam licet, suturaq; oras coniungere. Si verō ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna vi utiq; ab interiore parte sui non potest, quasi membrana quadam finit abdomen, quem πειρίσματιος Graeci vocant. Ergo ubi aliquis ingredi ac moueri cōpit, rūpitur illa sutura, atq; intestina solvūtur. Quo fit, ut pereundiū homini sit. Sed non omni modo res ea desperationem habet. Ideoq; tenuioribus fistulis adhibēda curatio est.

De ani fistulis.

Propriā etiā animaduersionem desiderāt ea, quae in ano sunt. In hac demissō specillo, ad ultimū eius caput incidi cutis debet, dein nouo foramine specillū educi lino sequente, quod in aliā eius partem ob id ipsum perforatū coniectum sit. Ibi linum prehendendū, vinciendamq; cum altero capite est, ut laxē cutem, quae super fistulam est, teneat. Idq; linum esse debet crudum, & dup.

& duplex triplexve, sic tortū ut unitas facta sit.
 Interim autē licet negotia agere, ambulare, lava-
 ri, cibū capere perinde atq; sanissimo. Tātummo-
 do id linnū bis die satuo modo ducendū est, sic ut
 subeat fistulā pars quę superior fuerit. Neq; com-
 mittendum est, ut id linnū putrescat. Sed tertio
 quoq; die nodus resolvendus est, & ad caput alte-
 rum recens linnū alligādum, eductoq; vetere, id in
 fistula cum simili nodo relinquendū. Sic enim id
 paulatim cutem, quę suprà fistulam est incidit,
 simulq; & id sanescit, quod à lino relictū est, &
 id quod ab eo mordetur, inciditur. Hac ratio cu-
 rationis longa, sed sine dolore est. Qui festinat,
 asstringere cutē lino debet, quo celerius secet, no-
 tūq; penicillo tenuia quādā intus demittere, ut
 cutis hoc ipso extenuetur, quo extēditur. Sed hac
 dolorem mouent. Adicitur celeritatē sic, ut tor- * sicut
 mēto quoq; si & linnū & id quod ex penicillo est,
 aliquo medicamento illinitur, ex his quibus callū
 exedi posui. Poterit tamē fieri ut ad scalpelli cura-
 tionē etiam illō loci veniēdum sit, si intus fistula
 fert, si multiplex est. Igitur in hac genera demisso
 specillo duabus lineis incidēda cutis est, ut media
 inter eas habenula tenuis admodum eiciatur, ne
 protinus ora coeant, sitq; locus aliquis linamen-
 tis, quę quā paucissima superinyciēda sunt,
 omniaq; eodem modo faciēda, qui in abcessibus
 positus est. Si verò ab uno ore plures sinus erunt,
 recte fistula scalpello erit incidēda, ab eo cetera
 quę

quæ iam patebūt lino excipienda: si intus aliqua procedet, quò ferrū tuto peruenire nō poterit, collyriū demittendum erit. Cibus autem in omnibus eiusmodi casibus, siue manu siue medicamentis agetur, dari debet humidus, potio liberalis, diuq; aqua: ubi iam caro increfcit, tum demū & balneis raris vtēdū erit, & cibus corpus implētibus.

De Telis è corpore extrahendis.

Tela quoq; quæ illata corporibus intus hæserunt, magno negotio sape eijciuntur. Suntq; quedā difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte qua venit, aut ab ea in quā tetendit. Illic viam qua redeat, ipsum sibi fecit. Hic à scalpello accipit. Nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non alte telum insedit, & in summa est, aut certe magnas venas & loca nervosa non transijt, nihil melius est, quàm quā venit, id euellere. Si verò plus est per quod telo reuertendū, quàm quod perumpendū est: iamq; venas nervosq; id trāsit, commodius est aperire quod superest, itaq; extrahere. Nam & propius petitur & tutius euellitur, & in maiore membro si medium mucro transijt, facilius sanescit quod peruium est, quia vtrinq; medicamento fouetur. Sed si retro telum recipiendū est, amplianda scalpello plaga est, quo facilius id sequatur, quoq; minor oriatnr inflammatio: quæ maior fit, si ab illo ipso telo dum redit,

* caq;

* itaq;

dit, corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quàm ut telo postea transeunte ampliatur. Summa autè utraq; parte & habenda cura est, ne nervus, ne vena maior, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso est, abducendumq; scalpello. Ubi autem satis incisum est, telum eximendum est, tum quoq; eodem modo & eadè curabita, ne sub eo quod eximetur, aliquid eorū ledatur, quæ tuèda esse proposui. Hac communia sunt. Propria quadam in singulis telorum generibus subiicienda sunt, quæ protinus subiiciam. Nihil tam facile in corpore quàm sagitta conditur, eademq; altissime insidit. Hac autem eveniunt, & quia magna vi firmitur illa, & quia ipsa in angusto est. Sapius itaq; ab altera parte, quàm ex qua venit recipièda est, precipueq; quia ferè spiculis cingitur, quæ magis laniant, si retro, quàm si contrà trahuntur. Sed inde aperta via, caro diduci debet ferramento ad similitudinem facto Græca litera ψ. Deinde ubi apparuit, si mucro, si arūdo inhaeret, propellenda est, donec ab altera parte adprehendi & extrahi possit. Si iam illa decidit, solumq; intus ferrum est, mucro vel digitis adprehendi, vel forfice, atq; ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte qua venit, evelli magis placuit. Nam ampliato vulnere, aut arundo, si inest, euellenda est: aut si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaq;
C brevia

breuia & tenuia sunt, forfice ibi comminui debet, vacuumq; ab his telum educi: si ea maiora valentioraq; sunt, fistis scriptorijs calamis contegenda, ac ne quid lacerent, sic euellenda sunt. Et in sagittis quidem hæc observatio est. Latum verò telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere ipsi quoq; ingens vulnus adijciamus. Euellendum est ergo genere quoddam feramenti, quod Diocleum Græci graphiscum vocant, quoniam autorem Dioclem habet, quem inter præcos maximosq; medicos fuisse iam posui. Lamina vel ferrea vel aenea etiam ab altero capite duos utrinq; deorsum conuersos uncios habet, ab altero duplicata lateribus leniterq; extrema in eam partem inclinata, quæ sinuata est, insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perforata est. Hæc inxta telum transversa dimittitur. Deinde ubi ad imum mucronem ventum est, paulum torquetur, ut telum foramine suo excipiat. Cum in cauo mucro est, illico duo digiti subiecti partis alterius uncis, simul & feramentum id extrahunt & telum. Tertium genus telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute, integrum intus insedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idq; quod inest, eam quæ venit, forfice extrahendum est. Accedit verò aliquid difficultatis sub omni icu, si telum vel ossi inhasit, vel in articulo se inter duo ossa demersit, in osse usq; eo mouendum est, donec is locus

tus laxetur, qui mucronem inonordit, & tum vel manu vel forfice telum extrahendum est, quæ ratio in dentibus quoq; cingiendis est. Et vix unquã ita telum non sequitur. Sed si morabitur, excuti quoq; ictum aliquo ferramento poterit. Ultimum est, ubi non euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoq; foramine ad speciem literæ ¶ contra telum os excidere, sic ut linea quæ deducuntur ad telum spectent, eo factò id necesse est labet, & facile auferatur. Inter duo verò ossa si per ipsum articulum pertraxerit, circa vulnus duo membra fasciis benigniùs deliganda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, ut nervos distendat. Quibus extensis laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Illud videndum est, sicut in alijs locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria à telo laedatur, dum id extrahitur, eadẽ scilicet ratione quæ supra posita est. At si venenato quoq; telo quis ictus est, iisdẽ omnibus, si fieri potest, etiã festinantius altis adijcienda curatio est, quæ vel epoto venena, vel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autẽ ipsius extracto telo medicina non alia est, quàm quæ esset, si corpore icto nihil inhaesisset. De qua satis alio loco dictum est.

De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, & Stereomate capitis tuberculis. CAP. VI.

Hæc venire in qualibet parte corporis possunt. Reliqua certas sedes habent, de quibus dicam, orsus à capite. In hoc multa va-

riaq; tubercula oriuntur, γάρρλια μελικερία
 & ἀβερύματα nominant, alijs q; etiamnum er
 cabulis quadam alij discernunt, quibus ego στ
 τώματα quoq; adycta. Quae quamvis & in cer
 nice & in alis & in lateribus eriri solēt, per se sa
 men non posui, cum omnia ista mediocres differe
 ntias habeant, ac neq; periculo terreant, neq; di
 versio genere curentur. Omnia autē ista & ex per
 iculo incipiunt, & diu paulatimq; crescunt, &
 tunica sua includuntur. Quaedam ex his duras
 renitentia, quaedam mollia cedentiaq; sunt: qua
 dam spatio nudantur, quaedam cuncta capillis suo
 permanēt, fereq; sine dolore sunt. Quid intus ha
 beant, ut coniectura praesagiri potest, sic ex toto
 cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest. Maxime
 tamen in his quae renitentur, aut lapillis quaedā
 similia, aut concreti confertiq; pili reperuntur. In
 his verò quae cedunt, aut nulli simile aliquid, aut
 tenui pulticula, aut quasi rassa cartilagini, aut
 carni hebeti, & cruenta, quibus aliqui colores esse
 consueverunt, fereq; ganglia renitentur. Athere
 mati subest, quasi tenuis pulticula. Meliceridi li
 quidior humor, ideoq; pressum circumfluit. Stea
 tomati pingue quiddam, idq; latissime patere co
 suevit, resolvitq; totam cutē superpositam, sic, ut
 ea labet, cū in ceteris sit astrictior. Omnia detra
 hant, si capillis conteguntur, per mediū oportet in
 cidere: sed steatomatis tunica quoq; secanda est, ut
 effundatur quicquid intus coit: quia non facile a
 cute,

cute, subiecta carne, ea separetur, in ceteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autē alba & intenta se ostendit. Tū scalpelli manubriolo diducenda à cute & à carne est, eijciendaq; cum eo quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunica musculus inhaesit, ne is ledatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Ubi tota exempta est, cōmittenda ora, fibuliq; his injicienda, & super medicamentum glutinās dandum est. Ubi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum vitiiis quæ scalpello & manu curantur.

CAP. VII.

Sed ut hac neq; genere vitij neque ratione curationis inter se multum distant, sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diuersa sunt, & aliter aliterq; curantur. Igitur in superioribus palpebris vesica nasci solent pingues grauesq;, quæ vix attollere oculos sinunt, lenesq; pituita cursus, sed assiduos in oculis mouent. Fere verò in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atq; ita cute intēta, scalpello transversam lineā incidere, suspensa leniter manu, ne vesica ipsa vulneretur, & ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat, tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere. Facile autem sequitur. Dein superungi collyrio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur, paucissimiq; diebus cicatricula inducitur. Mole-

sticus est, ubi incisa vesica est. Effundit enim humorcm, neq; postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

De Cruhe tuberculo palpebrarum.

In eadem palpebra super pilorum locum, tuberculum parvulum nascitur, quod à similitudine ordeï, a Græcis *κρίδα* nominatur. Tunica quiddam quod difficulter maturescit, cōprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foveri oportet, sic ne nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur. Hac enim ratione sepe discenditur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello dividi debet, & quicquid intus humoris est exprimi. Eodem deinde vapor postea quoque foveri, & superinungi, donec ad sanitatem perveniat.

De chalazio palpebrarum.

Alia quoq; quedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur, sed neq; utique figura eiusdem, & mobilia simul atq; digito huc vel illuc impelluntur. Idcoq; ea *χαλᾶζια* vocant. Hac incidi debent, si sub cute sunt, ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiori. Deinde scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. Ac si intus plaga est, inungendum primo lenibus, deinde acrioribus. Si extra, superdandum emplastrum, quo id glatinetur.

De ungue oculorum, quod *ωτρίστιον*

Græcis vocatur.

Unguis

Vnguis verò, quod pterygion Græci vocant, est membranula nervosa oriens ab angulo, quæ nunquam ad pupillam quoque pervenit, eique officit. Sæpius à narium, interdum etiam à temporum parte nascitur. Hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inueteraverit, iamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet. Post abstinentiam verò unius diei, vel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, vel sic auersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. Quidam si in sinistro oculo vitium est, aduersum: si in dextro resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico. Sed ab hoc, si ille aduersus est, inferiore: si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recurvato subigere extremo ungui debet, eumque insigere, atque eam quoque palpebram tradere alteri, ipse hamulo apprehenso levare unguem, eumque acu traicere linum trahente. Deinde acum ponere, lini duo capita apprehendere, & per ea erecto ungue, si qua parte oculo inhaeret, in umbriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat. Deinde, invicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiat. Duplex enim periculum est, ne vel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem, vel ex angulo quoque caruncula abscindatur,

tur, quæ si vehemētius unguis ducitur, sequitur. Ideoq; decipit: ac si abscissa est, patescit foramē, per
 * ῥυπάδα quod postea semper humor descēdit, * ῥυάδα Graeci
 ci vocant. Verus ergo anguli finis utiq; noscendus
 est, qui ubi satis constitit, non nimiū adducto ungue
 scalpellus adhibendus est, deinde excidenda ea
 membrannula, ne quid ex angulo ladatur. Eo de-
 inde ex melle linamentum superdandum est, su-
 praq; lintecolum & aut spongia, aut lana succida,
 proximisq; diebus diducendus quotidie oculus est,
 ne cicatrice inter se palpebra glutinetur. Siquidē
 id quoq; tertium periculū accedit, eodemq; modo
 linamentum imponendum, ac novissime inungē-
 dum collurio, quo ulcera ad cicatricem perueni-
 tur. Sed ea curatio* vere esse debet, aut certē an-
 * verna te hyemem. De qua re ad plura loca pertinente se-
 mel dixisse satis erit. Nā duo genera curationum
 sunt. Alia in quibus eligere tempus non licet, sed
 utendū est eo quod incidit, sicut in vulneribus, et
 in fistulis. Alia in quibus nullus dies urget, &
 expectare tutissimum & facile est, sicut evenit in
 iis, quæ & tarde increscunt, & dolore non cru-
 ciant, in his ver expectandū est. Aut si quid ma-
 gis pressit, melior tamē autūnus vel æstas, quā
 hyems est. Atq; is ipse medius, iam fractis æstati-
 bus, nōdū ortis frigoribus. Quo magis autē neces-
 saria pars erit, quæ tractabitur, hoc quoq; ma-
 iori periculo subiecta est, & sape quo maior plaga
 facienda, eo magis hac temporis ratio servabitur.

De

De Encanthide, tuberculo.

EX curatione verò unguis, ut dixi, vitia nascuntur, quae ipsa alijs quoque de causis oriri solent. Interdum enim fit in angulo, parum ungue exciso, vel aliter tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur, ἰγκανθὶς Graece nominatur. Excidi hamulo & circumcidi debet, hic quoque diligenter temperata manu, ne quid ex ipso abscindat. Tum exiguum linamentum respergendum est, vel cadmia, vel atramento sutorio, inque cum angulum diductis palpebris inferendum, supraque eodem modo deligandum, proximisque diebus similiter nutriendum, tantum ut primis aqua egelida, vel etiam frigida foveatur.

De ancyloblepharo oculorum vitio.

Interdum inter se palpebrae coalescunt, aperiri quoque non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebrae cum albo oculi cohaerescant: scilicet cum in utroque fuit ulcus negligenter curatum. Sanescendo enim quod diduci potuit & debuit, glutinabit, ἀγκυλοβλήφαρον sub utroque vitio Graeci vocant. Palpebrae tantum inter se cohaerentes, non difficulter diducuntur, sed interdum frustra, nam rursus glutinatur. Experiri tamen oportet, quia bene res saepius cedit. Igitur aduersum specillum inferendum, diducendaque eo palpebrae sunt, deinde exigua penicilla interponenda, donec exulceratio eius loci finiatur. Aut ubi albo ipsius oculi palpebrae inhaesit, Heraclides Tarerinus auctor est,

C 5 aduerso

aduerso scalpello subsecare magna cum moderatione, ut neq; ex oculo, neq; ex palpebra quicquā abscindatur: ac si necesse est, ex palpebra potius. Post hæc inungatur oculus medicamentis, quibus asperitudo curatur, quotidieq; palpebra vertatur, non solū ut ulceri medicamentū inducatur, sed etiā ne rursus inhæreat, ipsiq; etiā precipiatur, ut saepe eam duobus digitis attollat. Ego sic restitutum esse neminem memini. Megetes se quoq; multa tentasse, neq; unquam profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhæserit, memoria prodit.

De Argilopa, fistula oculorum.

Etiā in angulo, qui naribus propior est, ex aliquo vitio quasi parua fistula aperitur, per quā pituita assidue distillat, *αἰγίλωπα* Græci vocant, idq; assidue male habet oculum, non nūquam etiā exeso ossē vsq; ad nares penetrat, idq; interdum naturam carcinomatis habet. Vbi intēta vena & recurvata sunt, color pallet, cutis dura est, & leui tactu irritatur, inflammationēq; in eas partes, qua coniunctæ sunt, euocat. Ex his eos qui quasi carcinoma habent, curare periculosum est. Nā moriē quoq; ea res maturat. Ea verò quibus ad nares tēdit, superuacua: neq; enim sanescūt. At quibus id in angulo est, potest adhiberi curatio, cū* eā non ignotū sit esse difficile, quātoq; angulo propius id foramē est, tanto difficilior est, quoniā perāgustū est in quo versari manus possit. Recenti tamen re mederi facilius est. Sed hamulo
suum

*co, ne

summū eius foraminis excipiendū, deinde totum id cauum, sicut in fistulis dixi, usq; ad os excidendū, oculoq; & ceteris iunctis partibus bene obtectis, os ferramēto adurendū est vehemētius. Quod si iam carie vexatum est, quo crassior his squama accedat, quidā adurentia imponunt, ut atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel aruginem rasam. Quod & tardius & non idem facit. Osse adusto curatio sequitur eadem, quæ in ceteris vstis.

De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Pili verò qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consuerunt. Nam modo palpebra superioris summa cutis relaxatur, & procidit: quo fit, ut eices pili ad ipsum oculum conuertantur, quia non simul cartilago quoque se remisit. Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrefcit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes verò hæ sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem haste lata, in ignem coniicienda est. Deinde candens sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in conspectu curatis veniant, sub ipsis pilorum radicibus ab angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebra transuat. Deinde iterum tertioq; usque ad alterum angulum. Quo fit, ut omnes pilorum radices adusta emoriantur. Tum superimponendum medicamētum est, quod inflammationem prohibeat, atque ubi crusta exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facilime
autem

autem id genus sanescit: quidā aiunt acu transui
iuxta pilos in exteriorē partē palpebra opertere,
eāq; transmitti duplicē capillum muliebrē ducentem: atq; ubi acus transijt, in ipsius capilli sinum,
quā duplicatur, pilū esse inijciendū, & per eum in
superiorē palpebra partem attrahendū, ibiq; cor
pori adglutinandū & imponendū medicamentū,
quo foramen quoq; glutinetur: sic enim fore, ut is
pilus in exteriorē partē postea spectet. Id primum
fieri non potest, nisi in pilo longiore, cū fere breues
eo loco nascātur. Deinde si plures pili sunt, necesse
est longum tormentum, cum toties acus transuet,
magnam inflammationē moueat. Nouissime cum
humor aliquis ibi subsit, oculo & antē per pilos,
& tum per palpebra foramina affecto, vix fieri
potest, ut gluten, quo vinētus est pilus, non resol
natur. Eoq; fit, ut is eò unde vi abductus est, re
deat. Ea verò curatio, quæ palpebra laxioris ab o
mnibus frequētatur, nihil habet dubij. Siquidem
oportet contēcto oculo mediā palpebra cutem, siue
ea superior, siue inferior est, apprehendere digitis,
ac lenare, tum considerare quantulo detractō fu
turum sit, ut naturaliter se habeat. Siquidem hic
quoq; duo pericula circūstant: si nimium fuerit
excisum, ne contegi oculus non possit: si parum, ne
nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit. Qui
deinde incidendū videbitur per duas lineas attra
mento notandum est, sic ut de interiore quæ pilos
continet, & propiore ei linea aliquid relinquantur
quod

quod apprehendere acus postea possit. His constitutis scalpellus adhibendus est, & si superior palpebra est, antè: si inferior, postea propius ipsis pilis incidendum, initiumq; faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo qui temporibus: in dextro, ab eo qui naribus propior est, idq; quod inter duas lineas est excidendum. Deinde ora vulneris inter se simplici sutura committenda, operiendusq; oculus est: & si parum palpebra descendet, laxanda utiq;: si nimium, aut astringenda, aut etiam rursus tenuis habenucula ab ulteriore ora excidenda. Ubi secta est, alia sutura adijcienda, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte ducti pili sursum spectent. Idq; si levis inclinatio est, etiam solum satis tnetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, sponsia ex aqua frigida expressa super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum injiciendum. Quarto sutura tollenda est, & collyrio quod inflammationes reprimit, superinungendum.

De Lagophthalmo oculorum.

Nonnunquam autem nimium sub hac curatione excisa cute evenit, ut oculus non contingatur. Idq; interdum etiã alia de causa fit, κατὰ τὴν βλάβην Græci appellant. In quo si nimium palpebra deest, nulla id restituere curatio potest. Si exiguum, mederi licet, paulum infra supercilium cutis incidenda est lunata figura, cornibus

eius deorsum spectantibus. Altitudo esse plaga
 usq; ad cartilaginem debet, ipsa illa nihil laesa. Nā
 si ea incisa est, palpebra concidit, neq; attolli postea
 potest. Cute igitur tantum diducta sit, ut paulum
 in ima oculi ora descendat, hiante scilicet super
 plaga, in quem linamentū coniciendum est, quod
 & coniūgi diductam cutem prohibeat, & in me-
 dio carunculam citet: qua ubi eum locum imple-
 nit, postea recte oculus operitur.

De Ectropio.

VT superioris autē palpebra vitium est, quod
 parum descendit, ideoq; oculū non contegit,
 sic inferioris, quod parū sursum attollitur, sed pen-
 det & hiat, neq; potest cū superiore cōmitti. Atq;
 id quoq; enenit interdū ex simili vitio curationis
 interdū etiam senectute, ἐκτροπίον Graci vocāt.
 Si ex mala curatione est, eadē ratio medicinae est,
 qua supra posita est, plaga tantum cornua ad ma-
 xillas, non ad oculum conuertenda sunt. Si ex se-
 nectute est, tenui firramento id totum extrinsecus
 adurendū est, deinde melle inungendū, & quarto
 die vapore aqua calida fouendū inungēdūq;
 medicamentis ad cicatricem perducentibus.

De Staphylomate oculi.

HAcc si re circa oculum in angulis palpebrūq;
 incidere consueverunt. In ipso autem oculo
 nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis
 intus membranis aliquibus, siue laxatis, et similis
 figura acino sit. Unde id σταφύλωμα Graci vocāt.
 curat

Curatio duplex est. Altera ad ipsas radices per medium transuere acu duo lina ducente. Deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore astringere inter se, quæ paulatim secando id excidunt. Altera in summa parte eius ad lenticula magnitudinem excidere, deinde spon- dium aut cadmiam infricare. Utrolibet autem fa- cto, album ovi lana excipicudum & imponendū, posteaq; vapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis unguendus est.

De Clavis oculorum.

Clavi autem vocantur callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figura similitu- dine est. Hos ad imam radicem perforare acu con- modissimum est, infraq; eam excidere, deinde le- nibus medicamentis inungere.

De natura oculorum, & eorum suffusione.

Suffusionis iam aliàs feci mentionē, quia cum recens incidit, medicamentis quoq; sape dis- cutitur. Sed ubi vetustior facta est, manus cura- tionem desiderat, qua inter subtilissimas haberi potest. De qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. Cuius cognitio, cum ad plu- ra loca pertineat, tum vel præcipue ad hunc per- tinet. Is igitur summas habet duas tunicas, ex quibus superior à Grecis *μεγαλοειδής* vocatur. Ea qua parte alba est, satis crassa, pupilla loco extenuatur. Illic inferior adiuncta est media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circ

circa tenuis, ulterioribus partibus ipsa quoq; ple-
 *χοροειδής nior, quæ παγοειδής à Grecis nominatur. Haec duo
 tunica cum interiora oculi cingant, rursus sub his
 coeunt, extenuatæq; & in unum coactæ, per for-
 men, quod inter ossa est, ad membranam cerebri
 perveniunt, eiq; inhaerescunt. Sub his autem qua
 parte pupilla est, locus vacuus est. Deinde infra
 rursus tenuissima tunica quam Herophilus ἀγ-
 χροειδής nominavit. Ea media subsidet, eoq; cavo
 cōtinet quiddā, quod à vitri similitudine ὕαδης
 ὁὶς Græci vocant. Id neq; liquidū, neq; aridū est,
 sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupilla
 color vel niger est, vel cæsius, cum summa tunica
 tota alba sit. Id autem superveniens ab interiore
 parte mēbranula includit, sub his gutta humoris
 est, oni albo similis, à qua videndi facultas profi-
 cisitur, χρωταειδής à Græcis nominatur. Igi-
 tur vel ex morbo vel ex ictu concrevit humor sub
 duabus tunicis, quā locum vacuum esse proposui:
 isq; paulatim indurefcens interiori potentia se op-
 ponit. Viriq; eius plures species sunt, quædam sa-
 nabiles, quædam quæ curationem non admittunt.
 Nam si exigua suffusio est, si immobilis, colorum
 verò habet marina aqua, vel ferri nitēis, et a la-
 tere sensum aliquē fulgoris relinquit, spes superest.
 Si magna est, si nigra pars oculi amissa naturalis
 figura in aliam vertit, si suffusioni color caruleus
 est, aut auro similis, si labat, & hac atq; illac mo-
 vetur, vix unquam succurritur. Fere verò peior
 est,

est, quo ex graviore morbo, maioribusque capitis doloribus, vel ictu vehementiore orta est. Neque idonea curatio, si senilis aetas est, qua sine nouo vitio tamen aciem hebetem habet. At ne puerilis quidem, sed inter hac media aetas. Oculus quoque curationi neque exiguus, neque concavus satis opportunus est, atque ipsius suffusionis quadam maturitas est. Expectandum igitur est donec iam non fluere, sed durities quadam concreuisse videatur. Ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet, pridie ab omnibus abstinere. Post hac in aduerso sedili collocandus est loco lucido, lumine aduerso, sic ut contra medicus paulo altius sedeat. A posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister continet, & immobile id praestet. Nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. Quin etiam ipse oculus qui curabitur, immobilior faciendus est, super alterum lana imposita & deligata. Curari vero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus admonenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaque demittenda. Sed recta est per summas duas tunicas medio loco inter nigrum oculi & angulum temporis propriore regione media suffusionis, sic ne quae vena laedatur. Neque tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur. Ad quem cum ventum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest, quia prementi nihil renititur. Ubi eo ventum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est. Leniterque

ibi verti & paulatim eam deducere infra regionem pupilla debet: ubi deinde eam transit, vehementius imprimi ut inferiori parti insidat. Si hoc sit, curatio expleta est. Si subinde redit, eadē ac magis cōcidenda, & in plures partes dissipanda est, quæ singula & facilius conduuntur, & minus late officiunt. Post hæc educēda acus recta est, imponendumq; est Lana molli exceptū oni album, & supra, quod inflammationē coërceat, atq; ita deincepiendum. Post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorum inūctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primū liquido ne maxilla laborent, deinde inflammatione finita, tali, qualis in vulneribus prositus est. Quibus ut aqua quoq; diutius bibatur, necessario accedit.

De Pituita oculorum.

DE pituita quoq; tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamentis agendum est, iam explicui. Nunc ad ea veniem, quæ curationē ex manu postulant. Animaduerrimus autē quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper bubere tenui madere, quæ res asperitudinem continuat, ex leuibus momentis inflammaciones & lippitudines excitat, totam deniq; vitā hominis infestat. Idq; in quibusdā nulla ope adiunari potest, in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen est, nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur. Ac primum perueniatur curatio est in his qui ab infantibus id vitium habent.

bent, quia necessario mansurum est usq; mortis diem. Deinde non necessario etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est. Si quidem manū nihil adiuvatur, medicamentis, & victus ratione, quæ crassiorē pituitam reddit, ad sanitatem perveniunt. Lata etiam capita vix medicina patient. Tum interest vena pituitam emittant, quæ inter calvariā & cutem sunt, an quæ inter membranam cerebri, & calvariā. Superiores ferè per tēpora oculos rigant, inferiores per eas membranas, quæ ab oculis ad cerebrum tendūt. Potest autem adhiberi remedium his, quæ supra os sunt, non potest his, quæ sub osse. Ac ne hic quidē succurritur, quibus pituita utrinq; descendit, quia levata altera parte, nihilominus altera infestat. Quid sit autē, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, à supercilijs usq; ad verticem illini debent. Si sicci oculi esse ceperunt, apparet per eas venas, quæ sub cute sunt, irrigari. Si nihilominus madent, manifestum est, sub osse descendere. Si est humor, sed lenior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venæ exerceant, ideoq; pluribus etiā opitulari licet. Idq; non in Græcia tantummodo, sed in alijs quoq; gentibus celebre est, adeo ut nulla medicina pars magis per rationes quoq; exposita sit. Experti in Græcia sunt, q nonē lineas cutis capitis incidarent, duabus in occipitio rectis, am r sup eas trans-

uersa, dein duabus super aures, vna inter eas itē
transuersa, tribus inter verticē & frontem relictis.
Reperti sunt, qui à capite recte eas lineas ad tem-
pora diducerent, cognitisq; ex motu maxillarum
musculorum initijs, leniter super eos cutem inci-
derent, inductisq; per retusos hamos oris insererēt
linamenta, ut neq; inter se cutis antiqui fines cō-
mitterētur, & in medio caro incretceret, quæ ve-
nas ex quibus humor ad oculos trāsiret, astringe-
ret. Quidam etiam atramento duas lineas duxe-
runt à media aure ad mediam alterā aurem, de-
inde à naribus ad verticem. Tum ubi linea com-
mittebantur, scalpello inciderunt, et post sanguine
fuso, os ibidem adusserunt. Nihilominus autē &
in temporibus, & inter frontem atq; caluariam
eminentibus venis idem candens ferrum admo-
uerunt. Frequens curatio est, venas in temporibus
adurere, quæ fere quidē in eiusmodi malo tamēt,
sed tamen ut insentur magisq; se ostendāt, cernix
antē modice deliganda est: tenuibusq; ferramētis,
& retusis vena adurenda, donec in oculis pituita
cursus cōquiescat. Id enim signum est quasi exca-
uorum itinerum, per quæ humor ferebatur. Va-
lentior tamen medicina est, ubi tenues conditaq;
vena, ideoq; ligi non possunt. Eodē modo cervice
deligata, relictq; ab ipso spiritu, quo maioris vena
prodeant, atramento non re eas contra tempora &
inter cernicem, ac frontē, deinde cervice resoluta,
quæ nota sunt, venas incidere, & sanguinē mis-
tere.

tere. Vbi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. Contra tempora quidem, timide, ne subiecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem verò & verticem, vebemēter, ut sic squama ab osse recedat. Efficacior tamen etiamnum est Asforum curatio, qui verticem vsq; ad os adurunt, sic ut squamam remittat. Sed nihil melius est, quam quod in Gallia quoque Comata fit, vbi venas in temporibus & in superiore capitis parte legunt. Aduſta quomodo curanda sint, iam explicui. Nunc illud adyccio, neq; ut crusta decidant, neq; ut vlcus impleatur aduſtis venis eſſe prope- randū, ne vel ſanguis erumpat, vel cito prius ſup- primatur, cū per hoc ſicceſcere eas partes opus ſit. per illud exhauriri opus non ſit. Si quando tamen ſanguis eruperit, inſtricanda medicamēta eſſe, quæ ſic ſanguinē ſupprimāt, ne adurāt. Quemadmodū autē vena deligenda ſint, quidq; lectis his facien- dum ſit, cum venero ad crurum varices dicam.

De aurium morbis, qui manu & ſcalpello cu-
rantur. CAP. VIII.

VErūm ut oculi multiplicem curationem, etiam manus exigūt: ſic in auribus admo- dum pauca ſunt, quæ in hac medicina parte tra- ctentur. Solet tamen euenire vel à prima natali die protinus, vel poſtea facta exulceratione per- cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum ſit, ideoq; audiendi uſu careat. Quod vbi inci- dit, ſpecillo tentandum eſt, altēne id repletum,

an in summo tantum glutinatum sit. Nam si altè est, prementi non cedit: si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur nervorum, & ex ea mortis periculum sit. Hoc facile curatur. Nam qui cauum esse debet, vel medicamentum aliquod imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumq; id patefactum, & iam vlcus purum est, iniicienda eò pinna est, illita medicamento cicatricem inducente, circaq; idem medicamentum dādum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit ut ea remota, postea facultas audiendi sit. At ubi aures, in viro puta, perforatae sunt, & offendunt, traicere id cauum celeriter candente acu satis, ut leniter eius ora exulcerentur, aut etiam adurenti medicamento idem exulcerare, postea deinde imponere id quod purgat, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est (sicut solet esse in his, qui maiora pondera auribus gesserunt) incidere quod super est ad extremum oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea siccere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire: quae res cum in labris quoq; & naribus fieri possit, eandem etiam rationem habeat, simul explicanda est.

Curra in auribus, labrisq; ac naribus, quomodo
sarciri, & curari possint. CAP. IX.

Curra

Curta igitur in his tribus, ac si qua parva
 paria sunt, curari possunt. Si qua maiora
 sunt, aut non recipiunt curationē, aut ita per hāc
 ipsam deformantur, ut minus indecora antè fue-
 rint. Atq; in aure quidem & naribus deformitas
 sola timeri potest. In labris verò si nimium cōtra-
 cta sunt, usus quoq; necessary iactura fit, quia
 minus facile & cibis assumitur, & sermo expli-
 catur. Neq; enim creatur ibi corpus, sed ex vicino
 adducitur: quod in leui mutatione, & nihil eri-
 pere, & fallere oculum potest: in magna non po-
 test. Neq; senile autem corpus, neq; quod mali ha-
 bitus est, neq; in quo difficulter ulcera sanescunt,
 huic medicina idoneum est, quia nusquā celerius
 cācer occupat, aut difficilius tollitur. Ratio cura-
 tionis eiusmodi est. Id quod curatum est, in qua-
 dratum redigere, ab interioribus eius angulis li-
 neas transuersas incidere, quae citeriorem partem
 ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea quae sic
 *repositimus, in vnum adducere. Si nō satis iun- *resolui-
 guntur, ultra lineas, quas antè fecimus aliās duas mus
 laxatas, & ad plagā conuersas immittere, quibus
 summa tantis curis diducatur. Sic enim fit, ut fa-
 cilius quod adducitur, sequi possit: quod nō vi co-
 gendum est, sed ita adducendū, ut ex facili subse-
 quatur, & *dimissum non multū recedat. Interdū *demissi-
 autē ab altera parte cutis haud omnino adducta,
 deformem quē reliquit locum, reddit. Huiusmodi
 loci altera pars incidenda, altera intacta habenda
 est.

est. Ergo neq; ex imis auribus, neq; ex medio naso imis venarum partibus, neque ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. Vtrinque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris deerit. Quae tamen interdum etiam duobus locis curata esse consuerunt. Sed eadem curatio curandi est, si cartilago in eo quod incisum est eminet, excidenda est. Neq; enim aut glutinatur, aut acu tuto traicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas oras libere cutis, vtrinque coitus puris fieri possit. Tum iunctae ora inter se suenda sunt, vtrinque cute apprehensa, & quae priores lineae sunt, ea quoque sutura injicienda sunt. Siccis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. In posteriores vero lunataeque plumbae linamentum dandum est, ut caro incresecens vulnus impleat, summaque cura, quod iam sutum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fovendum erit vapore aquae calidae, rursusque idem medicamentum injiciendum, fereque septimo die glutinatum est. Tum sutura eximitur, & vlcus ad sanitatem perducitur debent.

De Polybi curatione per ferrum. CAP. X.

Polybum vero, qui in naribus nascitur, praecipue ferro curari iam alias posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spatulae fulto resolvere ab osse oportet: adhibita diligentia, ne in-

fractura cartilago ledatur, in qua difficilis curatio est. Ubi abscissus est, unco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamēto, quo sanguis suppressitur, eoque nares leniter implenda. Sanguine suppresso, linamēto vulnus purgandum est. Ubi purum est, eo pinna eodem modo, quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

De Oryza.

CAP. XI.

ID autem vitium, quod ὀρυζα à Graecis vocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurges non reperi. Credo, quia res raro ad sanitatem satis proficit, cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. Apud quosdam tamē positum est vel sutilem fistulam, vel enodem scriptorium calamum in nares esse coniiciendum, donec sursum ad os perveniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os, deinde adustum locum purgandum esse erugine & melle. Ubi purus est, lycio ad sanitatē perducendum. Vel nares incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admoueri. Tum sui nares debere, & adustum quidem ulcus eadē ratione curari. Sutura vero illini vel spuma argenti, vel alio glutinate.

De oris vitiiis, quæ manu & ferro curantur.

CAP. XII.

De Dentibus.

IN ore quoq; quaedam manu curantur. Vbi in primis dentes nonnunquam mouentur, modo propter radicū imbecilitatem, modo propter gingivarum arescentium vitiū. Oportet in utrolibet candens ferramētum ginginis admonere, ut leniter attingat, nō ut incidat. Adusta gingina melle illinenda, & mulso eluendę sunt. Ut pura videri esse caperunt, arida medicamenta infricanda sunt ex his quę reprimunt. Si verò dens dolores mouet, eximiq; eum, quia medicamenta nihil adiuuant, placuit, circumradi debet, ut gingina ab eo resoluiatur. Tum is cōcutiendus est. Eaq; fricanda, donec bene moueatur. Nam dens harensummo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco mouetur. Idq; etiam maiore periculo in superioribus dētibus fit, quia potest tempora occlusiue cōcutere. Tum si fieri potest manu, si minus, forfice, dens excipiens est. Ac si excisus est, autē id forā mē vel inamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forfice confringatur. Relicta vero forfex ducenda est, ne inflexu radicibus os earum, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. Neque ideo nullum eius rei periculum est, utique in dentibus breuibus, qui siue longiores radices habent. Sape enim forfex cum dentem comprehender: non possit, aut frustra comprehendat, os gingina prehendit, & frangit. Propterea autem ubi plus sanguinis profluit, scire

licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo cō-
 quirenda est testa, qua recessit, & vossella protra-
 henda est. Si non sequitur, incidi gingiva debet,
 donec labās ossis testa recipiatur. Quod si fractum
 statim non est, indurescit extrinsecus maxilla, ut
 his hiare non possit. Sed imponendum calidum ex
 farina aut fico cataplasma est, donec ibi pus mo-
 neatur. Tum incidi gingiva debet. Pus quoq; mul-
 tum profluens, ossis fracti nota est. Itaq; etiā tum
 id extrahi convenit. Nonnunquam etiā eo laeso,
 fistula fit, quæ eradi debet. Dēs autem scaber, qua
 parte niger est, radendus est, illinendusq; rosa flore
 contrito, cui galla quarta pars, & altera myrrha
 sit adiecta. Continendumq; ore crebro vinum me-
 recum. Atq; in eo casu velandum caput, ambula-
 tione multa, frictione capitis, cibo non acri uten-
 dum est. At si ex ictu vel alio casu aliqui labant
 dentes, turo cum his qui bene hærent vinciendi
 sunt. Continendq; ore reprimentia, ut vinum in
 quo malicorium decoctū, aut in quo galla candens
 coniecta sit. Si quando etiā in pueris alter dens
 nascitur quam prior excidat, is qui cadere de-
 buit, circum purgandus & euellendus est, is qui
 novus est in locum prioris quotidie digito adur-
 gendus, donec ad iustam magnitudinem perue-
 niat. Quotiescunq; dēte exempto radix relicta est,
 protinus ea quoq; ad id faciā forsic, quam rōi-
 em Græci vocant, eximenda est. Tonsillas autē,
 quæ post inflammationes induruerunt, & rōiā dū-
 autem

autem à Graecis appellantur, cum sub leni tunica sint, oportet digito circumradere & euellere: si ut sic quidem resolvuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere, tum vlcus aceto eluere, & illinere vultus medicamento, quo sanguis supprimatur.

De Vula.

Vula si cū inflāmate descendit, doloriq; est & subrubū ūdi coloris, praeidi sine periculo non potest. Solet enim muliū sanguinē effundere. Itaq; melius est his uti, quae aliās proposita sunt. Si verò inflāmatio quidem nulla est, nihilominus autē ea ultra iustū modū à pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba, praeidi debet. Itemq; si ima, livida, & crassa, summa, tenuis est. Neque quicquā cōmodius est, quā vulsella prehēdere, sub eaq; quod volumus excidere. Neq; enim vllū periculū est, ne plus minusūe praeidatur, cū liceat tātū infra vulsellam relinquere, quantū inutile esse manifestū est, idq; praeidere quo longior vula est, quā esse naturaliter debet. Post curationem eadem faciēda sunt, quae in consiliis proxime posui.

De Lingua.

Lingua vcrò quibusdam cū subiecta parte à primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidem possunt. Horum extrema lingua vulsella prehēdenda est, sub eaq; mēbrana incidenda, magna cura habita, ne vena quae iuxta sunt, violentur, & profusione sanguinis nocēat. Reliqua curatio vultus, in prioribus posita est. Et pleriq;

Plurimique quidem ubi consanuerunt, loquuntur. Ego autem cognoui, qui succisa lingua cum abunde super dentes eam premeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. Adeo in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est, id quod sequi conuenit.

De Abscessu sub lingua.

Sub lingua quoque interdum aliquid abscedit, quod ferè consistit in tunica, doloresque magnos mouet: quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis usque ad tunicam excidenda est, deinde utrinque ora hamulis excipienda, & tunica undique circumdata liberanda est: magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua maior vena incidatur.

De Labris.

Labra autem saepe finduntur, earumque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur, qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt, medicamentis curare commodius est, quae ad ulcera oris fiunt. Si vero alius descenderit, necessarium est tenui ferramento adurere, quod spatula simile quasi transcurrere, non imprimi debet. Postea facièda eadem sunt, quae in auribus aduultis exposita sunt.

De Cervice vitilis, & curatione. CAP. XIII.

At in cervice inter cutem & asperam arteriam tumor increscit, βρογχονόμας Graeci vocant, quae modo caro habes, modum humor ali-

quis

*exedi-
tur.

quis melli aquæve similis includitur, interdum etiam minutis ossibus pili immixti. Ex quibus quicquid est, quod tunica continetur, potest adurētibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superficiali tunica* exeritur. Quo facto, siue humor est, protrahitur: siue quid densius, digitis edacitur, tum demum sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio brevior est, Medio tumore una linea inciditur et spi- ad tunicā, Deinde vitiosus sinus ab integro corpore digito separatur, totusque cum velamento suo eximitur. Tu aceto cui vel salē vel nitrum aliq̃ adiecit, eluitur, oraque una sutura iunguntur, ceteraque eade qua in alijs suturis supiniunguntur. Leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur: si quando aut tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurētis, linimentisque id curandum est, ceteris prout moventibus.

De umbilici vitis.

CAP. XIII.

Sunt etiam citra Umbilicum plura vitia, de quibus propter raritatem intra auctores parum constitat. Verisimile est autem id à quoque prætermis- sum, quod ipse non cognoverat, à nullo id quod non viderat, factum. Comune omnibus est, umbilicum indecore prominere. Causa requiruntur. Alerges tres has posuit. Modo intestinum eo irrum- pere, modo omentum, modo humorem. Sôstratus nihil de omento dixit. Duobus iisdem adiecit, carnem ibi interdum increfcere, eamque modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit. Sed eadem

tra

tria causatus, spiritum quoque interdum eò dixit ir-
 rumpere. Hieron omnibus his quatuor positis, &
 omenti mentionem habuit, & eius quod simul &
 omentum & intestinum habuerit. Quid autem horum
 sit, his indicijs cognoscitur. Vbi intestinum prola-
 psum est, tumor neque durus, neque mollis est, omni
 frigere cõminuitur: non solum sub omni calore, sed
 etiam ætæto spiritu crescit. Sonat interdum, atque ubi
 resupinatus est aliquis delapso intestino ipse desi-
 dit. Vbi verò omentum est, cetera similia sunt, tu-
 mor mollior ab *x* ima parte, latus extenuatum in *x* una
 venter est, si quis apprehendit, elabitur. Vbi utrumque
 est, indicia quoque mixta sunt, & inter utrumque
 molities. At caro durior est, semperque etiam resu-
 pinato corpore tumet, prementique non cedit, pri-
 ribus facile cedentibus. Si vitiosa est, easdem ne-
 tas habet, quas in carcinomate exposui. Humor
 autem si premitur, circumfluit. At spiritus pressus
 cedit, sed protinus redit, resupinato quoque corpore
 tumorem in eadem figura tenet. Ex his id quod
 ex spiritu vitium est, medicinam non admittit. Ce-
 ro quoque carcinomati similis cum periculo tra-
 ctatur. Itaque omittenda est. Sana excidi debet,
 idque vulnus linamentis curari. Humorem quidam
 vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus
 ipsam linamentis curant. In reliquis varia sen-
 tentia fuit. At resupinandum quidem corpus esse
 res ipsa testatur, ut in uterum siue intestinum,
 sine conuentum est, delibatur. Sinus vero vmbi-
 lici

*id vitiū

lici tū vacuus à quibusdā duabus regulis exceptus est, vehementerq; ectrū capitibus deligatis, ibi emoritur. A quibusdā* ad imum acutriciētur, duolina ducente, deinde utriusq; lini duobus capitibus diversa partes astringuntur. Quod in una quoque oculi fit. Nam si id quod supra vinculum est, moritur. Adiecerunt quidā, ut antequam vincerent, summū una linea inciderēt, exciderētq; quofacilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent, tū deinde vinxerūt. Sed abunde est, inbere spiritū continere, ut tumor quantus maximus esse potest, se ostendat, tū imam basim eius attamento notare, resupinatoq; homine digitis tumorem premere, ut si quid delapsum non est, manu cogatur. Posthac umbilicū attrahere, & quā nota atramenti est, lino vehementer astringere. Deinde partem superiorem aut medicamentis, aut ferro adurere donec emoriatur, atq; ut cetera vasa vlcus nutrire. Idq; nō solū vbi intestinū vel omentū vel utrūq; est, sed etiā vbi humor est, optime proficit. Sed ante quadā visenda sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nā curationi neq; infans, neq; aut robustus annis, aut senex aptus est, sed à septimo frē anno ad quartumdecimum. Deinde ei corpus idoneū est id, quod integrū est. At quod meli habitus est, quodq; papulas, impetigines, similisq; habet, idoneū nō est. Lenibus quoq; tumoribus facili subuenitur. At in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni &

autumni

autumnale, & hybernium vitandum est. Ver idonum maxime est. Ac prima æstas non aliena est. Præter hæc abstinere pridie debet. neq; id satis est. Sed alius quoq; ei ducenda est, quo facilius omnia quæ excesserunt, intra alium considant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

CAP. XV.

Aquam his qui hydropici sunt emitti oportere alias dixi. Nunc quemadmodum id fiat, dicendum. Quidam autem sub umbilico fere quatuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato, facere consueverunt. Quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso, quia quod per ignem divisum est, minus celeriter coit. Ferramentum autem demittitur, magna cura habita, ne qua vena incidatur. Id tale esse debet, ut fere tertiam digiti partem latitudo mucronis impleat. Demittendumq; ita est, ut membranam quoq; transcat, qua caro ab interiore parte finitur, eo tum plumbee aut anea fistula inijcienda est, vel recurvatis in exteriorem partem labris, vel in media circum surgente* quodam nodo, ne tota intus delabi possit, huius ea pars quæ intra, paulo longior esse debet, quam quæ extra, ut ultra ulteriorem membranam procedat. Per hanc effundendus humor est. Atq; ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso linteculo fistula est, & in vulnere, si id vestum non est, relinquenda. Deinde per insequentes dies circa singulas

gulas heminas emittendum, donec nullum aque vestigium appareat. Quidam tamen etiā nō vscute protinus fistulam recipiunt, & super vulnus spongiam expressam deligant: Deinde, postero die rursus fistulā demittunt, quod recens vulnus paulum diductum patitur, ut si quid humoris superest, emittatur. Idq; bis ita fecisse contenti sunt.

De intestinorum vulnerum curationibus.

C A P.

XVI.

Nonnunquā autem venter iclū aliqua perforatur, sequiturq; ut intestina evolvantur. Quod ubi incidit, protinus considerandum est, an integra ea sint, deinde an his color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatū est, nihil profici posse iam retuli. Latius intestinum sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod dubis spes certa desperatione sit potior. Interdū enim glutinatur, Tum si utrūlibet intestinū lividum, aut pallidū, aut nigrum est, quibus illud quoq; necessario accedit, ut sensu careat, medicina omnis inanis est. Si verò adhuc ea sui coloris sunt, cū magna fistinatione succurrendū est. Memento enim alienantur externo & insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. Et si angustius vulnus est, quā ut intestina comode refundantur, incidendū est donec satis pateat. At si iā succiora intestina sunt, plūda aqua sunt, cui paulū admodū olei sit adiectū. Tū minister oras vulnervis leviter diducere manibus suis, vel etiā duobus
bamus

hamis mēbrana interiori iniectis debet, medicus priora semper intestina, quae posteriora prolapsa sunt, condere, sic ut orbium singulorum locum seruet. Repositis omnibus, leniter homo concutiendus est. Quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes diducantur, & inibi concidant. His conditionibus omentum quoque considerandum est, ex quo si quid iam nigri & emortui est, forsice excidi debet. Si quid integrum est, leniter super intestina diduci: sutura autem neque summa cutis, neque interioris mēbrana per se satis proficit, sed utriusque. Et quidem duobus lineis vincienda est spissior, quam alibi: quia rumpi & facilius motu ventris potest, & non aequè magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duabus acubus fila traicienda, eaque duabus manibus tenenda, & prius interiori membrana sutura iniicienda est, sic ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinistiore à principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorē acum immittat. Quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acum longè sit, qua retusa est. Semel utraque parte traiecta permutanda acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quae fuit in sinistra, ea veniat in sinistra, quā dextra continuit. Iterūque eodem modo per oras immittendae sunt. Atque ita tertio & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus includenda plaga. Posthæc eadem fila, eadēque acus ad cutem transferendae. Similique ratione ei quoque parti utraque sutura

injicienda, semper ab interiore parte acubus venientibus, semper inter manus traiectionis. Dein glutinantia injicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto impressam accedere debere manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impositis his leuiter deligari venter debet.

De interiore parte abdominis rupta, & qua ratione curanda sit.

CAP. XVII

Interdum tamen vel ex ictu aliquo, vel recedente spiritui, vel sub graui fasce interior abdominis membrana superiore cute integra, rumpitur. Quod feminis quoque ex utero saepe euenire consuevit, sitque praecipue circa ilia, sequitur autem cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecore intumescat. Atque id quoque aliter ab alijs curatur. Quidam enim per acuum duobus lineis ad imam basin immixtis, sis utrinque deuinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in vna positum est, ut quicquid super vinculum est, emoriatur: quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacci folij, quod semper eodem modo seruandum esse iam posui, & cum oras sutura iungunt. Commodissimum est autem resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est ea parte rupta membrana sit, quaeque integra est, ea magis obnitatur, tunc qua rupta videbitur, immittenda scalpello * duae tunicae sunt, ut exciso medio interiore membrana utrinque recedentem plagam habeat, quia quod vetus est,

est, futura non coit, loco patefacto. Si qua pars e membrana non nouam plagam, sed veterē habet, tenuis excidenda habena est, qua tantum ora eius exulceret. Cetera, qua ad futura reliquam curationem pertinent, suprā comprehensa sunt.

De varicibus ventris.

PRater hac evenit, ut in quorundam ventribus varices sint, quarum quia nulla alia curatio est, quam quę in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc quoq; eò differo.

De Testiculorum natura, & morbis eorum.

CAP. XVIII.

Venio autem ad ea, qua in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent, qua quoque facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam medullis habent. Nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent. Dolent autem in ictibus & inflammationibus tunica, quibus hi continentur. Dependunt verò ab inguinib. per singulos nervos, quas κρυματῖδες Graci nominant, cum quorum utroq; bina descendunt & vena & arteria. Hę autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, qua * ἐγυρτος Δις à Gracis nominatur: super eam valentior tunica est, qua interiori vehementer ima parte inhaeret, Darton Graci vocant. Multa deinde membranula venas & arterias, eosq; nervos comprehendunt. Atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus

* ἐλαφρὸς
αΔις.

Scrotum.

bus leues, paruuleq; sunt. Haftenus propria utriq;
 testiculo & velamenta & auxilia sunt. Cōmunis
 deinde utriq; , omnibusq; interioribus sinus
 est, qui iā conspicitur à nobis, δοχεὶν Græci, scro-
 tum nostri vocāt, isq; ab ima parte medijs tunicis
 leniter innexus est, à superiore tantum circūda-
 tus est. Sub hoc igitur plura vitia esse consue-
 runt. Quæ modo ruptis tunicis, quas ab inguini-
 bus incipere proposui, modò his integris fiunt. Si-
 quidem interdum vel ex morbo primum inflam-
 matur, deinde postea pendere abruptitur, vel ex
 ictu aliquo protinus rumpitur tunica, quæ didu-
 cere ab inferioribus partibus intestina debuit,
 tum pondere cò deuoluitur, aut omentū, aut etiā
 intestinū. Atq; ibi reperta via, paulatim ab in-
 * nisum guinibus in inferiores quoq; partes * demissum,
 subinde nervosas tunicas, & ob id eius rei patien-
 tes diducit, ἵνα πονήσῃ & ἱκτερονήσῃ Græci
 Hernia. vocāt, apud nos indecorū, sed commune his Herniæ
 nomen est. Deinde, si descendit omentū, nun-
 quam in scroto tumor tollitur, siue inedia fuit,
 siue corpus huc illucve cōuersum, aut aliquo mo-
 do collocatum. Itemq; si retentus est spiritus, non
 magnopere increscit, tactu verò inæqualis est, &
 mollis, & lubricus. At si intestinū quoq; descen-
 dit, * humor is sine inflammatione modò manuitur,
 is modò increscit. Estq; serè sine dolore, & cum con-
 quiescit aliquis, aut iacet, interdū extoto desidit,
 interdū sic diuiditur, ut in scroto exigua reliqua
 manet

maneat. At si clamore & satietate, & si sub
 aliquo pondere is homo nixus est, crescit, frigore
 omni contrahitur, calore diffunditur. Estq; tum
 scrotū & rotūdum, & taētū leue, idq; quod sub-
 est, lubricū est: si pressum est, ad inguen reuer-
 titur, dimissumq; iterum cum quodā quasi mur-
 mure deuoluitur. Et id quidē in leuioribus malis
 cernit. Nonnūquam autem stercore accepto va-
 sius tumet, retroq; cōpelli non potest: adfert tum
 dolorem & scroto, & inguinibus, & abdomini:
 nonnunquam stomachus quoq; afficitur, primum
 ruffam bilem per os reddit, deinde viridem, qui-
 busdam etiam nigram. Integris verò membranis
 interdū eam partem humor distringit. Atq; eius
 quoq; species duæ sunt. Nam vel inter tunicas is
 inrescit, vel in mēbranis, quæ ibi circa venas &
 arterias sunt, ubi hæ granata occaluerunt. Ac ne
 ei quidem humori, qui inter tunicas est, vna se-
 des est. Nam modo inter summam & mediam,
 modo inter mediā & imā consistit. Græci com-
 muni nomine quicquid est, ὑδρὸν κατὰ κατὰ appellant:
 nostri ut scilicet nullis discriminibus satis cogni-
 tis, hoc quoq; sub eodem nomine, quo priora ha-
 bēt. Signa autem quedam communia sunt, que-
 dam propria. Communia, quibus humor depre-
 henditur. Propria, quibus locis humorem subesse
 dicimus: si tumor est, nunquam ex toto se remit-
 tens, sed interdum lenior, aut propter fūnem, aut
 propter febriculā, maximēq; in pueris, isq; moris
est,

est, si non nimius humor subest. At si is vehementer increvit, renititur sic, ut vter repletus, & artastrictus. Vena quoque in scroto inflatur, & si digito pressimus, cedit humor, circumfluensque id quod non premitur, attollit, & tanquam in vitro cernuere per scrotum apparet, isque (quantum in ipso est) sine dolore est. Sedes autem eius sic deprehenditur. Si inter summam mediamque tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertens subit, scrotum ipsius albidum est. Si ducitur, aut nihil, aut parvulum intenditur, testiculus ea parte neque visu, neque tactu sentitur. At si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo, ut superior coles sub tumore eo dilitescat. Præter hæc aque integris tunicis ramex innascitur κισσονόχων Græci appellant, cum vena intumescunt. Hæ quoque intorta conglomerataque ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel mediâ tunicam, vel imam. Interdum etiâ sub ima tunica circa ipsum testiculû neruûque eius increscunt. Ex his ea quæ in ipso scroto sunt, oculis patent: hæ verò quæ mediæ imæve tunica insident, ut magis condita, non aquè quidè cernuntur, sed tamen etiam visui subiecta sunt, præterquam quod & tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine & modo: & id præmenti magis renititur, ac per ipsos venarum toros inaequale est. & qua parte id est, testiculus magis insto depædet. Cum verò etiam super ipsum testiculû neruûque eius,

rius, id malum increvit, aliquanto longius testiculus ipse descēdit, minorq; altero fit, ut pote alimento amisso. Raro, sed aliquando caro quoq; inter tunicas increvit, *σαρκονήκων* Græci vocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoq; adfert, & nisi celeriter ea inflammatio cōquieuit, dolor ad inguina atq; illa pervenit, partesq; hæ intumescunt: neruus ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulq; indurefcit: super hæc inguen quoq; nonnunquam varices implent, *ὕδρωρονήκων* appellant.

De testiculorum curationibus communibus, & primò de incisione & curatione inguinis, vel scroti.

CAP. XIX.

His cognitis, de curatione dicendum est, in qua quadam cōmunia omnium sunt, quadam propria singulorū. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant. Nam quæ vel sanari non possint, vel aliter nutrirī debeant, dicendum erit, simul ad species singulas venero. Inciditur autē interdum inguen, interdum scrotum. In utraq; curatione, homo ante triduum bibere aquam, pridie abstinere etiam à cibo debet, ipso autem die collocari supinus: deinde si inguen incidendū est, idq; iam pube contegitur, autē radendum est, & tum extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, quæ cum abdomine tunica inferiores committuntur. Aperiendum au-

tē audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius
 scroti est, incidatur, perueniaturq; ad eam, quæ
 media est plaga facta. Foramen deorsum versus
 subest. In id demittendus est sinistra manus di-
 gitus index, ut diductis interuenientibus mem-
 branulis simul laxet. Minister autē sinistra ma-
 nu comprehenso scroto, sursum versus eum debet
 extendere, & quam maximè ab inguinibus ab-
 ducere: primum cum ipso testiculo, dum medicus
 omnes membranulas, quæ super mediā tunicam
 sunt, si digito deducere nō potest, scalpello abscin-
 dat. Deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plaga in-
 gatur, digitoq; inde promatur, & super ventrem
 cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si quæ
 vitiosa sunt, circumcidenda sunt. In quibus cum
 multa vena discurrat, tenuiores quidem præcidi
 protinus possunt: maiores verò antè longiore lino
 deliganda sunt, ne periculose sanguinem fundat.
 Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum
 increuerit, excidenda erit, sic, ut alte ad ipsum in-
 guen præcidatur. Infr. tamen non tota demenda
 est. Quia quod ad basim testiculi vehementer cum
 ima tunica connexum est, excidi sine summo pe-
 riculo non potest. Itaq; ibi relinquendum est. Idem
 in ima quoq; tunica, si lasa est, faciendum est. Sed
 non à summa inguinis plaga, verum infra pau-
 lum ea abscindenda, ne lasa abdominis membrana
 inflammationes moueat. Neq; tamen nimium ex
 as sursum relinquendum est, ne postea sinuetur,
 & se

& sedem eidem malo præstet. Purgatus ita testi-
 culus per ipsam plagam, cum venis & arterijs,
 & nervo suo leuiter demittendus est, videndūq;
 ut sanguis in scrotum descendat, néve concretus
 aliquo loco maneat. Quæ ita fient, si venis vin-
 cendo medicus prospexerit: lina quibus capita
 tarum continebuntur, extra plagam dependere
 debebunt, quæ pure orto sine ullo dolore excidēt.
 Ipsi autem plaga iniicienda duæ fibulae sunt, &
 super medicamentum quo glutinentur. Soler
 interdum ab altera ora necessarium esse aliquid
 excidi, ut cicatrix maior & latior fiat. Quod
 ubi incidit, linamenta super non folcienda, sed
 leuiter tantum ponenda sunt, supraq; ea quæ in-
 flammationem repellunt, id est, ex aceto vel lana
 succida vel spongia. Cætera eadem quæ ubi pus
 moueri debet, adhibenda sunt. At cum infra
 excidi oportet, resupinato homine subiicienda
 sub scroto sinistra manus est, deinde id vehemē-
 ter apprehendendum, & incidendū. Si parvulum
 est quod nocet, modice, ut tertia pars integra ad
 sustinendum testiculum infra relinquatur. Si
 maius est, etiam amplius, ut paulum tantummo-
 do ad imū, cui testiculus insidere possit, integrū
 maneat. Sed primo rectus si alpellus, quam leuif-
 sima manu teneri debet, donec scrotū ipsum di-
 ducat. Tum inclinandus muco est, ut transversa
 membrana secet, quæ inter summam mediamq; tu-
 nicam sunt. At si vitium in proximo est, mediam
 tunicam

tunicam attingi non oportet. Si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est, sic ut tertia quoque, si illa vitium tegit. Ubique; repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet, medicum digito, manubrio, vel scalpello diductam inferiorem partem tunica extra collocare: deinde eam ferramento, quod ad similitudinem curuum vocant, incidere, sic ut in eadem intrare duo digiti, index & medius possint. His deinde coniectis, excipienda reliqua pars tunica, & inter digitos scalpellus immittendus est, eximendumque; aut effundendum quicquid est noxium. Quancumque; autem tunicam quis violavit, illam quoque; debet excidere, ac mediam quidem (ut supra dixi) quam altissime ab inguine, immo autem paulo infra. Caterum antequam excidantur, hæ quoque; vinciri lino summe debent, & eius lini capita extra plagam relinquenda sunt, sicut in alijs quoque; venis, quæ id requisierint. Eo facto testiculus intus reponendus est, oraque; scroti suturis inter se committenda, neque; paucis, ne parum glutinetur, & longior fiat curatio, neque; multis, ne inflammationem augeant. Atque; hic quoque; videndum est, ne quid in scroto sanguinis maneat. Tum imponenda glutinantia sunt. Si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidve concretum ex eo decidit, incidi subter id debet, purgatoque; co spongia acri aceto madens circumdari. Deligatur autem vulnus omne, quod ex his causis factum est.

Si dolor nullus est, quinque primis diebus non est
 resoluendum, sed bis die tantum aceto irroranda
 lana vel spongia. Si dolor est, tertia die resoluen-
 dum, & ubi fibulae sunt, haec incidenda, ubi lina-
 mentum, id mutandum est: rosaque & vino ma-
 d-faciendum id, quod imponitur. Si inflammatio
 increfcit, adijciendum prioribus cataplasma ex
 lenticula & melle, vel ex malicorio, quod in auste-
 ro vino coctum sit, vel ex his mistis. Si sub his in-
 flammatio non conquirit, post diem quintum
 multa calida aqua vulnus fovendum, donec scrotum
 ipsum & extenuetur, & rugosius fiat. Tum im-
 ponendum cataplasma ex triticea farina, cui re-
 sina pinea adiecta sit. Quae ipsa, si robustus cura-
 tur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt.
 Neque dubium est, quodcumque initium fuit, si ma-
 gna inflammatio est, quin ea, quae pus movet, im-
 ponenda sint. Quod si pus in ipso scroto ortum est,
 paulum id incidi debet, ut exitus detur. Linamen-
 tumque eatenus imponendum est, ut foramen tegat.
 Inflammatione finita, propter nervos priore ca-
 taplasmate, dein cerato utendum est. Hac proprie
 ad eiusmodi vulnera pertinent. Cetera & in cu-
 ratione, & in victu similia his esse debent, quae
 in alio quoque vulnere genere praecipimus.

De Intestini curatione.

CAP. XX.

His propositis ad singulas species venien-
 dum est, ac si cui parvulo puero intestinum
 descendit ante scalpellum expedienda immittitur est.

Fascia

Fascia eius rei causa fit, cui imo loco pila affuta est ex panniculis fricta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subijcitur, deinde reliqua fascia pars arte circumdatur, sub quo sepe & intus compellitur intestinum, & inter se tunica glutinantur. Rursus si atas processit, multumq; intestini descendisse ex tumore magno patet, adijciunturq; dolor & vomitus, quæ ex stercore, & ex cruditate eò delapso ferè accidunt, scalpellum adhiberi sine perniciæ non posse manifestum est. Levandum tantummodo malum, & per alias curationes extrahendum est. Sanguis mitti ex brachio debet, deinde, si vires patiuntur, imperanda tridui abstinencia est: si minus, certe pro vi corporis quam longissime. Eadem verò tempore super habendum cataplasma ex lini semine, quod antè aliquis ex mulso decoxerit. Post hac & farina bordeacea cum resina inijcienda, & is demittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoq; adiectum sit, dandumq; aliquid cibi lenis calidi. Quidam etiam alium ducunt. Id ducere aliquid in sicrotum potest, educere ex eo non potest. Per ea verò, quæ superscripta sunt, levato malo, si quando aliàs dolor reuerterit, eadem erunt facienda. Sine dolore quoq; si multa intestina prolapsa sunt, secari superuacuum est, non quòd excludi à sicroto non possint, nisi tamè id inflammatio prohibuit, sed quòd repulsa inguinibus immorentur, ibiq; tumorem excitet, atq; ita fiat mali non finis, sed mutatio.

At in eo quem scalpello curari oportebit, simul-
etq; ad mediam tunicam vulnus in inguine fa-
ctum pervenerit, duobus hamulis ea iuxta ipsas
cras apprehendi debet, dum eductis omnibus
membranulis medicus eam liberat. Neq; enim cum
periculo leditur, quæ excidenda est, cum intesti-
num esse nisi sub ea non possit. Vbi deducta au-
tem erit, ab inguine usq; ad testiculum incidi de-
bet, sic, ne ipse ladataur, tum excidi. Ferè tamen
hanc curationem puerilis ætas, & modicum ma-
lum recipit. Si vir robustus est, maiusq; id vi-
tium est, extrahi testiculus non debet, sed in sua
sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem
ratione usq; ad mediam tunicam scalpello aperi-
tur, eaq; tunica eodem modo duobus hamis exci-
piitur, sic ut à ministro testiculus eatenus conti-
neatur, ne per vulnus exeat: tum ea tunica deor-
sum versus scalpello inciditur, sub eaq; index di-
gitus sinistrae manus ad imum testiculum demit-
titur, eumq; ad plagam compellit. Deinde de-
xtrae manus duo digiti pollex atq; index, venam
& arteriam & nervum, tunicamq; eorum à su-
periore tunica diducunt. Quod si aliqua mem-
branula prohibent, scalpello resolvuntur, donec
ante oculos tota iam tunica sit. Excisis quæ exci-
denda sunt, repositoq; testiculo, ab ora quoq; eius
vulneris, quod in inguine est: demenda habenu-
la paulo latior est, quo maior plaga sit, & plus
creare carnis possit.

AT si omentum descendit, eodē quidem modo, quo suprà scriptum est, aperiendū inguen, diducēdāq; tunica sunt. Considerandū autem est, maiōrne is modus, an exiguus sit. Nam quod parvulum est, super inguen in alvū vel digito vel auerso specillo repeliendum est. Si plus est, sinere oportet dependere, quantum ex viro prolapsum est, idq; adurētibus medicamentis illinere, donec emoriatur & exidat. Quidā hic quoq; duo linea acn traieciunt, binisq; singulorū capitibus diversas partes astringunt. Sub quo aque, sed tardius emoriatur. Adicitur tamē hic quoq; celeritati, si omentum super vinculum illinitur medicamētis quæ sic exedūt, ne erodant, *αλυσια* Græci vocant. Fuerunt etiam qui omentum forsice præciderent, quod in parvulo non est necessarium. Si maius est, potest professionem sanguinis facere. Siquidem omētum quoq; venis quibādam etiam maioribus illigatu est. Neq; verò si diu cisso ventre id prolapsum forsice præciditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius auelli non possit, inde hoc exemplum transfrendum est. Videri autem curari, si relictum omētum est, sutura acbet. Si ad amplius fuit, & extrā emortuum est, excisis oris, sicut suprà propositum est. Si verò humor intus est, incidendum est, in pueris quidē inguē, nisi in his quoq; liquoris eius maior *μωμος* prohibet; in viris verò & ubicūq; multus humor subest.

* *αλυσια*.

subest, scrotum. Deinde si inguem incisum est, eò protractis tunicis humor effundi debet. Si scrotū, & sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quàm humor est effundendus, abscindendæq; membranae sunt, si quæ cum continuerunt: deinde eluendum id ex aqua, quæ vel salem adiectum, vel nitram habeat: si sub media, imò ve tunica, tota haec extra scrotum collocanda, excidendæq; sunt.

De Ramicis curatione. CAP. XXII.

Ramex autem, si super ipsum scrotum est, radrendus est tenuibus & acutis ferramentis, quæ ipsis venis insigantur, cum eo ne amplius quàm has urant, maximeq; ubi inter se implicatae glomerantur, eo ferrum id admouendum est, tū super farina ex aqua frigida subacta inyciēda est, vitendumq; eo vinculo, quod idoneum esse an curationibus posui. Tertio die lenticula cum melle imponēda est, post eiectis crustis ulcera melle purganda, rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. Quibus verò super mediam tunicam vena tument, incidendum inueni est, atq; tunica promouenda, ab eaq; vena digito vel manubriolo scalpelli separāda. Quæ parte vetero inhaerebūt, & ab superiore & ab inferiore parte lino vincienda, tū sub ipsis vinculis præcidēda, reponendusq; testiculus est. At ubi supra tertiam tunicā ramex insedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si dua tresve vena tumēt, & ita pars aliqua obsideatur, ut maiore vitio vacet, idē faciendum

dum quod supra scriptum est, ut ab inguine & a testiculo deligata vena praeceidantur, isq; cōditur. Sin totum id ramex obsederit, per plagā demittendus digitus index erit, subijciendusq; venis, sic ut paulatim protrahat eque adducendo, donec is testiculus par alteri fiat. Tū fibula oris sic vincienda, ut simul eas quoq; venas comprehendant. Id hoc modo fit: Acus ab exteriori parte oris vulneris perforat. Tum non per ipsam venam, sed per membranam eius immittitur, per eamq; in alteram oram compellitur. Vena vulnerari non debent, ut sanguinem fundant. Membrana semper inter has venas est, ac neq; periculū affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. Itaq; etiā satis est, duas fibulas esse: tum venae quacunq; protrahē sunt ipsum inguē, aduerso specillo comprehendenti debent: soluendi fibulas tempus inflammatione finita & purgato vulnere est, * ut una simul & oras & venas cicatrix denunciat. Vbi veri inter imam tunicā & ipsum testiculum utrumq; ramex ortus est, una curatio est, quae totum testiculum abscindit. Nam neq; ad generationē quicquam is confert, & omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguē incidendum, media tunica promenda, atq; excidenda est, idem in ima faciendum, nervusq; ex quo testiculus dependet, praecidendus. Post id vena & arteria ad inguē lino deliganda, & infra vinculum abscindenda sunt.

De Carne quæ inter tunicas testiculorum concrevit, & de nervo indurato. CAP. XXIII.

Caro quoq; si quando inter tunicas concretuit, nihil dubij est; quin eximenda sit, sed id ipso scroto inciso fieri commodius est. At si nervus induruit, curari res neq; manu neq; medicamento potest. Urgent enim febres ardentes, & aures virides aut nigri vomitus: præter hæc ingens sitis, & lingua aspritudo, sæpeq; à die tertio spumans bibis duo cum rosione redditur. Atq; neque assumi facile cibus, neq; contineri potest, neque multa post extrema partes frigescent, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur, deinde in fronte frigidus sudor, eumq; mors sequitur.

De tamice inguinis. CAP. XXIII.

Vbi verò in ipso in puine ramex est, si tumor modicus est, semel incidi: si maior duobus lineis debet, ut medianum excidatur: deinde non extracto testiculo, sicut intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui, colligenda vena vinciendaq; ubi tunicis inhærebunt, & sub his nodis præcidenda sunt. Neq; quicquam novi curationis vulneris eius requirit.

Ad tegendam glandem colæ, si nuda est.

CAP. XXV.

Ab his ad ea transcendendum est, quæ in cole ipso sunt, in quo si glans nuda est, vultq; aliquis eam decoris causa regere, fieri potest, sed expeditius in puero quàm in viro. In eo cui id naturale est, quàm in eo, qui quarundam gentium

more circumcissus est. In eo cui glans parua iuxtaq; eam cutis, spatiosior verò ipse coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, quibus id naturale est, eiusmodi est: Cutis circa glandem apprehenditur & extenditur, donec illam ipsam condat, ibiq; deligatur. Deinde iuxta pubem in orbem tergitur inciditur, donec coles nudetur, magnaq; cura cauetur ne vel urina iter, vel vena, quæ ibi sunt, incidantur. Eo facto cutis ad vinculum inclinatur, nudaturq; circa pubem velut circulus, eoq; linamenta dantur, ut citro increseat & id impleat, satisq; velamenti supra latitudo plaga præstat. Sed donec cicatrix sit, vinctum esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. At in eo qui circumcissus est, sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab interiore cole est. Non ita dolet, quia summo soluto, deduci deorsum usque ad pubem manu potest. Neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem. Tum multa frigida aqua fouetur, emplastrumq; circa datur, quod valentem inflammationem reprimat, proximiq; diebus ut prope à fame victus est, ne forte eam partem satietas excitet. Vbi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube usque circulum. Super glandem eam aduerso emplastro imposito induci. Sic enim fit, ut inferior pars glutinetur, superior ita sanescat, ne inbareat.

Quomodo glans penis contracta aperiri possit.

Contra si glans ita contracta est, ut nudari non possit, quod vitium Græci *φύμωσις* appellant, aperienda est. Quod hoc modo fit: Subter à summa ora cutis inciditur recta linea usque ad frænum, atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est, sic ut vertex eius ad frænum basis in tergo extremo sit. Tum superdanda linamenta sunt, aliâq; medicamenta quæ ad sanitatem perducant. Necessarium autem est donec cicatrix sit conquiescere. Nam ambulatio attendendo ulcus sordidum reddit.

Infibulandi ratio.

Infibulare quoq; adolescentulos interdum vocis, interdum valetudinis causa quidam consuevit. Eiusq; hæc ratio est. Cutis quæ super glandem est extenditur, notaturq; utrinque à lateribus atramento quæ perforatur, deinde remittitur. Si super glandem nota reuertuntur, nimis apprehensum est, & ultra notari debet. Si glans ab his libera est, is locus idoneus fibula est. Tum quæ nota sunt, cutis acu filum ducente transiit, eiusq; filii capita inter se deligantur, quotidieq; id mouetur, donec circa foramina cicatricule fiant. Ubi hæc confirmata, exempto filo fibula additur, quæ quo melior, eo lenior est. Sed hoc quidem sæpius inter

superuacua, quàm inter necessaria est.

De viuz reddendæ difficultate, & de Calculo, rationibusq; eorum.

CAP. XXVI.

REs verò interdum cogit emolliiri manu viri-
nam, cum illa non redditur, aut quia sen-
tute iter eius collapsum est, aut quia calculus,
vel concretum aliquid ex sanguine intus se op-
posuit. At mediocris quoque inflammatio sepe
eam reddi naturaliter prohibet. Idq; non in vi-
ris tantummodo, sed in fœminis quoq; interdum
necessarium est. Ergo aenea fistulae sunt, quae et
omni corpori ampliori minoriq; sufficiant, ad ma-
res tres, ad fœminas duae medico habende sunt.
Ex virilibus maxima decem & quinque est di-
gitorum: media, duodecim: minima, nonem. Ex
muliebribus, maior nonem: minor, sex. Incutias
verò esse eas paulum, sed magis viriles oportet,
lenesq; admodum: ac neque nimis plenas, neq; ni-
mis tennes. Homo tum resupinus, comodo quo in-
curatione ani figuratur, super subsellium aut le-
tulum collocandus est. Medicus autem à dextera
latere sinistra quidem manu coleni masculi con-
tinere, dextera verò fistulam demittere in iter
urinae debet. Atq; ubi ad cervice vesicae ven-
tum est, simul cum cole fistulam inclinatam in
ipsam vesicam compellere, eamq; urinae reddita
recipere. Fœmina brevius urinae similiter &
rectius iter habet, quod mamulae simile inter-
imas oras super naturale positum, non minus sepe
auxil

auxilio eget, aliquando minus difficultatis existit. Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhærescit. Eum si fieri potest, oportet vellere, vel oriculario specillo, vel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema quam plurimum attrahenda, & condita glande lino vincienda est, deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est, tum cutis remittenda. Sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & urina naturaliter profluat.

Quæ curatio calculosis adhibeatur.

Cum vesica verò calculi; facta mētio sit, locus ipse exigere videtur, ut subiiciā, quæ curatio calculosis, cū aliter succurri nō potest, adhibeatur. Ad quam festinare, cum præceptum sit, nullo modo convenit: ac neq; omni tēpore, neq; in omni ætate, neq; in omni vitio id experiendū est, sed solo vere, in eo corpore, quod iam nonem annos, nōdum quatuordecim excessit, & si tantum mali subest, ut neq; medicamētis vinci possit, neq; etiā trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo nō interdū etiam temeraria medicina proficiat, sed quo sapius utiq; in hoc fallat, in quo plura & genera & tēpora periculi sunt. Quæ simul cū ipsa curatione proponā. igitur ubi ultima experiri statutum est, antè aliquos dies victu corpus preparandū est, ut modi-

cos, ut salubres cibos, et minime glutinosos assumat, ut aquam libet. Ambulandi verò inter has exercitatione utatur, quo magis calculus ad vesicæ cervicem descendat. Quod an inciderit, digiti quoque, sicut in curatione docebo, demissus cognoscitur. Ubi eius rei fides est, pridie is puer in iunio continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda, qua hoc modo ordinatur: Homo prudens & peritus in sedili alto confidit, supinumque, cum & aduersum super genua sua coxis eius collocatus comprehendit, reducliusque eius cruribus, ipsum quoque iubet manibus ad suos poplites datis eos quam maxime possit attrahere, simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo valentes insidunt, quo & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atque alter prorsus cõsedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Siue autem unus, siue duo continent, super humeros eius suis pectoribus incumbunt. Ex quibus evenit, ut inter illa sinus super pubem sine ullis rugis sit extensus, & in angustum cõpulsæ vesicæ, facilius calculus capi possit. Præter hac etiamnum à lateribus duo valentes obijciuntur, qui circumstantes lenare vel unum vel duos, qui puerum continent, non solum. Medici deinde diligenter unguibus circummissi, atque sinistra manu duos eius digitos, inducunt & mecum leniter

leniter prius unū, deinde alterum in anum eius demittit, dextraq; digitos super imum abdomen leniter imponit, ne si utrinq; digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam ledant. Neq; verò sistinenter in hac re, ut in plerisq; agendum est, sed ita, ut quammaxime id tuto fiat. Nā lesa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. At primum circa cervicem queritur calculus. Ibi repertus minore negotio expellitur. Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc indicijs suis cognitum est. Si verò aut ibi non sit, aut recessit retro, digiti ad ultimam vesicam dantur, paulatiniq; dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur. Atque ubi repertus est calculus, qui necesse est in manus incidat, eo curiosius deducitur, quo minor leviorq; est, ne effugiat, id est, ne saepius agitanda vesica sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus eius opponitur, sinistra digiti deorsum cum compellunt, donec ad cervicem pervenitur. In quam si oblongus est, sic cōpellendus est, ut pronus exeat: si planus, sic, ut transversus sit: si quadratus, ut duobus angulis sedeat: si altera parte plenior, sic ut prius ea, qua tenuior sit, euadat. In rotundo nihil interesse ex ipsa figura patet, nisi si levior altera parte est, ut ea antecederet. Cū iam eò venerit, ut incidi super vesica cervicem iuxta anum cutis plaga lunata usque ad cervicem vesica debeat, cornibus ad coxas spectantibus paulum, de-

supra proposui. Ubi scitis teneri calculum patet,
 eodem penè memento triplex motus adhibendus
 est, in utrumq; latus, deinde extra, sic tamen, ut le-
 uiter id fiat, pauluq; primo calculus attrahatur:
 quo facto, attollendus uncus extremus est, ut in-
 tus magis maneat, faciliusq; illū producat. Quod
 si aliquando a superiore parte calculus parū con-
 tempe comprehendatur, à latere erit apprehen-
 dendus. Hac est simplicissima curatio. Sed varie-
 tas rerum quasdam etiamnum animadversiones
 desiderat. Sunt enim quidam non esperi tantum-
 modo, sed spinosi quoq; calculi, qui per se quidem
 de latere in cernicem, sine ullo periculo eximuntur.
 In vesica verò non tuto vel hi conquiruntur, vel
 attrahuntur, quoniam ubi illum conuulnerarūt,
 ex diuturne retentione nervorum mortem maturant: mul-
 tiq; magis, si spina aliqua vesicæ inhaeret, eamq;
 cum euceretur, duplicauit. Colligitur autem eo,
 quod difficilius urina redditur, in cernice calcu-
 lum esse: eo quod cruenta destillat, illum esse spi-
 nosum, maximeq; id sub digitis quoq; experien-
 dum si, neq; adhibenda manus, nisi id constiterit.
 Accur quoq; leniter intus digiti obyciendi, ne vio-
 lenter promouendo conuulnerent, tum incidendū.
 Alii hic quoq; scalpello vsi sunt. Meges (quo-
 niam is infirmus est, potestq; in aliqua prominentia
 incidere, inciseq; super illum corpore, quæ cauum
 sub se, non secare, sed relinquere, quod iterum in-
 cidi necesse sit) serratamentum sicut rectum, in sum-
 ma

ma parte labrosum, in ima semicirculatum ac-
tumq; . Id receptum inter duos digitos indicem,
ac medium super pollice imposito sic deprimibat,
ut simul cum carne, si quid ex calculo promine-
bat, incideret. Quo cum sequebatur, ut sem-
quantum satis esset, aperiret. Quocumque autem
modo cervix ea parte facta est, leniter extrahi,
quod asperum est, debet, nulla propter sistimatio-
nem vi admota.

Signa calculorum, vel arenosorum,
vel mollium.

AT calculus arenosus, & antè manifestus
est, quoniam & urinae quae redditur, are-
nosa est. & in ipsa curatione, quoniam inter sub-
iectos digitos inq; aequè leniter renititur, & in-
super dilatatur. Item mollis calculus, & ex plu-
ribus minutisq; , sed inter se perum strictis com-
positus indicatur, in se attritens quosdam quasi
squamulas. Hos omnes leniter permutatis subin-
de digitorum vicibus sic oportet abducere, ne re-
siccant, laedant, nève intus aliqua dissipata reli-
quia maneat, quae postmodum curationi obsta-
culum facient. Quicquid autem ex his in cen-
spectum venit, vel digitis vel unco eximendum
est. At si plures calculi sunt, singuli protrahi de-
bent, sic tamen, ut si quis ex uno superavit, re-
tius relinquatur. Si quidem in v. sua d. m. alter
invenitur, inventusq; , citius efficitur. Ita longa
inpositione vesica laeditur, ex. itaq; inflammationes

iones mortiferas, adeo ut quidam scēti, cum diu
frāstrāq; per digitos vesica esset agitata, decesse-
runt. Quibus accedit etiā quēd exiguus calculus,
ad plagā vrina postea promonēte, excidit. Si quā-
do autem is maior, non videtur, nisi rupta ceruice
extrahi posse, findēdus est. Cuius repertor Animo-
sius, ob id Lithotomos cognominatus est. Id hoc
modo fit. Vncus iniicitur calculo, sic ut facile eum
percussum quoq; teneat, ne is retro reuoluatur.
Tū firramētū adhibetur crassitudinis modice,
in una parte tenni, sed retusa, quod admotū calcu-
lo ex altera parte illum findit: magna cura ha-
benda, ne aut ad ipsam vesicam per firramētum
perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

De Calculis forminarum.

HÆ verò curationes in sēminis quoq; si-
miles sunt, de quibus tamen parum pro-
ut quaedam dicenda sunt. Siquidem in his ubi
calculus est, scalpellus superuacuus est,
quia is urinam in ceruicem non compellit, quæ &
laxior, quā in maribus, & laxior est. Ergo &
sepe excidit, & si in primo quod est angu-
sto in latet, eodem tamen vncō sine ulla noxa
extrahitur. At in maribus calculis necessaria ea-
dem ratio est. Sed virgini subijci digiti tanquā
mulieri per naturalia eius debent. Tum
quidā sub una sinisteriore ora. Mulieri
inter crurā iter & os pubis incidendum est,
in utroq; loco sicut latus transversa sit: neq; terreri
conu


conuenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis
profluit.

Quæ curatio calenlo euulso habenda sit.

Calenlo euulso, si valens corpus est, neq; ma-
gnopere vexatum, sinere oportet sanguinem
fluere, quo minor inflammatio oriatur. Atq; in-
gredi quoq; cum paulum non alienum est, et exci-
dat, si quid intus concreti san- uinis mansit. Quid
si per se non destitit, rursus ne vis omnis intreat,
supprimi debet. Idq; protinus in imbecillioribus
ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem ex di-
ssentione neruorum periclitatur aliquis, dum ve-
sica eius agitur: sic alter metus excipitur remediis
medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat et
occidat. Quod ne incidat, desidere is debet in aceto
acutum, cui aliquantū salis sit adiectum. Sub quo
& sanguis se se conquiescit, & astringitur vesica,
ideoq; minus inflammatur. Quod si parum pro-
ficiat, agglutinanda cucurbitula est & inguinibus
& coxis, & super pubem. Vbi iam satis veluo-
catus est sanguis, vel prohibitus, resupinus colo-
candus est, sic ut caput humile sit, coxæ paulu ex-
citantur: ac super vlcus imponendum est duplex
aut triplex lintecolum, aceto madens. Deinde in-
terpositis duabus horis in solium is aqua calida
resupinus demittendus est, sic, ut a genibus ad
umbilicum aqua teneat, cætera vestimenta ex-
cundata sint, manibus tantummodo pedibusq;
nudatis, ut & minus digeratur, & ibi ducatur
m.

maneat. Ex quo sudor multus oriri solet, qui spon-
 gia subinde facile detergendus est, finisq; eius so-
 menti est, donec infirmando offendat. Tum multo
 in oleo perungendus, inducendusq; * hapsus lana
 mollis, tepido oleo repletus, qui pubem et coxas &
 inguina, & plagam ipsam contestum eodem, ante
 se linteolo protegat, isq; subinde oleo tepido m-ide
 faciendus est, ut neq; frigus ad vesicam admittat,
 & nervos leniter molliat. Quidam cataplasma-
 tis calefacientibus utuntur. Ea plus pondere no-
 cent, quæ vesicam urgendo vulnus irritat, quàm
 calore proficiunt. Ergo ne vinculum quidem vl-
 lam necessarium est. Proximo die, si spiritus diffi-
 culter redditur, si urina non excedit, si locus circa
 pubem mature intumuit, scire licet in vesica san-
 guinem concretum remansisse. Igitur demissis eo-
 dem modo digitis leniter pertractanda vesica est,
 & discutienda si qua coierunt. Quo fit, ut per vul-
 nus postea procedant. Non alienum etiam est, ori-
 culario chylere acetum nitro mistum per plagam
 in vesicam compellere. Nam sic quoq; discutun-
 tur, si qua cruenta coierunt. Ea q; facere etiam pri-
 mo die convenit. Si timemus, ne quid intus sit,
 maximèq; ubi ambulando id elicere imbecillitas
 prohibuit, cætera eadem facienda sunt: ut demit-
 atur in solum, ut eodem modo panniculus
 eadem lana superiniiciatur. Sed neq; sæpe, neq; in-
 aqua calida puer habendus, quàm adoles-
 cens est: infirmus, quàm valens: levis, quàm gra-
 vis.

*Hapsus id
 Latinis di-
 ci videtur,
 Græcis
 ὡλῖμα,
 quod sui-
 dos expōit
 οὐλῖμα-
 μα, ἡ-σὺ-
 χιον: ὡλ-
 ρα, signifi-
 cat autem
 vel saccu-
 lus, crume-
 na, vel hu-
 iusmodi a-
 liquid, aut
 testorium,
 aut velamē
 aut cingri-
 lum, saccu-
 li, aut cru-
 menq; mo-
 do factum.



uiore inflammatione affectus : is cuius corpus dig-
geritur, quàm is cuius astrictum est. Inter hæc verò
si somnus est, & equalis spiritus, & madens lin-
gua, & sitis modica, & venter imus, sed & me-
diocris est cum febre modica dolor, si re licet recte
procedere curationem. Atque in his inflammatio febre
quinto vel septimo die finitur. Qua lenata, solum
superuacuum est. Supini tuncummodo vulnus
aqua calida fovendum est, ut si quid urina rodet,
abluatur. Imponenda autem medicamenta sunt
pus mouentia, & si purgandum vulnus videbitur
melle linendum. Id si rodet, rosa sepe rebitur. Huic
curationi aptissimum videtur Enneapharmacum
emplastrum. Nunc & serum habet ad pus mouen-
dum, & mel ad vulnus repurgandum : medulla
etiam maximeque vitulina, quod in id ne fistula
relinquatur, præcipue proficit. Linimenta verò
tum super vulnus non sunt necessaria, super medi-
camentum ad id continendum, recte imponuntur. At
ubi vulnus purgatum est, puro linamento ad cicat-
ricem perducendum est. Quibus temporibus tamen
si felix curatio non fuit, varia circa periculum oran-
tur. Quæ præscire protinus licet, si continua er-
gilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida
est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vul-
nus hiat, si * transiliens urina id non rodet, si
* trans- similiter ante tertium diem quadam limba ex-
uens . cidunt, si is aut nibi, aut tarde respondet, si ve-
bementes dolores sunt, si post diem quintum ma-
gna

ne fibres urgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem incūdus est. Nihil tamen prius est distentione nervorum, & antenatum diem vomitu bilis. Sed cum inflammationis fit metus, succurri abstinentia, modicis & tempestivis cibis, inter hac fomentis, de quibus supra scripsimus, oportet.

De cancro qui excisa vesica nascitur, & qua cura

ratione uti debeat.

CAP. XXVII.

Proximus canceri metus est: is cognoscitur, si & per vulnus, & per ipsum colem fluitans mali odoris, cumq; eo quādam à concreto sanguine non abhorrentia, tennesq; caruncula lanulis similes: præter hæc si ora vulneris arida sunt, si dolent inguina, si febris non defuit, eaq; in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est, in quam partem cancer is tendat. Si ad colem, indurescit is locus, & rubet, & tactu dolorem excitat, testiculiq; intumescunt. Si in ipsam vesicam, ani dolor sequitur, coxæ durescunt, non facile crura extendi possunt. At si in alterutrum latus, oculis id expostum est, paresq; utrinque easdem notas, sed minores habet. Primum autem ad rem pertinet, corpus recte iacere, ut superior pars semper eadem sit, in quam vitium fertur: ita si ad colem insuperius is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id quod integrum est. Deinde ubi ventum fuerit ad curationē, homo in aquam

demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut
 cupressus, aut myrtus, idemq; humor clystere intus
 adijciatur. Tum super ponetur lenticula cum ma-
 licorio mista, quæ utraq; ex vino decocta sint: vel
 rubus aut oleæ folia, eodem modo decocta, aliq;
 medicamenta, quæ ad cohibendos purgandosq;
 caneros proposuimus, ex quibus, si quæ erunt ari-
 da, per scriptorium calammum inspirabuntur. Vbi
 stare cæperit cancer, nullo vulnus elucetur. Vita-
 biturq; eo tempore ceratum, quod ad recipiendum
 id malum corpus euollit, potius plumbum elatum
 cum vino inungetur, superq; idem lincolo illi-
 tum imponetur. Sub quibus perueniri ad sanita-
 tem potest, cum eo tamen quod non ignoremus,
 orto Cancro sæpe affici stomachum, cui cum vesica
 quoddam consortium est, exq; eo fieri, ut neq; re-
 tineatur cibus, neq; si quis retentus est, concoqua-
 tur, neq; corpus alatur: ideoq; ne vulnus quidem
 aut purgari, aut ali possit, quæ necessario morrem
 maturant: sed ut his succurri nullo modo potest,
 sic à primo tamē diu tenenda ratio curationis est.
 In qua quedam observatio ad cibum quoq; potio-
 nemq; pertinens uecessaria est. Nam cibus inter
 principia non nisi humidus dari debet. Vbi cibus
 purgatum est, ex media materia olera & salsa-
 menta semper aliena sunt. Potione opus est non
 modica. Nam si perum bibitur, accenditur vul-
 nus, & vigilia urget, & vis corporis minuitur.
 Si plus æquo assumitur, subinde vesica impletur,
 eoq;

eoq; irritatur. Non nisi aquam autem bibendam
 esse manifestius est, quam ut subinde dicendum
 sit. Solet verò sub eiusmodi victu venire, ut alius
 non reddatur. Hac aqua ducenda est, in qua vel
 sanum græcum vel malua decocta sit. Idem humor
 rosa mistus in ipsum vulnus oriculario clystere
 agendus est, ubi id rodit urina, neq; purgari pa-
 titur. Fere verò primo per vulnus exit hac, de-
 inde eo sanescente diuiditur, & pars per colū de-
 scendere incipit, donec ex toto plaga claudatur,
 quod interdum tertio mense, interdum non ante
 sextum, nonnunquam exacto quoq; anno sit. Neq;
 desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi
 ubi aut vehementer rupta cervix est, aut ex can-
 cro multa magnaq; carūcula, simulq; nervosa ali-
 qua exciderint. Sed ut vel nulla ibi fistula, vel
 exigua admodum reliquatur, summa cura pro-
 videndum est. Ergo cum iam ad cicatricem vul-
 nus *tendit extētis iacere feminibus, & cruribus *intendit
 oportet, nisi tamen molles, arenosæve calculi fue-
 rint. Sub his enim tardius vesica purgatur. Ideoq;
 diutius plagam patere necessarium est, & tum de-
 mum ubi iam nihil tale extrā fertur, ad cicatri-
 cem perducitur: quòd si antequam vesica purgata est,
 ora se glutinarunt, dolorq; & inflammatio re-
 dierunt, vulnus digitis vel aduerso specillo di-
 ducendum est, ut torquentibus exitus detur, hisq;
 effusis tum diutius pura urina descendat. Tum
 deniq; qua cicatricem inducant, imponenda sunt,

extendiq; , ut suprâ docui , pedes quàmmaxime
vincti. Quòd si fistula metus ex his causis , quar
proposui , subesse videbitur , quo facilius clauda-
tur ea , vel certe coangustetur , in anum quoq; dan-
da plumbea fistula est: extentisq; cruribus , fîmina
taliq; inter se deliganda sunt , donec qualis sutura
est , cicatrix sit.

Si naturalia foeminarum concubitus non admit-
tunt , quomodo curari conveniat.

CAP. XXVIII.

ET hoc quidem commune esse maribus & fa-
minis potest. Proprie verò quadâ ad feminas
pertinent , ut in primis quòd earû naturalia non
nunquâ inter se glutinatis oris , concubitus non ad-
mittunt. Idq; interdû euenit protinus in utero ma-
tris , interdû exulceratione in his partibus facta ,
& per malâ curationē his oris sanescendo iunctis.
Si ex utero est , membrana ori vulua opposita est.
Si ex ulcere , caro id repleuit. Oportet autem mem-
branam duabus lineis inter se transuersis incidere
ad similitudinē literæ X , magna cura habita , ne
urina iter violetur. Deinde vndiq; eâ membraná
excidere: ac si caro increuit , necessarium est rella
linca pateficere. Tû ab ora vel vossella vel hama
apprehensam , tanquâ habenuâ excidere: & incis-
um implicitum in longitudinem linamentum , λήνιον
Græci vocant , in aceto tinctû demittere. Sur-
praq; succidam lanâ aceto madentē deligare. Ter-
tio die solvere vlus , & sicut alia vlcera curant.
Cuiq;

cumq; iam ad sanitatem tēdet, plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamq; intus dare. Supraq; idem medicamentum inijcere, donec ad cicatricem plaga perveniat.

Qua curatione partus emortuus ex utero excutatur.

CAP. XXIX.

Vbi cōcipit autem aliqua, si iam propè maturus partus intus emortuus est, neq; exi-
dere per se potest, adhibenda curatio est, qua nu-
merari inter difficilimas potest. Nam & summā
prudentiam moderationemq; desiderat, & ma-
ximum periculum offert. Sed ante omnia vulva
natura mirabilis, cum in multis alijs, tum in hac
re quoque facile cognoscitur. Oportet autem ante
omnia resupinam mulierem transverso lecto sic
collocare, ut feminibus eius ipsius ilia comprimā-
tur. Quo fit, ut & intus venter in conspectu me-
dici sit, & infans ad os vulvae compellatur, quæ
emortuo partu id comprimit, ex intervallo vero
paulum debiscere. Hac occasione usus medicus,
uncta manus indicem digitum primum debet
inserere, atque ibi continere, donec iterum ad os
aperiatur, rursusq; alterum digitum demitte-
re debet, & per easdem occasiones alios, donec
tota esse intus manus possit. Ad cuius rei suc-
cultatem multum confert, & magnitudo vul-
væ, & vis nervorum eius, & corporis totius ha-
bitus, & mentis etiam robur, cum præsertim in-
fans nonnunquā etiam duæ manus dari debeant.

Pertinet etiam ad rem quam calidissimum esse
 * dum in intum ventrem, & extrema corporis, neq; * cum
 flammatione incepisse, sed recenti re protinus ad-
 ne capisse biberi medicinam. Nam si corpus iam intumuit,
 neq; demitti manus, neq; educi infans, nisi ager-
 me potest, sequiturq; saepe cum vomitu & cum
 tremore mortifera nervorum distentio. Verum in-
 tus emortuo corpori manus iniecta, protinus habi-
 tum eius sentit. Nam aut in caput aut in pedes
 conuersum est, aut in transversum iacet, si re-
 me sic ut vel manus eius vel pes in propinquo sit.
 Medici vero propositum est, ut eum manu dirigat,
 * manus vel in * caput, vel etiam in pedes, si forte aliter com-
 positus est: ac si nihil aliud est, manus vel pes ap-
 prehensus, corpus rectius reddit: nam in manus in ca-
 put, pes in pedes eum convertet. Tum si caput pro-
 ximum est, demitti debet uncus undiq; lenis,
 acuminis brevis, qui vel oculo, vel auri, vel ori,
 interdum etiam fronti recte inicitur, deinde at-
 tractus infantem educit, neq; tamen quolibet in
 tempore extrahi debet. Nam si compresso vulva
 ore id tentatum est, non emittente eo infans abru-
 pitur, & unci acumen in ipsam os vulvae delib-
 tur, sequiturq; nervorum distentio, & ingens pe-
 riculum moris. Igitur compressa vulva, conquis-
 cere: hi ante, leniter trahere oportet, & per has oc-
 casiones paulatim eum educere. Trahere autem
 dextra manus uncum, sinistra intus posita infra
 tem ipsum, simulq; dirigere eum debet. Sola enim
 enim

eunire, ut is infans humore distendatur, ex quo co-
 profluat sædi odoris sanies. Si quid tale est, indi-
 ce digito corpus illud forandum est, ut effuso hu-
 more extenuetur. Tum id leniter per ipsas manus
 recipiendum est, nam uncus iniectus facile hebe-
 ri corpusculo eleuabitur. In quo quid periculi sit,
 supra posui. Sed in pedes quoque conuersus infans
 non difficulter extrahitur, quibus apprehensis per
 ipsas manus commode educitur. Si verò trāsuer-
 sus est, neque dirigi potuit, uncus ala inuiciendus,
 paulatimque attrahendus est. Sub quo fere cernix
 replicatur, retroque caput ac reliquum corpus spe-
 ctat. Remedio est, cernix præcisa, ut separatim
 utraq; pars auferatur. Id unco fit, qui priori si-
 milis in interiorem tantum partem per totam
 aciem excutitur. Tum id agendum est, ut antè ca-
 put, deinde reliqua pars auferatur, quia fere ma-
 iore parte extracta, caput in vacuam vuluam pro-
 labitur: extrahi que sine summo periculo non potest,
 si tamen id incidit, super ventrem mulieris du-
 plici panniculo iniecto, valens homo non imperi-
 tus a sinistro latere eius debet assistere, & super
 iuu ventrem eius duas manus imponere, altera que
 alteram premere. Quo fit, ut illud caput ad os vul-
 uæ copellatur. Idque eadem ratione quæ supra po-
 sita est, unco extrahitur. At si pes alter iuxta re-
 peritur, alter retro cum corpore est, quicquid
 protrahum est, paulatim abscindendum est: &
 si illesos os vuluæ urgere ceperunt, iterum retro

Secundæ.

repellēda sunt, conquisitusq; pes eius adducēdus. Alięq; etiamnum difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, cōcisus eximi debeat. Quoties autem infans protractus est, tradendus ministro est. Is cum supinis manibus se sustinere, medicus deinde de sinistra manu leniter trahere umbilicū debet, ita ne abrumpat, dextraq; eum sequi vsq; ad eas, quas secundas vocant, quod velamentum infantis intus fuit, hisq; ultimis apprehensis venulas membranulasq; omnes eadem ratione manu ducere à vulua, totūq; illud extrahere, & si quid intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in unū feminibus, illa in conclavi collocanda est, modicū calorē sine ullo perflatu habēte. Super imum ventrē eius imponēda lana succida in aceto & rosa tinēta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his vulnerib⁹, quę in nervosis locis sunt, adhibeatur.

De Ani vitili, & eorum curatione.

CAP.

XXX.

ANi quoq; vitia ubi medicamētis non viantur, manus auxilium desiderant. Ergo si qua scissa in eo vetustate induruerunt, iamq; callum habent, cōmodissimum est ducere alium, tum spongiam calidam admoveere, ut relaxetur illa, & foras prodeat. Ubi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, & ulcera* sanare, deinde imponere linamentum molle, & super lintolum illitū melle, locumq; eum molli lana implere, & ita

* removere

& ita vincere altero die, deincepsq; ceteris leni-
tus medicamentis uti, quæ ad recentia eadem vi-
tia necessaria esse alias proposui, & utiq; per pri-
mos dies sorbitionibus eum sustinere, paulatim
deinde cibis adijcere aliquid, generis tamen eius:
quod eodẽ loco præceptum est. Si quando autẽ ex
inflammatione pus in his oritur, ubi primum id
apparuit, incidendum est, ne anus ipse suppuret.
Neq; tamẽ ante properandum est: nam si crudum
incisum est, inflammationis multũ accedit, & puris
aliquãto amplius concitatur. His quoq; vulneri-
bus, lenibus cibis, ijsdemq; medicamentis opus est.

De condylomatum curatione.

AT tubercula, quæ condylomata appellan-
tur, ubi induruerunt, hac ratione curan-
tur: Aluus ante omnia ducitur, tum vossella tu-
berculum apprehensum iuxta radices exciditur.
Quod ubi factum est, eadem sequuntur, quæ su-
prà post curationẽ adhibenda esse proposui. Tan-
tummodo si quid increfcit, squama aris coërcen-
dum est. Ora etiam venarum fundentia sangui-
nem sic tolluntur: Ubi sanguini qui effluit, sanies
adijcitur, aluus acrius ducitur, quo magis ora p-
moucantur. Eoq; fit, ut ^{*}omnia vasa, quasi capitu- ^{* omnes}
la conspicua sint. Tum si capitulum exiguum est, vena
basimq; tenuem habet, astringendum lino pau-
lum suprà est quàm ubi cum ano committitur.
Imponenda spongia aqua calida est, donec id li-
beat. Deinde aut ungue, aut scalpello suprà nodũ

id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur, interdum etiam urina difficultas. Si id maius est, & basis latior, baculo uno aut altero excipiendum est, paulumq; supra basim incidendum, neque relinquendum quicquam ex eo capitulo, neq; quicquam ex auferendum est. Quod consequitur is, qui neq; nimium, neq; parum hamos ducit. Quia incisum est, acus debet immitti, infraq; eam lino id capitulum alligari: si duo triaue sunt, unum quodque primum curandum est. Si plura, non omnia simul, ne tempore eodem undiq; tenera cicatrices sint: si sanguis profuit, excipiendus est spongia, deinde linamentum imponendum. Ungenda sunt & inguina, & quicquid iuxta vultus est, ceratūq; superdandum est. Farina hordeacea calida implendus is locus est: sic deligendus est. Postero die in desidere in aqua calida debet, eodēq; cataplasmate foveri. Ac bis die, & ante curationē, & post eam, ceruices ac semina liquida cerato perungenda sunt, tepidoq; is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda. Si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. Tum lenibus medicamentis, iisdemq; quae alibi posui, ulcera ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quem admodum agendum esset, iam alias superius exposui.

A De varicem curatione. CAP. XXXI.
 De bis ad crura proximus transitus est, in
 quibus

quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum quæ in capite nocent, & eorum varicum qui in ventre sunt, curationē distuli: quoniam ubiq; eadem est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur. Si recta est, si quamvis transversa, tamen simplex, si modica est, melius aduritur. Si curva est, & velut in orbes quosdam implicatur, pluresq; inter se involvuntur, vilius eximere est. Adurendi ratio hæc est: Cutis superinciditur, tum patefacta vena tenui & retuso ferramento candente modice premitur, vitaturq; ne plage ipsius ora adurentur, quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit, & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur. At exciditur hoc modo: Cute eadem ratione super venā incisa, hamulo ora excipiuntur, scalpelloq; undiq; a corpore vena diducitur, cauteturq; ne inter hæc ipsa lædatur, eiq; retusus hamulus subijcitur, impositoq; eodem fere spatio quod supra positū est, in eadem vena idem fit, quæ quò tendat, facile hamulo extento cognoscitur. Ubi iam idem, quacunque varices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum vena præciditur, deinde quæ proximus hamus est, attrahitur & euellitur, ibi rursus abscinditur. Ac sic undiq; varicibus crure liberato, tum plagarum ora coniunguntur, & super emplastrū glutinās inijcitur.

Curatio

AT si digiti vel in utero protinus, vel propter communem exulcerationem postea cohaserunt, scalpello diducuntur, dein separatim uterq; non pingui emplastro circumdatur. Atq; ita per se uterq; sanescit. Si verò sit vlcus in digito, posteaq; male induc̃ta cicatrix curum cum reddit, primum malagria tentandum est. Dein, si id nihil prodest (quod & in veteri cicatrice, & ubi nervi lasi sunt, evenire consuevit) videre oportet, nervine id vitium, an cutis sit. Si nervi est, attingi non debet, neq; enim sanabile est: si cutis, tota cicatrix excidenda est, qua ferè callosa efficitur, ut extendi digitum non patiatur, tum rectius sic ad novam cicatrucem perducendus est.

De Gangrenz curatione. CAP. XXXIII.

GAngrana inter ungues alasq; aut inguina nasci, & si quando medicamenta vincuntur, membrum precidi oportere, alio loco mihi dictũ est. Sed id quoq; cum periculo summo fit. Nam sæpe in ipso opere, vel profusione sanguinis, vel anime def̃ctione moriuntur. Verum hic quoque nihil interest an satis tutum presidium sit, quod unicum est. Igitur inter sanam vitiatamq; partem incidenda scalpello caro usq; ad os est: sic ut neq; contra ipsum articulum id fiat: & potius ex sana parte aliquid excidatur, quàm ex agra relinquatur. Ubi ad os ventum est, reducenda ab eo summa
caro,

caro, & circa os subsecunda est, ut ea quoq; parte aliquid os nudetur: dein id serrula præcidendum est, quam proxime sana carni etiam inhaerenti: ac tum frons ossis quam serrula exasperavit, levāda est, supraq; inducēda cutis, quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet, ut quàm maxime undiq; os cõtegat. Quò cutis inducta non fuerit, id linamentus erit contegendū, & super id sponsia ex aceto deligāda. Cetera postea sic faciēda, ut in vulncribus, in quibus pus moneri debet, præceptū est.

LIBER VIII.

De positu & figura totius humani corporis.

CAP. I.

SUPER EST ea pars quæ ad ossa pertinet, quæ quo facilius accipi possit, prius positus, figuræq; eorum indicabo. Igitur calvaria incipit ex inferiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinq; laevis, & quæ cerebri membranam contegit, & quæ cute capillum gignente contegitur. Ea q; simplex ab occipitio & temporibus, duplex usque in verticem à fronte est. Ossæq; eius ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. Interq; ea venæ discurrūt, quas his alimentum subministrare credibile est. raro autem calvaria solida sine futuris est. Locus tamen æstuosis facilius invenitur. Et id caput firmissimum, atq; à dolore tutissimum est: ex ceteris,

ceteris, quo suturae pauciores sunt, eo capitis va-
 letudo commodior est. Neq; enim certus earum nu-
 merus est, sicut ne locus quidem. Ferè tamen duæ
 super aures, tempora à superiore capitis parte di-
 scernunt. Tertia ad aures per verticem tendens
 occipitium à summo capite diducit. Quarta ab
 eodem vertice per medium caput ad frontem pro-
 cedit, eaq; modo sub imo capillo desinit, modo
 frontem ipsam secans inter supercilia, finitur. Ex
 his cetera quidem suturae in unguem committun-
 tur. Hæ verò quæ super aures transversæ sunt, to-
 tis oris paulatim extenuantur, atq; ita inferiora
 ossa superioribus leniter insidunt. Crassissimum
 verò in capite os post aurem est, qui à capillis, et
 verisimile est, ob id ipsum non gignitur. Sub his
 quoq; musculis, qui tempora connectunt, os mediū
 in exteriorē partē inclinatū positum est. At
 facies suturam habet maximam, quæ à tempore
 incipiens, per medios oculos naresq; transversa per-
 venit ad alterum tempus. A qua breves duæ sub
 interioribus angulis decorsum spectant. Et mala
 quoq; in summa parte singulas transversas suta-
 ras habent. A medijsq; naribus aut superiorum
 dētiū gingivis per mediū palatū una procedit,
 aliaq; transversa idem palatum secat. Et sutura
 quidē in plurimis hæ sunt. Foramina autem intra
 caput maxima oculorū sunt, deinde nariū, tum
 quæ in auribus habemus. Ex his quæ oculorum
 sunt, recta simpliciaq; ad cerebrū tendunt. Na-
 rium

riū duo foramina osse medio discernuntur. Siqui-
 dem hac primū à supercilijs angulisq; oculorum
 osse inchoatur ad tertiam scire partem : deinde in
 cartilagine versa quo propius ori descendunt , eo
 magis caruncula quoq; molliuntur. Sed ea forami-
 na, quæ à summis ad imas naves simplicia sunt,
 ibi rursus in bina itinera diuiduntur. Aliaq; ex
 his ad fauces peruia spiritum & reddūt & acci-
 piunt, alia ad cerebrum tēdunt. In ultima parte
 in multa & tenuia foramina dissipatur, per quæ
 sensus odoris nobis datur. In aure quoq; primo re-
 ctam & simplex iter procedendo flexuosum sit,
 quod ipsum iuxta cerebrum in multa & tenuia
 foramina diducitur, per quæ facultas audiēdi est:
 iuxta ea duo parvuli quasi sinus sunt , superq;
 eos finitur os, quod transversum à genis tendens
 ab inferioribus ossibus sustinetur, iugale appella- Iugale
 ri potest, ab eadem similitudine , à qua id Græci
 ῥινός appellanti. Maxilla verò est malle os, eaq;
 una est, cuius eadē & media & etiam ima pars
 mentum est, à quo utrinq; procedit ad tempora,
 solaq; ea mouetur. Nam mala cum toto osse, quod
 superiores dentes * excipit, immobiles sunt. * excipit
 Verum ipsius maxilla partes extremæ quasi bicor-
 nes sunt. Alter processus intrà latior, vertice ipso
 tenuatur, longiusq; procedens sub osse iugali su-
 bit & super id temporū musculis illigatur. Alter
 brevior & rotundior, & in eo sinu qui iuxta fo-
 ramina auris est cardinis modò fit : ibiq; huc &
illuc

* τετρα-
κτοι
Canini.
Maxilla-
res.

illuc se inclinans maxilla facultatem motus prestat. Duriorese osse dentes sunt, quorum pars maxilla, pars superiori osse malarum haeret. Ex his quaterni primi quia sciat, * τομνοὶ à Græcis nominantur, hi deinde quatuor caninus dētibz ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinq; fere maxillares quaterni sunt, præterquam in his in quibus tres ultimi qui sero gigni solent, non incrementunt. Ex his priores singulis radicibus, maxillares utiq; binis, quidam etiam ternis quaternis utuntur. Fereq; longior radix breviorē dentē edit, reliq; dentis recta etiam radix, curvi flexa est: ex eadem radice in pueris novus dēs subit, qui multo sapius priorem expellit, interdum tamen supra infra ve eum se ostēdit. Caput autem spina excipit. Ea constat ex vertebz quatuor & viginti. Septē in cervice sunt, duodecim ad costās, reliqua quinque sunt proxima costis. Haec teretes brevesq; ab utroq; latere, processus duos exigunt: media perforata quā spina medulla cerebro commissa descendit, circa quēq; per duos processus tenuibus canis peruia, per quā à membrana cerebri similes membranula deducuntur. Omnesq; vertebra exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis processibus parum desidentes sinus habent, ab inferiore alios deorsum versus processus exigunt. Summa igitur protinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis eius processibus. Quo fit, ut caput sursum deorsum versus tuberculis exasper

exasperetur, secunda superiori parti inferiore.
 Quod ad circuitum pertinet, pars summa angu-
 stiore orbe finitur. Itaq; superior summa circun-
 data, in latera quoq; caput moueri sinit. Tertia
 eodē modo secundam excipit. Ex quo facilis cerui-
 ci mobilitas est. Ac ne sustinere quidē caput pos-
 set, nisi utrinq; recti valentesq; nervi collum con-
 tinerent, quos * *καρποτας* Græci appellant. Siquidē
 inter omnes flexus alter semper intentus ultra
 prolabi superiora non patitur. Iamq; vertebra ter-
 tia tubercula quæ inferiori inseratur, excipit. Ca-
 tera processibus deorsum spectantibus, in inferio-
 res insinuantur, ac per sinus quos utrinq; habet,
 superiores accipiunt, multisq; nervis & multa
 cartilagine continentur. Ac sic vno flexu modico
 in promptum dato cæteris negotijs homo & rectus
 insistit, & alioqui ad necessaria opera curuatur.
 Infra cervicem verò summa costæ contra hume-
 ros sita est, inde undecim inferiores usque ad
 imum pectus perveniunt, hæq; primis partibus ro-
 tunda & leniter quasi capitulata, vertebrarum
 transversis processibus ibi quoq; paulum insinna-
 tis inheret. Inde patefunt, & in exteriorē par-
 tem recurvata, paulatim in cartilaginē degene-
 rant. Ea q; parte rursus in interiora leniter flexa
 committuntur cum ossæ pectoris. Quod valens ac-
 durum à faucibus incipit, ab utroq; latere luna-
 tum, & à præcordijs iam ipsum quoq; cartilagine
 molitum terminatur: sub costis verò prioribus

* Sicquidē
 hos ner-
 vos Ludo-
 vicus Cæ-
 lius dicē-
 dos esse cō-
 tendit, ta-
 men Her-
 mo. Barb.
 Tenontas
 appellan-
 dos puta-
 vit.

Scoptula
operta.

* *ῥοὰς* quinque, quas * *Νέβας* Græci nominant, breves tenuioresq; etq; ipse quoque paulatim in cartilagineam versæ, extremis abdominis partibus inherescunt, imaq; ex his maiore iâ parte nihil nisi cartilago est. Rursus à cervice duo lata ossa utrinque ad scapulas tendunt, nostri scoptula operta *πλάτας* Græci nominant. Ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula, paulatimq; latitudo ad spinam tendunt, & quo latiora quoque parte sunt, hoc hebetiora. Atq; ipsa quoque in ima cartilaginosa, posteriore parte velut innascent, quoniam nisi in summo nulli ossi inherescunt. Ibi utrò validis musculis nervisq; constricta sunt. At à summa costa paulo interiorius quàm ubi ea media est, os excrescit, ibi quidem tenue, procedens verò quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius latiusq; & paulatim in exteriora curvatur: quod propius altera verticis parte modice immensescens, sustinet iugulum. Id autem ipsum recurvum at neque inter durissima ossa numerandum; altero capite in eo quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit: paulumq; motu brachij movetur, & cum lato ossi scapularum infra caput eius, nervus & cartilagini connectitur. Hinc humerus incipit, extremis utrinque capitibus immidus, mollis, sine medulla, cartilaginosis: medius teres, durus, medullosus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem, anteriorem, & posteriorem partem. Prior autem pars est, quæ à

pectore

Etore est, posterior quæ ab scapulis, interior quæ
 latus tendit, exterior quæ ab eo recedit, quod
 oēs articulos pertinere in ulterioribus patebit.
 Superius autem humeri caput rotundius, quàm
 tera ossa, de quibus adhuc dixi, * verticulatis * verti-
 apularum ossibus paruo excessu inseritur, ac cillatis
 aiore parte ex transitu nervus deligatur. At
 ferius duos processus habet inter quos quod me-
 iam est, magis etiã extremis partibus sinuatur.
 quæ res sedem brachio præstat, quod constat ex
 ribus duobus. Radius, quem ῥαδια Græci ap- Radius.
 ellant, superior breviorq; & primo tenuior, ro-
 undo & leniter cæno capite exiguum humeri tu-
 erculum recipit, atq; ibi nervis et cartilagine cœ-
 metur. Cubitus inferior longiorq; & primo ple-
 nior in summo capite, duobus quasi verticibus
 xtantibus in sinu humeri, quem inter duos pro-
 essus eius esse proposui, se inserit. Primo verò
 duobus radys brachij ossa iuncta paulatim diri-
 untur, rursusq; ad manum cœunt, modo crassi-
 tudinis mutato. Siquidem ibi radius plenior, cu-
 bitus admodum tenuis est. Dein radius in caput
 atilaginosum cœsurgens, in verticem eius sinua-
 tur. Cubitus rotundus in extremo, parte altera Cubitus?
 paulum procedit. Ac ne sapius dicendum sit, illud
 ignotari non oportet, plurima ossa in cartilaginẽ
 * desidere, nullum articulum non sic finire. neque
 enim aut mori posset, nisi leni inniteretur, aut cū * desinere
 carne nervisq; coniungi, nisi ea media quadam

materia committeret. In manu verò prima palma pars ex multis minutisq; ossibus constat, quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia & triangula structura quadam inter se connectuntur, cum inuicem superior alterius angulus, alterius planicies sit, eoq; fit ex his unius ossis paulū in interiora concavi species. Verūm ex manu duo exigui processus in sinus radij coniunguntur. Tum ex altera parte recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent, à quibus ipsi digiti oriuntur, qui ex ossibus ternis constant, omniumq; eadem ratio est. Interius os in verticem sinuatur, recipitq; exterioris exiguum tuberculum, nerviq; ea continent, à quibus orti ungues indurescunt. Ideoq; non ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent. Ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt. Ima vero spina in coxarū osse desidit, quod trāsversum longeq; valentissimum, vuluam, vesicam, rectum intestinum tuetur, idq; ab exteriori parte gibbum, ad spinam resupinatum, à lateribus, id est, in ipsis coxis sinus rotundos habet.

Recten.

à quibus oritur os, quod pectinem vocant, idq; super intestina sub pube trāsversum ventrem format, rectius in viris, recurvatum magis in exteriora in fœminis, ne partū prohibeat. Inde feminae oriuntur, quorum capita rotundiora etiam quam humerorū sunt, cum illa ex ceteris rotundissima sint. Infra verò duos processus à priore & à posteriore parte habent. Dein dura, & medulla

& ab exteriori parte gibba : rursus ab inferiori-
 bus quoque capitibus intumescunt. Superiora in
 sinus coxae, sicut humeri in ea ossa, quae scapularū
 sunt, coniunguntur, tum infra introrsus leniter tē-
 dunt, quo aequalius superiora membra sustineāt.
 Atq; in eo inferiora quoq; capita media sinuan-
 tur, quo facilius excipi à cruribus possint. Quae
 commissura, osse paruo, molli, cartilaginoso tegi-
 tur, patellam vocant. Haec super innatans, nec ulli Patella.
 ossi inhaerens, sed carne & nervis deligata, pau-
 loq; magis ad femoris os tendens, inter omnes cru-
 rum flexus iuncturam tuetur. Ipsum autem crus
 est ex ossibus duobus. Etenim per omnia simur hu-
 mero, crus verò brachio simile est: adeo ut habitus
 quoque & decor alterius ex altero cognoscatur,
 quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respon-
 det. Verum alterum os ab exteriori parte supra
 positum est, quod ipsum quoque Sura rectè nomi-
 natur. Id brevius, supraq; tenuius ad ipsos talos
 intumescit. Alterū à priore parte positū, cui Ti-
 bia nomen est, longius & in superiore parte ple-
 nius, solum cum femoris inferiore capite commit-
 titur, sicut cū humero cubitus. Atq; ea quoq; ossa
 infra supraq; coniuncta media, ut in brachio de-
 biscent. Excipitur autem crus infra ossa ex trans-
 verso talorum, idq; ipsum super os calcis sitū est,
 quod quadā parte sinuatur, quadā excessus ha-
 bet, & procedentia ex talo recipit, & in sinū eius
 inscribitur. Idq; sine medulla durum, magisq; in
poster

posteriorem partem proiectū, teretem ibi figuram
representat. Cetera ossis pedis ad eorū qua in ma-
nu sunt, similitudinem instructa sunt. Plata pal-
mis, digiti digitis, ungues unguibus, respondent.

Ossa vitata & corrupta quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur. CAP. III

OMne autem os, ubi iniuria accessit, aut vi-
tiatur, aut finditur, aut fragitur, aut foras-
tur, aut colliditur, aut loco movetur. Id quod vi-
tium est, primo ferè pingue fit, deinde vel ni-
grum vel cariosum. Quae super natis granibus ul-
ceribus aut fistulis, hisq; vel longa vetustate, vel
etiam cancro occupatis eveniunt. Oportet ante o-
mnia os nudare ulcere exciso: & si latius eius
vitium est, quàm ulcus fuit, carnem subsecare,
donec integrum os undique pateat: tum id quod
pingue est, semel iterumque satis est adnoto fer-
ramento adurere, ut ex eo statu secedat: aut era-
dere donec iam aliquid cruoris ostendatur, qua
integrioris nota est. Nam necesse est aridum sit,
id quod vitium est. Idem in cartilagine quoque
lasa faciendum est. Siquidem ea quoq; scalpello
radenda est, donec integrū id sit, quod relinquitur.
Deinde si velos, siue cartilago rasa est, vi-
tro bene trito respergendum est. Neque alia fa-
cienda sunt ubi caries, nigritiesve in summo osse
est. Siquidem id vel paulo diutius eodem ferra-
mento adurendum vel radendum est. Qui radit
haec, audaciter imprimere ferramentum debet, &

& agat aliquid; & maturius desinat. Finis est,
 cum vel ad album os, vel ad solidum ventum est.
 Albo finire ex nigritie vitium, soliditate quadā
 ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris ali-
 quid integro, supra dictum est. Si quando autem
 altius descenderit, utrumlibet dubium est. In ca-
 rie quidem expedita cognitio est. Specillum tenne
 in foramen demittitur, quod magis minúsve in-
 trando, vel in summo cariem esse, vel altius de-
 scēdisse testatur. Nigrities colligi quidē potest etiā
 ex dolore & ex febre. Quæ ubi mediocria sunt, il-
 la alte descendisse non potest. Manifestior tamen
 adaucta terebra fit. Nā finis vitij est, ubi scobis ni-
 gra esse desyt. Igitur si caries alte descendit, per
 terebram urgenda crebris foraminibus est, qua al-
 titudine vitium æquent. Tum in ea foramina de-
 mittenda candentia ferramenta sunt, donec inde
 secum os ex toto fiat. Simul enim post hac & re-
 soluetur ab inferiore osse, quodcūq; vitiatum est,
 & is sinus carne replebitur: & humor aut nullus
 postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities
 est, aut si caries ad alterā quoq; partiē ossis transit,
 oportet excidi. Atq; idē in carie quoq; ad alteram
 partem ossis penetrante fieri potest. Sed quod totū
 vitiatum, totum eximendum est. Si inferior pars
 integra est, eatenus quod corruptum est, excidi
 debet. Item siue capitis, siue pectoris os, siue costa
 cariōsa est, inutilis vitio est, & excidendi neces-
 saria est. Neque audiendi sunt, qui osse nudato,

diem tertium expectant, ut tunc excidant. Ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque quantum fieri potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os delegendum, & omni vitio liberandum est. Longeq; perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia vix etiam si recte cessit, curatio veram sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur: & de Modiolo, & Terebra, ferramentis ad id paratis. CAP. III.

EXciditur verò os duobus modis. Si parvulum est, quod laesum est, modiolo, quem *Xarvinoi* Græci vocant: Si spatiosum, terebris. Utriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum teres est, inuis oris ferratū, per quod medullæ clavis ipse quoq; interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarū autem duo genera sunt: Alterum simile ei, quo fabri utuntur. Alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit, atq; iterū ab alio principio paulo minus quam equaliter sursum procedit. Si vitium in angusto est, quod cōprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. Et si caries subest, medius clavis in foramen demittitur. Si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clavum recipiat, ut eo insistente circumactus modiolus delabi non possit. Deinde is habena quasi terebra cōvertitur. Estq; quidam premendi modus, ut & fertur, & circumagatur, quia si leviter imprimatur, parū proficit. Si graviter, non movetur. Neq; alie-

num est instillare paulum rosa, vel lactis, quo magis lubrico circumagatur. Quod ipsum tametsi ^{*obtusius est,} aciem ferramenti hebetat: at ubi ^{*copiosius} iter modiolò pressum est, medius clauus educitur, & ille per se agitur. Deinde cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur: at si latius vitium est, quàm ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso sine vitiosi ossis atq; integri, deinde alterũ vò ita longè, tertiumq; donec totus is locus qui excidendus est his cavis cinctus sit, atq; ibi quoq; quatenus terebra agenda sit, scobis significat. Tunc excisorius scalper ab altero foramine ad alterũ malloolo adactus, id quod inter utrunq; medium est, excidit: ac sic ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modiolò imprimitur. Vtro modo vero id circumductum est, idem excisorius scalper in osse corrupto plenus summam quanq; testam leſit, donec integrum os relinquatur. Vix unquã nigrities integrum, caries per totũ os perrumpit, maximèq; ubi vitiosa caluaria est. Id quoq; signiſpecillo significatur, qui depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet, & ob id renitẽs aliquid inuenit, & madens exit. Si peritium inuenit, altius descendens inter os & membranam nihil oppositum inuenit, educiturq; siccus, nõ quo non subsit aliqua vitiosa sanies, sed quoniã ibi in latiore sede diffusa sit. Siue autẽ nigrities, quã terebra detexit, siue caries, quam specillũ ostẽdit,

os trāsīt, modioli quidē vsus ferè superuacuuus est, quia latius pateat necesse est, quod iam alte processit. Terebra verò ea, quā secundo loco posui, utendum, eoq; ne nimis incalēscat, subinde in aquam frigidā demittēda est. Sed tū maiore cura agendū est, cū iam aut simplex os dimidiū perforatū est, aut in duplici, superius. Illud, spatium ipsum, hoc sanguis significat. Ergo tū lentius ducēda habena suspendendāq; magis sinistra manus est, & sepius attolenda, & foraminis altitudo consideranda: ut quandocunq; os perumpitur, sentiamus: neq; periclitemur, ne mucrone cerebri mēbrana ledatur. Ex quo graues inflammationes cum periculo mortis oriuntur. Factis foraminibus eodem modo media saepe, sed multo circūspēctius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eandē mēbranam violēt, donec fiat aditus, per quē mēbrana custos immitatur *μωρυγοφύλακx* Græci vocant. Lamina enca est, firma, paulum resima ab exteriori parte lenis, quæ demissa est, ut exterior pars eius cerebro propior sit, subinde ei subijcitur, quod scalpri discutiendū est: ac si excipit eius angulū, ultra trāsire non patitur, eoq; & audacius & tutius scalprium malleolo subinde medicus firmit, donec excisum undiq; os eadē lamina leuetur, tolliq; sine ulla noxa cerebri potest. Vbi totū os eiectum est, circūcumradenda leuandāq; sunt ora, & si quis scobis mēbrana insedit, colligendū. Vbi superiori parte sublata, inferior relictā est, non ora tantum, sed

quoque; totum lauandum est, ut sine noxa postea
 carnis increseat, quæ aspero ossi innascens protinus
 non sanitatem, sed novos dolores mouet. Patefacto
 cerebro, quæ ratione agendum sit, dicam, cum ad fra-
 cta ossa peruenero. Si basis aliqua seruata est, su-
 per imponenda sunt medicamenta non pingua, quæ
 recentibus vulueribus accommodantur, supraque im-
 ponenda lana succida oleo atque aceto madens. Vbi
 tempus processit, ab ipso ore caro increscit, eaque fa-
 ctum manus sinu complet. Si quod etiam os adu-
 sum est, à parte sana recedit: subitque inter integrâ
 atque emortuam partem carunculi, quæ quod abs-
 cessit, expellat, eaque fere quia testa tenuis & an-
 gustæ est, squama est, id æwîs à Græcis nomina-
 tur. Potest etiam euenire, ut ex ictu neque findatur
 os, neque perfringatur, sed summum tamē collidatur,
 exaspereturque. Quod ubi incidit, radi & lauari sa-
 tis est. Hac quamuis maxime sunt in capite, tamē
 ceteris quoque ossibus cōmunia sunt, ut ubicunq;
 idem incidet, eodem remedio sit utendum. Atque
 cum ea fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam
 proprias in singulis generibus, quasdam communes
 in pluribus curationes requirant. De quibus pro-
 tinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

De caluariæ curatione.

CAP. IIII.

Igitur ubi ea pertusa, protinus requirendum
 est, num bilem is homo uomuerit, num oculi
 eius obcecati sint, num ebmatuerit, num per na-
 res auræve sanguis ei effluxerit, num conciderit,

num sine sensu quasi dormiens iacuerit. Nec enim non nisi osse fracto eueniunt. Atq; ubi inciderūt, scire licet necessariā, sed difficilem curationē esse. Si verò etiam torpor accessit, si mens non cōstat, si nervorum vel resolutio vel distentio secuta est, verisimile est etiam cerebri membranā esse violatā, eoq; in angusto magis spes est. At si nihil horum secutum est, potest etiā dubitari, an os fractum sit. Et protinus considerandum est, lapido an ligno, an ferro, an alio telo percussū sit, & hoc ipso leni an aspero, mediocri an vastiore, vehementer an leniter. Quia quo mutior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est, quam certiore id nota explorare. Ergo quā plaga est, demitti specillum oportet, neq; nimis tenue, neq; acutum, ne cum in quosdā sinus naturales inciderit opinione, fracti ossis frustra faciat, neq; nimis plenum, ne paruale rimula fallant. Ubi specillum ad os venit, nihil nisi lene & lubricum occurrit, integrum id videri potest. Si quid asperi est, utique quā sutura non sint, fractum os esse testatur. A suturis se ceptum esse, Hippocrates memoria prodidit, magni scilicet magnorum virorum, & scienciam magnarum rerum habentium. Nam leuia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, maltaq; nihilominus habituro, convenit etiā simplex veri erroris confessio, precipueq; in eo ministerio quod utilitatis causā posteris tradi-

ur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis
ante deceptus est. Sed hæc quidem alioquin memo-
ria magni professoris, uti interponeremus, effecit.
Potest autem sutura eo nomine fallere, quæ aque
aspera est, ut aliquis hanc esse, etiam si rima est,
existimet eo loco, quo subesse hanc verisimile est.
Ergo eo nomine decipi non oportet, sed os aperire
tutissimum est. Nam neq; utiq; certa sedes, ut su-
pra posui, suturarum est, & potest idem, & na-
turaliter commissum, & ictu fissum esse, iuxta ve
aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi
ictus fuerit vehementior, quamvis specillo nihil
inuenitur, tamen aperire commodius est. At si ne-
tū quidem rima manifesta est, inducendum super
es atramentum scriptorium est, deinde scalpro id
detrahendum. Nigritiem enim continet, si quid
fissum est. Solet etiā evenire, ut altera parte fuerit
ictus, & os altera fiderit. Itaq; si graviter aliquis
percussus est, si mala indicia subsequuta sunt, neq;
ea parte qua cutis discussa est, rima reperitur, non
incommodum est parte altera considerare, nun-
quis locus mollior sit, & tumeat, eumq; aperire.
Siquidem ibi fissum os reperietur, nec tamen ma-
gno negotio cutis sanescit, etiam si frustra dese-
cta est. Os fractum nisi succursum est, granibus in-
flammationibus afficit, difficiliusq; postea tracta-
tur. Raro, sed aliquando tamen evenit, ut os qui-
dem totum integrum maneat, intus verò ex ictu
vena aliqua in cerebri membrana rupta aliquid
sang

sanguinis mittat, isq; ibi concretus magnos dolores moveat, oculos quibus obcacet. Sed ferè contra id dolor est, & eo oleo cute incisa pallidum os reperitur. Ideoq; id quoque os excidendum est. Quacumq; autem de causa curatio hac necessaria est: si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid laesum est in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa membranula qua sub cute calvariā cingit, super os relinquatur. Siquidem hac scalp pro cerebrūve lacerata, vebemētes fibres cum inflammationibus excitat. Itaq; eam commodius est ex toto ab offe diduci. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. Si manu faciendā est, ea fere commodissima est, quæ duabus transversis lineis litera x. figuram accepit, et deinde à singulis procedentibus* singulis cutis subsequatur. Inter quæ si sanguis feritur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus est, occupandūq; obiectis linamentis, & caput altius excitandum. Neque id vitium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, adfert, sed ibi quoque nihil tutius sit. In omni verò fisso fractūve offi, prout antiquiores medici ad serratamenta veniebant, quibus id exciderent. Sed multo melius est ante emplastra experiri, quæ calvariæ crassa compositum, per se super fissū fractūve os imponere, deinde super id aliquanto latius quam vulnus est,

* alij, lingulis: alij, ligulis legunt.

et, eodem medicamento illitum lintheolum, & praeterea succiã lanam aceto tinctam. Tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere, similiterq; curare usq; ad diem quintum. A sexto die, etiam vapore aqua calida per spogiam fovere, cetera ex eadem facere. Quod si caruncula increfcere ceperit, & febricula aut soluta erit, aut leuior, & cupiditas cibi reuerterit, satisq; somni accedet, in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore, emolliendum id emplastrũ adiecto cerato ex rosa facto, quo facilius carnem producat. nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione saepe rima callo quodam implentur, etlq; ea ossis velut cicatrix, & latius fracta ossa, si quae inter se non coharebant, eodem callo glutinantur, etlq; aliquanto melius velamentu cerebro, quam tarsi qua exciso osse increfcit. Si vero sub prima curatione febris intenditur, breuesq; somni & iidem per somnia tumultuosi sunt, vlcus madet, neq; alitur, & in cervicibus glandula oriuntur, magni dolores sunt, cibiq; super hac fastidium increfcit, tum diuini ad manus scalprumq; veniendum est. Duo vero sub ictu calvaria pericula sunt, ne vel findatur, vel medium desinat: si fissum est, possunt ora essi compressa, vel quia altera super alteram excessit, vel etiam quia vehementer rursus se commiserunt. Ex quo evenit, ut humor ad membranam quidem descendat, exitum vero non habeat, ac si eam irriter, & graves in-

flamm

inflammationes moueat. Vbi medium desedit, ean-
 dem cerebri membranam os urget, interdū etiam
 ex fractura quibusdā velut aculeis pungentibus.
 His ita succurrendum est, vt tamen quā mini-
 mū ex osse dematur. Ergo si ora alteri insedit, satis
 est id quod eminet, plano scalpro excidere, quo su-
 blato iam rima hiat quantum curationi satis est.
 At si ora inter se comprimuntur, à latere eius in-
 terposito digiti spatio terebra foramen faciendum
 est, ab eoq; scalper duabus lineis, ad rimam agen-
 dus ad similitudinem C literæ, sic vt vertex eius
 à foramine basis ad rimas sit. Quod si rima longius
 patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri
 debebit, & ita nihil latens in eo osse concanū est,
 abundeq; exitus datur intus ledentibus. Ne si fra-
 ctum quidē os desedit, totū excidi necesse est. Sed
 siue totum perfractū est, & ab alio ex toto recef-
 sit, siue circumposita calvaria inhaeret exigua par-
 te, ab eo quod naturaliter se habet, scalpro diui-
 dendum est: deinde in eo quod desedit iuxta rimā
 quam fecimus, foramina addenda sunt. Si in an-
 gusto noxa est, duo: si latius patet, tria: septaq; eo-
 rum excidenda: & tum scalper utrinq; ad rimam
 agendus, sic vt luna tum sinum faciat, imaq; pars
 eius intus ad fracturam, cornua ad os integram
 spectent. Deinde, si qua labent, & ex facili rema-
 ueri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt,
 maximeq; ea quæ acuta membranam infestant.
 Si id ex facili fieri non potest subiicienda lamina
 est,

est, quam custodem eius membrana esse proposui,
 & super eam quicquid spinosum est, & intus emi-
 net, excidendū est: eadem lamina quicquid deor-
 sum insedit attollendū. Hoc genus curationis effi-
 cit, ut qua parte fracta ossa tamen inhaerent, soli-
 dentur: qua parte abrupta sunt, sine ullo tormēto
 sub medicamento tēpore excidāt, spatiumq; inter
 haec satis illi magnū ad extrahendam sanie relin-
 quatur, plusq; in osse propugnaculi cerebrum ha-
 beat, quam habiturū fuit eo exciso. His factis, ea
 membrana acri aceto respergenda est, ut siue ali-
 quid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur: siue in-
 tus concretus cruor remanet, discutiat. Tū idem
 medicamentum eodem modo, qui suprapositus est,
 molitum, ipsi membrana imponendū est. Ceteraq;
 eodem modo faciēda sunt, quae ad linteolum illitū
 & lanam succidam pertinent, collocandusq; is loco
 in tepido, & curandū quotidie vulnus, bis etiam
 astate. Quod si membrana per inflammationē in-
 tumuerit, infundenda erit rosa tepida. Si usq; eò
 tumebit, ut super ossa quoq; emineat, coërcebit eā
 bene trita lenticula, vel folia vitis contrita, & cū
 recenti vel butyro vel adipe anserino mista, cer-
 uixq; molliri debebit, liquido cerato ex irino fa-
 cto. At si parum pura membrana videbitur, par
 modus eius emplāstri & mellis miscendus erit,
 idq; super infundendum, eiusq; continendi causa
 unum aut alterum linamentum inijciendum, &
 super linteolo cui emplāstrum illitum sit, conte-
 gend

gendum. Vbi plus pura membrana est, eadem ratione adijciendū emplastro ceratū, ut carnem producat. Quod ad abstinentiā verò & primos vltioresq; cibos potionesq; pertinet, eadē quae in vulncribus praecepti, seruanda sunt, eò magis, quò periculosus hac pars afficitur. Quinetiā cum iam nō solum sustineri, sed ali his quoq; apparebunt, tamen erunt vitanda quaecunq; mandenda sunt, item furuus, & quicquid excitat sternutamentū. ** mollis* Spem verò certam faciunt membrana ** mobilis ac* sui coloris, caro increfcescens rubicunda, facilius motus maxilla atq; cernicis. Mala signa sunt, membrana immobilis, nigra, vel livida, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, nervorū vel resolutio, vel distentio, caro livida, maxillā rigor, atq; cernicis. Ceteraq; quae ad somnū, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadē quae in ceteris vulneribus, vel salutaria vel mortifica sunt: vbi bene res cedit, incipit ab ipsa membrana: vel si os eo loco duplex est, inde quoq; caro increfcescere, eaq; id quod inter ossi vacuū est, replet, nonnunquam etiam super calvariā excrefcit. Quod si incidit, inspergenda squama eris est, ut id cicamat, cohibeatq; ea carni superdando, quae ad cicatricem perducat. Omnibzq; ea locis commode inducitur, excepta frontis ea parte, quae paulum super id est, quod inter supercilia est. Ibi enim potest fieri potest, ut per omnem aetatem sit exulceratio, quae lintcolo medicamentum habente contegenda sit.

fit. Illa utiq; capite fracto seruanda sunt, ut donec iam valida cicatrix erit, soluenda vitentur, frequens balneum, maior vini modus.

De narium fractarum curatione. CAP. V.

In naribus verò & os & cartilago frangi: solet, & quidem modo aduersa, modo à latere si aduersa fracta sunt, alterumve ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur: si à latere os fractum est, is locus cauius est: si cartilago, in alteram partem nares declinantur. Quicquid in cartilagine incidit, excitandum leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinq; cōpressis. Deinde in longitudinē implicata linamenta & molli pellicula cinēta circumfusaq; , intus adijcienda sunt. Aut eodem modo compositū aliquid ex arido penicillo. Aut gradis pinna, gummi vel subrili glutine illita, & molli pellicula circumdata, qua desidere cartilaginem non sinat. Sed si aduersa ea fracta est, aequaliter utraq; neris implenda est. Si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua naris iacet, ab altera tenuius, id quod inseritur. Extrinsecus autem circumdanda habena est mollis, media illita mistis inter se simula & thuris fuligine, eaq; ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus a: glutinanda est. Id enim corpori quasi glutem inhaerescit, & cum induruit, nares commode continet. Sin quod intus inditū est ledit, sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excitata nares eadem tantummodo habena continend

tinenda sunt. Deinde, post quatuordecim dies id ipsum demendum est. Resolvitur autem aqua calida, eaq; tum is locus quotidie fovendus est. Sin fractum est, id quoq; digitis in suam si dem repomendum est: atq; ubi aduersum id ictum est, vitæque naris implenda est: ubi à latere, ea inquam os impulsum est, imponendumq; ceratum, & paulo vehementius deligandum est quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increscit. A tertio die fovendum id aqua calida est, tantoq; magis, quanto propius esse sanitati debet. Quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda, imponendaq; extrinsecus eadem habena, & super eam ceratum, neque ultra fascia adhibenda est. At si quod fragmentum undique resolutum cum cæteris non glutinabitur, intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere feretur, vossella verò extrahetur. Finitisq; inflammationibus, imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quæ leniter reprimunt. Peius est, ubi aut ossi, aut cartilagini fracta, cutis quoque vulnus accessit. Id admodum raro fit: si incidit ulla quidem, nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. Cuti verò superimponendum emplastrum aliquod ex his, quæ recentibus vulneribus accommodata sunt, sed insuper nulla circumculo deligandum est.

In aure quoque interdum rumpitur cartilago: quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum est. Sape enim supurationem prohibet, & aurem confirmat. Illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilaginem ipsam glutinari, circa tamen carnem increfcere, solidarique cum locum. Itaque si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinque sutitur. Nunc autem de ea dico, qua cute integra frangitur. In ea vero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis, & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est. Deinde utendum est medicamento leniter suppressante, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat. Tum imponendum lintecolum cum emplastro: sic ut pingue omne vitetur, & à parte posteriore lana mollis auri subijcienda est, qua quod est inter hanc & caput compleat. Tum ea leniter deliganda est, & à tertio die vapore, ut in naribus posui, fovenda. Atque in his quoque generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fracturæ curatione, de quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. CAP. VII.

Ab his ad maxillam venturus, indicanda quedam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur est modo rectum ut lignum in longitudinem finditur, modo frangitur transversum, interdum obliquum: atque id ipsum nonnunquam retusa habet ca-

pita, nonnunquam acuta. Quod genus pessimum est, quia neq; facile committuntur, quae nulli rursus innituntur, & carnē vulnerāt, interdū necnun-
 quoq; aut musculū. Quinetiam aliquando plura
 fragmenta à fragmēto, sunt. Sed in alijs quidem
 ossibus ex toto saepe fragmentum à fragmēto rece-
 dit. Maxilla verò semper aliqua parte etiam ve-
 xata, ossa inter se cohaerent. Igitur in primis digi-
 tis duobus utrinq; prementibus, & ab ore, & ab
 cute omnino ossa in suam sedem cōpellenda sunt.
 Deinde si transversa maxilla fracta est, sub quo
 casu serē dens super proximū dētem excedit, ubi
 ea in suam sedem collocata est, duo proximi den-
 tes: aut si hi labant, ultiores inter se seta deli-
 gendi sunt. Id in alio genere fractura supernaculū
 est. Cetera eadē faciēda sunt. Nam linteolū du-
 plex madēs vino & oleo superinſciendum, cum
 eadē simila, & eadem thuris fuligine est. Deinde
 aut fasciā, aut mollis habena media in longitudi-
 nē incisa, ut utrinq; mētum cōplectatur, & inde
 capita eius supra caput adducta ibi deligantur.
 Illud quoq; ad omnia ossa pertinēs dictū erit, fa-
 mem primū esse necessariā: deinde à die tertio ho-
 midu cibū, sublata inflāmatione paulo pleniorē,
 eūq; qui carnē alat: per omne tēpus vinū esse alie-
 nu. Deinde tertio die resolui debere: foveriq; per
 spongiā vapore aqua calida, eademq; quae primū
 fuerint superdari. Idem die quinto fieri, & donec
 inflāmatio finiatur, quae vel octavo, die, vel sep-
 timo

limo fere resolvitur. Ea sublata rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. Neq; id esse solvendum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæq; ossa conseruntur, trāsierint. Fere verò intra quartumdecimum & vñ & vigesimum diē sanescunt, maxilla, mala, iugulū, pectus, latus, os scapularū, costæ, spina coxarū, os tali, calx, manus, planta. Inter vigesimū & trigesimū diem crura, brachiaq;. Inter septimum & vigesimū & quadragessimū, humeri & similia. Sed in maxilla illud quoq; adiciendū est, quod humidus cibus diu assumendus est. Atque etiā cum tempus processit, in lagano, similibusq; alijs perseverandum, donec ex toto maxillā callus primarit. Itē utiq; primis diebus habendū silētiū.

De Iuguli fracti curatione.

CAP. VIII.

Iugulum verò si trāsversum fractum est, nonnunquam per se rursus recte coit, & nisi movetur, sanari sine iunctura potest. Nonnunquam verò, maximeq; ubi motum est, elabitur, fereq; id quod à pectore sub id quod ab humero est, in posteriore partē inclinatur. Cuius ea ratio est, quod per se non movetur, sed cum humeri motu consentit. Itaq; ea subsistente, sub id humerus agitur. Raro verò admodum in priorem partem iugulum inclinatur, adeo ut magni professores nunquā se vidisse memoria mandarint. Sed locuples tamen eius rei autor Hippocrates est. Verum ut dissimilis uterq; casus est, sic quadam dissimilia

requirit. Ubi ad scapulas iugulum tendit, simul extra manu planè propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. Ubi ad pectus conuersum est, ipsum quidem retro dandum, humerus autem in priorem partem adducendus est. Ac si is inferior est, non id quod à pectore est, deprimendū est, quia immobile est, sed humerus ipse attollendus. Si casu superior est, id quod à pectore est, implendum lana, & humerus ad pectus diligendus est. Si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem vulnerant, pracidenda sunt: tunc reuulsa ossa cōmittēda sunt. Si quod ab aliqua parte eminet, opponendū ei triplex linteolū est, in vino & oleo tinctū. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula factō canaliculo, eodēq; intus incirato, ne fascia diducatur, quæ iugulo cōposito circumdanda est saepius potius, quàm valentius. Quod ipsum quoq; in omnibus ossibus fractis perpetuū est. A dextro verò iugulo, si id fractū est, ad alam sinistram, à sinistro ad dexteram. Rursusq; sub ala sua fasciari debet. Post hac si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus: si in partem priorem, ad cervicem deligandum est. Supinusq; homo collocandus, ceteraq; eadem faciēda, quæ supra cōprehensa sunt. Sunt verò plura ossa friuolissima, vel dura, vel cartilaginosa, quæ vel franguntur, vel forantur, vel collidūtur, vel franguntur, ut male, pectus, latus, os scapularū, costæ, spina

spina costarū, os tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem curatio est. Si suprā vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. Quo sapiente rimas quoq; ossis, aut si quod ferrumen est, callus implet. Si cutis integra est, & os laesum esse ex dolore colligimus, nihil aliud, quàm quiescendum, imponendumq; ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

De costarum fracturarum curatione. CAP. IX.

Propriè tamen quedā de costa dicenda sunt, quia iuxta viscera est, grauioribusq; periculis is locus expositus est. Hec quoq; igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rara est, ledatur: interdū sic, ut eam totam is casus perruperit. Si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quicquā suppurat, nisi admodū rarò, nec dolor magnus est, tactu tamen is locus leniter indolescit, abunde est eadem quæ suprā scripta sunt, facere, & à media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hac cutem inclinet. Ab uno verò & vigesimo die, quo vtiq; os esse debet glutinatum, id agendum. Cibis vberioribus est utendum, ut corpus quàm plenissimum fiat, quo melius os vestiatur, quod illo loco tenerum adhuc iniuria sub tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis vitandus clamor, sermo quoq; tumultus, ira, motus vehementior corporis, sumus, pulvis, ut quicquid vel iussim

vel sternutamentum mouet, ne spiritum quidem
 magnopere cōtinere expedit. At si tota costa per-
 fracta est, casus asperior est. Nam & graues in-
 flammationes, & febris & suppuratio, & sepe
 vita periculum sequitur, & sanguis spuitur. Ergo
 si vires patiuntur, ab eo brachio quod super eam
 costam est, sanguis mittendus est. Si non patien-
 tur, alius tamen sine ullo acri ducenda est, diu-
 tiusq; inedia pugnandum. Panis verò ante septi-
 mum diē non assumendus, sed una sorbitione vi-
 nendū, imponendumq; ei loco ceratum ex lino fa-
 ctum, cui costā quoq; resina adiecta sit, aut Pi-
 lyarchi malagma, aut panaces ex vino & rosa &
 oleo, superq; imponenda lana succida mellis, &
 duæ fasciæ à medys orsa, minimiq; ostiende. Multo
 verò magis omnia vitanda, quæ supra posui, adde,
 ut ne spiritus quidem sapius mouendus sit. Quod
 si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, vel
 ex trixagine, vel ex ruta, vel ex herba stœchade,
 vel ex cumino & pipere. Granioribus verò dolo-
 ribus urgentibus, cataplasma imponi quoq; con-
 ueniet vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis sci-
 tertia pars sit adiecta. Et id quidem interdum su-
 periaccebit. Noctū vero idem aut ceratū, aut ma-
 lagma, aut panni, quia potest, cataplasma deci-
 dere. Ergo quotidi- * quoq; resoluetur, donec iam
 cerato aut malagmate possimus esse contenti, &
 decem quidem diebus extenuabitur fame corpus,
 ab undecimo verò alii incipiet. Ideoq; etiam li-
 sis

xior quàm primo fascia circumligabitur, siquē; ea curatio ad quadragesimum diem perveniet: quāsi modus erit suppurationis, plus malagma quàm cratū ad digerendū proficiet. Si suppuratio viderit, neq; per quā supra scripta sunt discenti poterit, omnis mora vitanda erit, ne os infra videtur: sed quā parte maxime tumebit, demittendam erit candens ferramentum, donec ad pus perveniat, idq; effundendum. Si nusquam caput se effendit, ubi maxime pus subit, sic intelligimus: erecta cimelia totum locū illinimus, & siccari patiemur: quo loco maxime humor in ea perseveravit, ibi pus proximū erit, eaq; uri debet. Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandū, demittendum erit linamentum, aut aliquid ex penicillo, quod summū lino sit denintum, ut facile educatur. Reliqua eadem, quae in ceteris adustis facienda sunt. Ubi purum erit ulcus, ali corpus debet, ne tabes pernicioſa futura id malis subsequatur. Nonnunquā etiam lenius ipso osse adfecto, & inter initia neglecto, non pus, sed humor quidā muccis similis, intus coit, mollescitq; cōtra cutis, in quā simili vſtione utēdū est.

De spinæ curatione.

In spina quoq; est quod proprie notemus. Nam si id ex vertebra excidit, aliquo modo fractum est, locus quidem concavus fit, punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. Quo fit, ut homo in interiorem partem

tem subinde nitatur. Hac noscenda rei causa sunt. Medicamentis verò iisdem opus est, quæ plurima parte huius capituli exposita sunt.

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fracturum vel euulsorum communibus curationibus.

CAP. I.

Similes rursus ex magna parte casus curationesq; sunt humeris & femoribus. Communia etiam quadam humeris, brachijs, femoribus, cruribus, digitis. Siquidē ea minime periculose media franguntur. Quo propior fractura capiti vel superiori vel inferiori est, eo peior est. Nā & maiores dolores adfert, & difficiliter curatur. Ea maxime tolerabilis est simplex, transversa: peior, ubi fragmenta, atq; ubi obliqua: pessimum ubi eadem acuta. Nonnūquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo saepius excidunt, aliudq; super aliud effertur. Idq; ante omnia considerari debet, & sunt nota certa. Si suis sedibus mota, resima, pūctioisq; sensum representāt, tantū inaequalia sunt. Si verò non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod sit ubi loco suo non sunt, membrum id altero latere breuius est, & musculi eintumēt. Ergo si hoc depressum est, protinus id membrū oportet extendere. Nam nervi, musculiq; intenti per ossa contrahuntur, neq; in suum locum veniunt, nisi illos per vim aliquis intendit. Rarus, si primis diebus id omissum est, inflammatio oritur. Sub qua & difficile & periculose vis per-

nis adhibetur. Nam dissecio nervorum, vel cæcer
 sequitur, vel certum, ut * distissime alatur, pius. * mitissi-
 naq; si antè reposita ossa non sunt, postea rponē- me
 da sunt. Intendere autē digitum vel aliud quoq;
 membrū, si adhuc tenerū est, etiā unus homo po-
 test, cum alteram partē dextra, alteram sinistra
 prendit. Valentius membrum duobus eget, qui in
 diversa contendunt. Si firmiores nervi sunt, ut in
 viris robustis, maximeq; eorū feminibus & cruri-
 bus evenit, habenis quoq; vel linteis fasciis utrin-
 que capita articulorum deliganda, & per plures
 in diversa ducenda sunt. Vbi paulo longius quàm
 naturaliter esse debet, membrū vis fecit: tum de-
 mum ossa manibus in suam sedē cōpellenda sunt,
 indicinq; ossis repositi est, dolor sublatius. Et mē-
 brum alteri parti aequatum involuendum dupli-
 cibus triplicib;ve pānis, & in vino & oleo tin-
 ctis, quos linteos esse commodius est. Ferè verò fa-
 sciis sex opus est. Prima brevissima adhibēda, que
 circa frācturā ter voluta sursum versus seratur,
 & quasi in cochlea serpat, satisq; est eam ter hoc
 quoque modo circuire. Altera dimidio longiore,
 eaq; qua parte os eminet, ab ea si totum aequale
 est, undelibet super frācturā debet incipere priori
 adversa, deorsumq; tendere, atque iterum de
 frāctura reversa in superiore ultra priorem frā-
 cturam desinere. Super has injiciendum latiore
 linteo ceratum est, quod eas contineat, ac si qua
 parte os eminet, triplex ea pānis obijciendus, eo-
 dem

dem vino & oleo madens. Hæc tertia fascia com-
prehendenda sunt, quartaq; sic ut semper in-
quens priori aduersa sit, & tertia tantum in in-

* *faciant* inferiore parte, tres in superiori * *finiāt*, quia salius
est sapius circuire, quàm adstringi. Siquidem id
quod astrictum est, alienatur, & cancro opportu-
num est: articulum autem quàm minime vincire
opus est. Sed si iuxta hunc os fractum est, necesse
est. Deligatum verò membrum in diem tertium
continendū est. Eaq; iunctura talis esse debet, ut
primo die nihil offenderit, non tamen laxa visa
sit, secundo laxior, tertio iam penè resoluta. Ergo
tum rursus id membrum deligandum, adijcē-
daq; prioribus quinta fascia, iterum quinto re-
soluendum est, & sexto fasciis involuendum, sic
ut tertia & quinta infra, cætera supra fixentur.
Quotiescunq; autem soluitur membrum, calida
equa sonēdum est. Sed si iuxta articulū fractura
est, diu instillandum vinum est, exigua parte d'i
* *adco* edicēta, eadēq; omnia faciēda donec * *ab eo* in-
flāmatio soluatur, vel lenius quoq; quàm ex con-
suetudine id membrum fiat. Quod si septimus
dies nō dedit, certè novus exhibet. Tum facilius
ossa trahantur. Rursus ergo si parū cōmissa sunt,
icēmitti debent. Si qua fragmēta eminent, in sua
sedes reponēda sunt. Deinde eodē modo mēbrum
deligandū, si rulaq; super accommodanda sunt, que
fixa circūposuēq; ossa in sua sede contineant: &
in quam partē fractura inclinat, ibi ea latior, et
lenticulif

leuiorq; ferula imponenda est. Easq; omnes citra ar-
ticulari esse oportet resimas, ne huc ledant, nec ul-
tra astringi, quam ut ossa cōtineant: & in spatio
laxetur, tertio quoq; die paulū habenis suis coar-
tare: ac si nulla prurigo, nullus dolor est, sic mane-
re donec duę partes eius tēporis quod os quoq; cō-
seruet cōpleantur, postea leuius aqua calida fone-
re, quia primo digeri materiā opus est, tum eno-
cari. Ergo cerato quoq; liquido id* leniter est un-
gendū, perfricandaq; summa cutis est, laxiusq; id
deligendū est. Tertio quoq; aie soluedū sic, ut remo-
ta calida aqua, cetera eadē fiāt. Tantūmodo sin-
gulae fasciæ quoties resolute fuerint, subtrahātur.

*pleniter

De fracti humeri curatione.

Hæc communia sunt. Illa propria. Siqui-
dem humerus fractus, non sic, ut mēbrum
aliud intenditur. Sed homo collocatur alto sedi-
li, medicus autem humiliore aduersus. Vna fa-
scia brachium amplexa ex cervice ipsius qui le-
sus est, id sustineat. Altera ab altera parte su-
per caput data, ibi accipit nodum. Tertia iuncto
humero decorsum demittitur, ibi quoq; capi-
tibus eius inter se iunctis. Deinde ab occipitio
ipsius: minister sub ea fasciā quam secundo loco
posui, correpto: si dexter humerus ducendus est,
dextro: si sinister, sinistro brachio, demissum in-
ter semina eius qui curatur laculu tenet: medicus
super eam fasciā de qua tertio loco dixi *pal-
mam iniecit dextrā: si sinister, sinistram: si dexter
humerus

*planam

humerus sumatur, simulq; alterā fasciam minifter attollit, alteram premit medicus: quo fit, ut leniter humerus extendatur. Fascijs verò, si medium aut imum os fractum est, brevioribus opus est: si summū, longioribus, ut ab eo sub altera quoque ala per pectus & scapulas porrigantur. Proptinus verò brachium cum deligatur, sic inclinandum est id quod afficit, ut ante fascias quoq; sit figurandum sit: ne postea suspensum aliter, aliter cum deligabatur, humerū inclinet. Brachioq; suspeso, ipse quoq; humerus ad latus leniter deligendus est. Per quæ fit, ut minime moveatur, ideoq; ossa sic se habent, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum longissima debent, à lacerto breviores, sed sub ala brevissima. Sapientius ea resolvenda sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi rigescant, & inutile brachium efficiant. Quoties soluta sunt, fractura manu continenda, cubitus aqua calida fovendus, & molli cerato perficiendus, ferulaq; vel omnino non imponenda contra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores sunt.

De brachii fracti curatione.

AT si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrumque comminutum sit, non quòd alia in eiusmodi casu curatio admonenda, sed primū, ut valentius extendatur, si utrumq; os fractum est: quia necesse est minus nervos contrahi altero ossē integro, usq;

tasq; intendente. Deinde ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam ubi alterum integrum est, plus opit in eo, quam in fasciis, ferulisq; est. Deligari autem brachiū debet paulum pollice ad pectus inclinato. Siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit, idq; inuolutum mitella commodissime excipitur, quæ latitudine ipsi brachio, per angustis capitibus collo inijcitur, atque ita commode brachium ex cervice suspensum est. Idq; paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet. Quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id vinciendo alienum est. Fit enim brachium immobile, ac si nihil aliud quam dolori cursum est, idem qui fuit eius usus est.

De crurum femorumq; fractorum curatione.

In crure aquè ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. Commune verò ei simonq; est, quod ubi deligatum est, in canalem coniungendum est. Is canalis ab inferiori parte foramina habet, per quæ si quis humor excesserit, descendat: & à planta morâ, quæ simul & sustineat eâ, & delabi non patiatur: & à lateribus caua, per quæ loris datis morâ quidē crus femurq;, ut collocatū est, detineat. Esse etiâ is debet a plâta, si crus fractū est, circa poplitē: si femur, usq; ad coxam: si iuxta superius caput femoris, sic ut ipsa quoq; ei coxa sit. Neq; tamē ignorari oportet, si femur fractū est, fieri breuius, quia nunquàm in antiquum

κ statum

uius, limandum, & utrinq; scalpro limandum, tum ipsum recondendum est: ac si id manus facere non potest, volsella, quali fabri utuntur, inijcienda est, recte se habenti capite ab ea parte qua sima est, ut ea parte qua gibba est, eminens os in suam sedem compellat. Si id maius est, mēbranulisq; cinguntur, sinere oportet ea sub medicamentis resolui, idq; os, ubi iam nudatum est, abscindere: quod maturius scilicet faciendū est, prodestq; ea ratione & os coire, & vulnus sanescere. Illud suo tempore, hoc prout se habet. Nonnūquam etiam in magno vulnere euenit, ut fragmenta quadam velut emoriantur, neque cum ceteris cōeant. Quod hic quoque ex modo fluentis humoris colligitur. Quo magis necessarium est, sapius vlcus resolvere atq; nutrire. Sequitur verò, ut id os per se post aliquot dies excidat, cum tam misera antea cōditio vulneris sit, tamen id interdum maius diutiusq; facies. Sape enim integra cutis ossē abrūbitur, protinusq; prurigo & dolor oritur. Quæ solvere, si accidit, maturius oportet, & fouere aqua per æstatē frigida, per hyemem egelida: deinde ceratū myrteum imponere. Interdum fractura quibusdam, velut aculeis carnem vexat, quo à prurigine & punctionibus cognito, aperire id melius, eosq; aculeos pracidere necesse habet. Reliqua verò curatio in utroq; hoc casu eadem est, quæ ubi ictus protinus intulit puro iam vlcere. Cibis hic quoq; utendum est carnem producētibus, si breuius ad-
huc

huc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quam lenissimi generis inter ea demitti debet, sic ut capite paulū supra vulnus eni-
 neat, isq; quotidie plenior adigēdus est, donec par
 id membrum alteri fiat. Tum paxillus remouen-
 dus, vulnus sanandum est, cicatrix induita fouē-
 da frigida aqua est, in qua myrtus, hedera, aliaue
 similes verbenae sint: illinēdumq; medicamentum
 quod siccet, & magis etiam hic quiescendum, do-
 nec id membrum confirmetur. Si quando verò
 ossa non conserbuerunt, quae saepe soluta, saepe mo-
 ta sunt, in aperto deinde curatio est: possunt enim
 coire. Si vetustas occupavit, membrum exten-
 dendum est, ut aliquid ledatur. Ossa inter se ma-
 nu dividenda, ut concurrento exasperentur, ut si
 quid pingue est, eradatur, totumq; id quasi recens
 fiet. Magna tamen cura habita, ne nervi muscu-
 lūve ledantur. Tum vino fouendum est, in quo
 malicorium decoctum sit, imponēdumq; id ipsum
 uni albo mistum. Tertio die resoluendum, foven-
 dumq; aqua, in qua verbenae, de quibus supra
 dixi, decoctae sint. Quinto die idem faciendum,
 struleq; circumdanda. Cetera & antè & post
 eadem faciendi, quae supra scripsi. Solent tamen
 interdum diuersa inter se ossa * coherere. Eoq; * cōserue-
 & breuius membrum & indecorum fit: & si re: vel co-
 capite acutiora sunt, adsidue punitiones sentiun-
 tur. Ob quam causam frangi rursus ossa & di-
 rigi debent. id hoc modo fit: Calida aqua multa

membrum id fouetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurq;: & inter hæc medicus pertrahens ossa: ut adhuc tenero callo manibus ea ducit, compellitq; id, quod eminet in suam sedem: & si parum valuit, ab ea parte, in qua os se inclinat, inuolutam lana regulam obijcit. Atq; ita deligando assuescere iterum vetustæ sedi cogit. Nunquam autem recte quidem ossa cæperunt, superincreuit verò nimius callus, ideoq; locus intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterq; id membrum perfricandū est ex oleo & sale & nitro, multumq; aqua calida salsa fouendū, & imponendum malagma quod digerat, astrictiusq; alligandum, eletribusq; & præterea vomitu utendum. Per quæ cum carne callus quoq; extenuatur, confertq; aliquid de sinapi, quod cum ficu in alterum pariter membrum impositum, donec id paulum erodat, eoq; euocet materiam. Ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitæ reuertendum est.

De luxatis ossibus.

CAP. XI.

AC de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modò qua innecta sunt inter se debiscunt, ut cum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito, & in crure tibia à sura, interdum à saltu, calcis os à talo, quod raro tamen fit. Modò articuli suis sedibus excidunt. Antè de prioribus dicam. Quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus canus est.

est, depressusq; digitus sinum inuenit. Deinde
 grauis inflammatio oritur, atq; in talis precipua.
 Siquidem fibres quoq; & caneros & neruorum
 vel distentiones vel rigores, qui caput scapulis
 annectunt, mouere consuevit. Quorum vitando-
 rum causa facienda eadem sunt, qua in ossibus
 molibus laesis: ubi aliquid incidit, protinus his lo-
 cis proposita sunt, ut dolor tumorq; per ea tollan-
 tur. Nam diducta ossa nunquam rursus inter se
 iunguntur, & ut aliquid decoris eo loco sit, nihil
 usus admittitur. Maxilla vero & vertebra o-
 mnesq; articuli cum validis nervis comprehen-
 dantur, excidunt: aut vi expulsi, aut aliquo casu
 nervis vel ruptis vel infirmatis: faciliusq; in pue-
 ris & adolescentulis, quam in robustioribus: hiq;
 elebuntur in priorem & in exteriorem partem,
 quidam omnibus modis, quidam certis. Suntq;
 quaedam communia omnium signa, quaedam pro-
 pria sunt cuiusq;. Siquidẽ semper ea parte tumor
 est, in qua os prorũpit: ea sinus, à qua recessit. Et
 haec quidẽ in omnibus deprehenduntur, alia verò
 si in singulis. Quae simul atq; de quoq; dicam, pro-
 ponẽda erunt. Sed ut excidere omnes articuli non
 possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim
 nonnunquam compellitur, neque in spina verte-
 bra, neq; ea maxilla qua utraque parte prolapsa
 antequam reponeretur, inflammationem mouit.
 Rursum qui neruorum vitio prolapsi sunt, com-
 pulsi quoque in suas sedes iterum excidunt. At

quibus in pueritia exciderunt, neq; reposita sunt, minus quam ceteri crescunt. Omniumq; , quæ loco suo non sunt, caro ea increfcit, magisq; in proximo membro, quam in ulteriore. Viruta si humerus loco suo non est, maior in eo ipso fit, quam in brachio: maior in hoc, quam in manus acie. Tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior aut minor usus eius membri relinquitur: quoq; in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur. Quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa occupavit, tum conquiescat, laceffendum non est: ubi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Multum autem eo confert & corporis & nervorum habitus. Nam si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur. Sed & primo facilius excidit, & postea minus fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, melius continent. Sed id quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem lenare, super succida lana ex aceto imposita. A cibo, si valentioris articuli casus est, triduo: interdum etiam quinque diebus abstinere debet. Bibere aquam calidam dum sitim finiat. Curiosusq; hoc facere his ossibus motis, quæ validis plenisque musculis continentur: si vero etiã febris accessit, multo magis: deinde ex die quinto fovere aqua calida, remotaq; lana ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoque adiecto donec omnis inflama-

mati

matio finiatur. Tunc in frictionem ei membro adhibere, cibis uti bonis, uti vino modice, iamq; ad usus quoq; suos id mēbrum promouere : quia motus ut in dolore pestifer, sic aliàs saluberrimus cōtori est. Hæc cōmunia sunt, nūc de singulis dicam.

De maxillæ luxatæ curatione. CAP. XII.

Maxilla in priorem partem propellitur, sed modo altera parte, modo utraque. Si altera, in contrariam partem ipsa, mentumq; inclinatur, dentes partibus non respondent, sed sub his qui secant canini sunt. At si utraque, totum mentum in exteriorē partem promouetur, inferioresq; dentes longius quàm superiores excedunt, intentiq; super muscoli apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est, sic ut minister à posteriore parte caput eius conlineat : vel sic, ut iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem & caput eius scorteo puluino duro, eoq; caput per ministrum orgeatur, quo sit immobilius. Tum medici digiti pollices linteolis vel fasciis, ne dilabantur, inuoluti in os eius conueniendi: ceteri extrinsecus admoendi sunt. Vbi vehementer maxilla apprehensa est, si una parte procidit, cōcutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. Tunc simul & caput apprehendendum, & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est, sic ut omnia penè uno momēto fiant. Si in utraq; parte prolapsa est, eadē omnia facienda, sed equaliter

liter retro maxilla agenda est. Reposito osse, si cum dolore oculorum & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus vero quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibis conveniat, tum his precipue, adeo ut sermo quoque frequenti motu oris per nervos ladat.

De capite luxato.

CAP. XIII.

Caput duobus processibus in duos sinus summa vertebra demissis, super cervicem contineri in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt, quo fit, ut nervus sub occipitio extendatur, mentum pettori adglutinetur, neque bibere is, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat. Quibus celerrime mors supervenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio eius rei ulla sit, sed ut res indicijs cognosceretur, & non putarent sibi medicum defuisse, si qui sic aliquem perdidissent.

De spina luxata.

CAP. XIII.

Idem casus manet eos, quorum in spina vertebra exciderunt. Id enim non potest fieri nisi ex medulla, quæ per medium, & duobus membranulis, quæ per duos a lateribus processus feruntur, & nervis, qui continent, ruptis. Excidunt autem & in posteriorem partem, & in priorem, & supra septum transversum, & infra. Si in utranque partem exciderint, à posteriore parte vel tumor, vel sinus oritur. Si super septum

id

incidit, manus resolvuntur, vomitus aut distētio nervorū insequitur, spiritus difficulter movetur, dolor urget, et aures obtusa sunt. Si sub septo, finis resolvuntur, urina supprimitur, interdū etiā sine voluntate prorumpit. Ex eiusmodi casibus, ut tardius quā ex capitis, sic tamē intra tridnū homomoritur. Nā quod Hippocrates dixit, vertebra in anteriorem partē prolapsa, primum hominem collocandū esse, & extendendū, tum calce aliquē super ipsum debere consistere, id intus impellere: in his accipiendū est, quae paulum exceſſerunt, non in his, quae toto loco mutata sunt. Nennunquam enim nervorum imbecillitas efficit, ut quāvis non exciderit vertebra, paulū tamen in anteriorem partem promineat. Id non iungulat, sed ab interiori parte non contingit quidem posse: ab exteriori si propulsum est, plerūq; iterum redit: nisi, quod admodum rarum est, vis nervis restituta est.

De humero luxato.

CAP. XV.

Humerus autem modo in alam excidit, modo in partem anteriorem. Si in alam delapsus est, & vilius cubitus recedit ab latere, rursum iuxta eiusdem partis aurem cum humero porrigi non potest, longiusq; altero id brachium est. Si in anteriorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen quā naturaliter, difficiliusq; in anteriorem partem quā in posteriorem cubitus porrigitur. Igitur si in alam humerus excidit, & vel puerile adhuc est corpus vel molle, certe

certe & imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili, & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat, alteri ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem humerum sub ala cingere, simulq; & latum os, & altera manu brachium eius ad latus impellere. At si vastius corpus, nervisque robustiores sunt, necessaria est spatula lignea, & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos pervenit. In qua summa capitulum est rotundum, & leniter canum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In ea vna foramina tribus locis sunt inter se spatio distantibus, inq; ea lora mollia coniunguntur. Ea; spatha fasciæ inuolutæ, quo minus tactu laedat, ad alam à brachio diriguntur, sic ut caput eius summa ala subiciatur. Deinde, loris suis ad brachium deligatur, uno loco paulum infra humeri caput, altero paulum supra cubitum, tertio supra manum. Cui res protinus interualla tunc quoq; foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum traiecitur, ita alte, ut consistere homo ipse non possit, simulq; in alteram partem corpus demittitur, in alteram brachium intenditur. Eo; fit ut capite ligni caput humeri impulsus, in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas alias esse rationes scire facile est uno Hippocrate lecto, sed non alia magis vñs comprobata est.

est. At si in priorem partem humerus excidit, sapius homo collocandus est, fasciaq; aut habena media ala circumdata est, capitaq; eius post caput hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumq;, ut ille habenam, hic brachium extendat. Deinde, medicus caput quidē hominis sinistra debet repellere, dextra verò cubitum cum humero attollere, & os in suā sedem compellere, faciliusq; id in hoc casu, quàm in priore reuertitur. Reposito humero, lana ala subijcienda est. Si in inferiore parte os fuit, ut ei opponatur. Si in priore parte, ut tamen commodius deligetur. Tum fascia primum sub ala obvoluta, caput eius debet comprehendere, deinde profectus ad alteram alam, ab eaq; ad scapulas, rursusq; ad eiusdem humeri caput tendere. Sapiusq; ad eandem rationem circummagi, donec bene id teneat. Vincētus hac ratione humerus commodius continetur. Si adductus ad latus sit, ad id quoq; fascia deligatur.

De Cubiti luxati curatione. CAP. XVI.

In cubito autem tria coire ossa, humeri, & radij & cubiti ipsius, ex his quæ prima parte humerus voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus qui innexus humero est ab hoc excidit, radius qui adiunctus est, interdum trahitur, interdum subsistit. In omnes verò quatuor partes extendere cubitus potest: sed si in priorem prolapsus est, extensum brachium est, neq; recurvatur. Si in posteriorem, brachium curvum est, neq; extenditur,

tur, breuiusq; altero est. Interdum fibrem vomitumq; bilis mouet. Si in exteriorem interioremue brachium porrectum est, sed paulum in eam partē à qua os recessit recuruatum, quicquid incidit, reponendi ratio una est. Neq; in cubito tantū est, sed in omnibus quoq; membris longis, quæ per articulum longa testā iunguntur. Virunq; membrā in diuersas partes extendere, donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte, in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendendi tamen alia atq; alia genera sunt, prout nervi valent, aut ossa huc illucue scederunt. Ac modo manibus solis videndum est, modo quadam alia adhibenda. Ergo si in priorē partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus, interdum etiam habenis iniectis satis est. Deindero tundum aliquid à lacerti parte ponendum est, & super id repente cubitus ad humerū impellendus est. At in alijs casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quæ fracto cubito suprā posita est, & tum ossa reponere. Reliqua ratio eadem est, quæ in omnibus. Celerius tantum & sapius id resoluendum est, multoq; magis aqua calida fouendum, diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius, quàm in ullo alio articulo, siue extra remansit, siue intus reuertit, callus circumdatur, isq; si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

De manu luxata.

CAP. XVII.
Mancos.

Manus quoq; in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut pollicem, aut ad minimū digitū convertitur. Reponi non difficilimè potest. Super durum locū & renitentē ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet, sic ut prona sit: si in posteriorem partem os excidit, supina: si in priorem, si in interiorem exteriorēve, in latus. Ubi satis pressi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. At hic, quæ in priorem posterioremve partē prolapsa sunt, superimponendum durū aliquid, idq; supra prominens os manu urgendum est, per quod vis adiecta facilius in suam sedem compellit.

De Palma.

CAP. XVIII.

In palma quoq; ossa interdum suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. In latus enim moveri paribus ossibus oppositis non possunt. Signum id solum est, quod omnium commune est, tumor ab ea, in quam os venit: sinus ab ea, à qua recessit. Sed sine intentione digitorum, tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur.

De digitis.

CAP. XIX.

At in digitis totidem fierè casus, eademq; signa sunt, quæ in manibus. Sed in his extendendis non æque vi opus est, cum & articuli
bren.

breniores, & nervi minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem, vel in posteriorem partem exciderunt, tum iam palma cōpelli, atq; id quod in latus elapsum est, digitis restitui.

De Femore.

CAP.

XX.

Cum de his dixerim, de his quoq; quæ in crucibus sunt, videri possum dixisse. Siquidem etiam in hoc casu quædam similitudo est femori & humero, & tibia & cubito, pedi & manui. Quædã tamẽ separatim quoq; de his dicẽda sunt. Femur in omnes quatuor partes promouetur, sæpißime in interiorem, deinde in exteriorem, raro admodum in priorem, aut posteriorem. Si in anteriorem partem prolapsum est, crus longius altero & vastius est: extrã enim pes ultimus spectat. Si in exteriorem, breuius rarumq; fit, & intus inclinatur, calx ingressu terrã non contingit, sed planta ima, meliusq; id crus superius corpus, quam in priore casu fit, minusq; baculo eget. Si in priorem crus extensum est, implicariq; non potest, alteri cruri ad calcem par est: sed ima planta minus in priorem partem inclinatur, dolorq; in hoc casu præcipuus est, & maxime urina suppressitur. Vbi cum dolore inflammatio quicnit, commode ingrediuntur, totusq; eorum pes est. Sed & si in posteriorem extendi non potest crus, breuiusq; est, ubi constitit, calx quoq; terram non contingit. Magnuum autem femori periculum est, ne vel difficul-

ter reponatur, vel repositū rursus excidat. Quidā iterum semper excidere contendunt, sed Hippocrates & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoria prodiderunt. Neq; tot genera machinamentorum quoq; ad extendendū in hoc casu finitur, Hippocrates, Andreas Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoque quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut hac falsa opinio est, sic illud verum est. Cum ibi valentissimi nervi, musculiq; sint, si suum robur habent, vix admittere: si non habent, postea non continere. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alterā ab inguine, alterā à genu intendi. Si validius, melius adducent, qui easdem habenas ad valida bacula deligant: tumq; eorum sustinū imas partes opposita mora obiecerint, superioresq; ad se utraq; manu traxerint. Etiamnū valentius in:ēditur membrū super scamnum, cui ab utraq; parte axes sunt, ad quos habenæ illæ deligantur, qui ut in torcularibus conversi, rumpere quoq; si quis perseveraverit, non solum extendere nervos & musculos possunt. Collocāndus autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus: sic ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsum est: ea etiam inferior, à qua recessit. Nervis extensis in priorem os venit, rotundum aliquid super inguen ponendum, subitoq; super id, genu adducendum

cendum est eodem modo, eademq; de causa, quæ idē in brachio fit, protinusq; si cōplicari femur potest, intus est. In cæteris verò casibus, ubi ossa vim paulū inter se recesserunt, medicus debet id quod eminet, retro cogere, minister cōtrā inde coxā propellere. Posito osse, nihil aliud novæ curatio requirit, q̃ ut diutius is in lecto detineatur, ne si motū adhuc nervis laxioribus femur fuerit, rursus erūpat.

De Genu.

CAP. XXI.

Genu quoq; & in exteriorē, & in interiorē, & in posteriōrē partē excidere notissimū est, in priorem non prolabi pleriq; scripserunt. Postq; id vero proximū esse: cum idē opposita patella, ipsa quoq; caput tibia contineant. Meges tamē eum cui in priorem partē excidisset, à se curatū esse memoria prodidit. In his casibus intēdi nervi rationibus iisdem quas in femore retuli, possunt. Et id quidem quod in posteriōrē partē excidit, eodē modo rotundo aliquo super poplitē imposito, adductoq; eo crure reconditur. Cætera verò manibus simul, tū ossa in diversas partes cōpelluntur.

De Talō.

CAP. XXII.

Talus in omnes partes prolabitur. Ubi in interiorem partē excidit, ima pars pedis in exteriorem partē convertitur. Ubi huic contrarius talus, contrarium etiā signum extat. Si in priorem partē erumpit, à posteriore talus nervus durus & insanus est, minusq; is opus est: si in posteriorem, calx penē conditur, plaga maior fit.

Rexon

Reponitur autem is quoq; per manus, prius in diversa pede & crure diductis. Et in hoc quoq; casu diutius in lectulo perseverandum est, ne is talis, qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis sirendo oneri cedat, rursusq; prorumpat. Calceamentis quoq; humilioribus primo tempore utendum, ne iunctura talum ipsum laedat.

De Planta.

CAP. XXIII.

Planta ossa iisdem modis quibus in manu, prodeunt, iisdemq; conduntur. Fascia tatummodo calcem quoq; debet comprehendere: ne cum mediam plantam imumq; eius vinciri necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat, ideoq; suppuret.

De digitis.

CAP. XXIIII.

In digitis nihil ultra fieri debet, quàm quod in his qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo contineri. Hac facienda sunt in his casibus, ubi sine vulnere ossa exciderunt. Hic quoque & ingens periculum est: & eo gravior, quo maius membrum est, quòve validioribus nervis aut musculis continetur. Ideoq; humeris, femoribusq; metus mortis est, ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoq; maior in utroque timor est, quo propius vulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse, prater digitos & plantas & manus dixit, atque in his quoque dilig

diligenter esse agendum, ne precipitarent. Quiddam brachia quoque & crura reposuerunt. Et ne cancri, distentionesque nervorum oriretur, sub quibus in eiusmodi casu fieret mors matura, sanguinem ex brachio miserunt. Verum ne digitus quidem in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet ante inflammationem, aut postea cum iam vetus res est. Si reposito quoque ossi nervi distenduntur, rursus id protinus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum vultu nullo loco motum, neque repositum est, sic iacere convenit, ut maxime cubantem iuvet, tantum ne moveatur, neve dependeat. In omni quoque tali morbo magnum ex longa fame praesidium est. Deinde excuratione eadem qua proposita est, ubi ulla fractis vulnus accessit. Si nudum os eminet, impedimento semper futurum est. Id quod excedit, abscindendum est. Imponenda quoque super arida linamenta sunt & medicamenta non pingua, donec qua sola esse in eiusmodi re sanitas potest, veniat. Nam & debilitas sequitur,
 & tenuis cicatrix induitur,
 qua necesse est facile noxa postea pateat.

✱

F I N I S.

Q. S E R E N I

S A M O N I C I

V I T A.

Q. Serenus Samonicus Gordiani iunioris
 in Caracalla, his verbis: Occisi sunt & in balneis
 plures, & in cœnis: inter quos Samonicus Sere-
 nus, cuius libri plurimi ad doctrinam extant. Ma-
 crobius quoq; Saturnalium tertio, carmina quæ-
 dam de urbibus denouendis in libro quin-
 to Reconditorum Samonici Sereni
 reperisse se ait. Supersunt ho-
 die hi hexametri, præ-
 cepta Medicina
 continen-
 tes.

Q. S E R E N I S A-
M O N I C I D E M E-
D I C I N A P R A E-
C E P T A S A L V-
B E R R I-
M A,

Antonii Molinii Matisconensis opera, di-
ligenter emaculata.



MEMBRORVM Series certo de-
ducta tenore
Ut stet, & cōsimilis medicina de-
sueat ordo,

Principio celsa de corporis arce loquamur.
Phœbe salutiferū, quod pangimus, asserere carmen,
Inuentumq; tuum prompto comitare sinore.
Tuq; potens artis, reduces qui tradere vitas
Nōsti, & in cœlum manes reuocare sepultos,
Qui colis Aegæas, qui Pergamæ, quiq; Epidaurū,
Qui quondam placidi tectus sub pelle draconis,
* tecta Tarpeias arces, atq; inclyta * templa petisti,
Depellens tetros presenti numine morbos,
* locutus Huc ades, & quicquid cupido mihi sapi * rogati
Firmaſti, cunctum teneris expone papyris.

Capiti medendo.

Balsama si geminis instillans auribus ad-
das,
Tum poteris alacrem capitis reparare vigorem.

Vel qua septenis censentur gramina nodis,
 Viriliter veltis, vel corno ex arbore sertum,
 Pulegiūmve potens una super aure locabis,
 Aut illud misto* recoquens clementer aceto.

* coctum

Cauta nare trabes: seu visco lintea nexo
 Induces fronti: seu trita gramina menta.

Spongia cum tepidis annexa liquoribus hymbris
 Profuit: aut hedera ex oleo* colata vetusto.

* decocta

Profuit & cochleis frontem tractare minutis.
 Si nocuit cerebro violentia solis aperto:

Sape chelidonia ex acido perducta liquore
 Sanavit: prosunt & amica papavera somno,

Si prius in lento madefacta* terantur oливо.

* coquantur

Hemicranio medendo.

Portio si capitis morbo tentetur acuto,
 Allia diversam lana contecta per aurem
 Iadulta prosunt, & eodem balsama pacto.

Allia vel ternis piperis terna addita granis,
 Trita lines: certam dabit hac tibi cura salutem.

Potrigini depellendæ.

Est insensibilis morbus, sed noxia forma.

Cum caput immensa pexū porrigine ningit,
 Copia farris vi frendentibus edita saxis.

Hanc poterit malua radix decocta lenare.

Aut tu seniculum, nitrumq; & sulphura vina

Contere, deinde caput permixtis ablue cunctis:

Furfuribusve novis durum miscebis acetum,

Ut varios crines tali des unguine puros.

Prodest & tarda demptus testudine sanguis,

*Et prodest cedro demissus ab arbore succus
Desinet interea glomerari farrea nubes,
Cessabitq; grauis crebra porriginis hymber.*

Capillo tingendo.

Q*uos pudet etatis longa, quos sancta senectus
Offendit, cupiunt properos abscondere canas,
Et nigrum crinem fucō simulare doloso,
His prodest acri contrita cupressus aceto,
Vel frons lentisci, vel tristia poma sabuci:
Lumbrici quoq; terrestres miscentur olivo,
Et iuuenem præstant rediuiuo flore capillum.
Præterea nuncum poterit depellere crinem,
Resina ex facili cara viscoq; coacta.
Ad rutilam speciem nigros flouescere crines,
Vnguento cineris prædixit Tullius autor.
Si prægnans artus captini sororis edit,
Dicuntur sæpius nigrantia lumina fingi.*

Phthiriasi arcendæ.

N*oxia corporibus quædam de corpore nostro
Progeniuit natura, volens abrupere somnos
Sensibus, & monitis vigilare incendere curas.
Sed quis non pæneat Pherecydis fata tragedi,
Qui nimio sudore fluens animalia tetra
Eduxit, turpi miserum quæ morte tulerunt.
Sylla quoq; infelix tali languore peresus
Corruit, & sædo se vidit ab agmine vinci.
Sapius ergo decet mordax haurire sinapi,
Vel nitro ac sale permistis, acidoq; liquore
Laxatis (ut sint simul allia) tangere corpus, aut*

*Plin. li. 7.
cap. 31.*

*Plin. li. 7.
cap. 44.*

*Aut lacrymis hedera, aut succo *perducere cedri. *perfun-*
Quin etiam fursur mŭſto medicatur aceto. dere
Vnda maris lendes capiti deducit iniquas,
Et quicquid cerebri defendit ſylua capilli.

Prurigini, papulis, ac ſcabiæ arcendis.

Illotus ſudor, vel copia nobilis eſcæ
 Sepe graui ſcabiæ correptos aſperat artus.
 Ergo lutum prodeſt membris adbibere fricatis,
 Quod facit ex aſino ſiccatus corporis humor,
 Nec pudeat tractare ſinum, quem bucula ſudit.
 Stercoris ex porco cinerem confundito lymphis,
 Sic pauidum corpus dextra parcente foueto.
 Proderit ex olto puluis, quem congerit alte
 Dulcibus ex latebris patiens formica laborum.
 Conuenit hinc tepido lita tradere corpora ſoli.
 Fermentes papulas *oleo curato liquenti,
 Aut acido Baccho miſcebis farra lupini, *papyro
 Atq; hinc in calido percures membra lauacro,
 Pruritus autem ſalſos leuat humor aceti,
 Siue maris *rabidi ſudor, cochleaq; minuta, *amidi
 Quarum contactu perimetur acerba libido.

Phrenesi, & capiti purgando.

EX vitio cerebri Phrenesis furioſa mouetur,
 Amiſſasq; refert frendens amentia vires,
 Siue calens febris iactatos exedit artus,
 Siue meri guſtus, ſeu frigoris efficit aura,
 Conueniet calidis pecudum pulmonibus aptè
 Tempora languentis medica redimire corona.
 Illotis etiam lanis ſuffire memento.

*Ceritum saepe horrendi medicantur odores.
 Atq; ideo sanos etiam curarier est par.
 Purgatur cerebrum mansa radice pyrethri,
 Vngitur & succis, dederit quos parua sabucus,
 Expressusq; hedera mandatur naribus humer.
 Aut mistum ruta cerebro instillatur acetum.
 Non semper praesens dolor est sanabilis: ergo
 Cura magis prodest venturis obuia morbis.*

*De fluore capillorum, & maculis
 capitis tollendis.*

D*esluit expulsus morbo lititante capillus,
 Si raro lauitur, seu vis epota veneni,
 Seu salamandra potens, nullisq; obnoxia flammis,
 Eximium capiti tactu deiecit honorem.
 Nonnunquam variant maculae, parvisq; parumper
 Orbibus aspersum ducit noua vulnera tempus,
 apponito Viperae pellis cinerem his*: addito rebus,
 Roboreasve pilas vrsino iungito seuo,
 Vel testudineo mala permulceto cruore.*

*Humoribus, & perfrictionibus
 medendis.*

S*epe ita peruadit vis frigoris, ac tenet artus
 Ut vix quasito medicamine pulsa recedat.
 Si ranam ex oleo decoxeris, obijce carnem,
 Membra foue: parili sanat ratione rigorem
 Vrtica semen, perceptaq; frigora vincit.
 Et cernina potest mulcere medulla rigorem.
 Decoctum raphani semen cum melle vorabit,
 Sine fel vrsinum tepe facta dilue lymphia.*

Prodest

Proderit hoc potu, seu cassis oëtreæ testis
 Usta dabit cinerem, qui pro sale sumptus in escis
 Decutiet gelidum calefacto vertice virus.
 Nonnullus liquidum sumit mulsumq; sinapi,
 Atq; palato agitat retinensq;, vomensq;.
 Alia nonnulli mandunt, olei ve liquore
 Perfundunt calido cerebrum, nasiq; latebras.
 Quidam lactucæ credunt prodesse sapes,
 Curandi modus hic & sanis & utilis idem est.

Elephantiasis propellendæ.

Est elephas morbus tristi quoq; nomine dirus,
 Non solum turpans infundis ora papillis,
 Sed citâ præcipitans functo fata veneno.
 Huic erit aduersus cedri de cortice succus,
 Mustelaq; cinis, vel fusus sanguis ab illa.
 Nonnulli dixere serum prodisse bibendo.
 Mentastri folium potu, appositumq; salubre est.
 Nec frustra bulbos & sulphura iungis aceto.
 Præterea nitrum debes cum melle iugatum
 Spargere lacte bonis, varias sic ungere frontes.
 Cerussam, & chartâ, quâ gens Aegyptia mittit,
 Thure simul misceq; oleum, quod flore rosarum *Tunde
 Conditum est: line sic faciem, sic redde salutem.

Cutis & faciei vitis propellendis.

Quida si maculet faciem lentigo decoram,
 Nec prodesse valent nature dona benigna,
 Erucam atq; acidum laticem simul illine malis.
 Proderit & bulbus mellis dulcedine victus,
 Cruda ve dulcaci misceris rapa liquori.

Sanguis

Sanguine vel leporis morbus delabitur oris.
Frons salicis cum flore suo contrita medetur.

* sanant *Sepiola ciner. s ex istibus omni. * tollunt.*

*Cygnæos adipēs, hilari musceto Lyao,
Omne malum propere maculoso ex ore fugabis.
Horrebit si liuor atrox, aut nigra cicatrix,
Attrito sapone genas purgare memento.
Rugarum sulcos lentisci mastice tendens.
Si verò vitium est quod ducit ab impete nomen,
Hoc matulina poteris cohibere salina,
Sed folio platani, quod manūm mane vorabis.
Fæda fluunt curui quæ purgamenta cameli,
Vrentur, cineremq; dabunt, iungentur aceto
Mascula thura simul, diuinoq; cura valebit.*

Aurium vititis succurrendis.

Cum sanus teneras dolor alte sauciat aures,
Fraxinea in flammis fundit quæ talea succum
Instillet, siue obscurus ex virgine rores,
Aut succum ex folio, dederit quem populus alba.
Sape chelidonia rapidum sociatur acetum,
Adiunctoq; nitro procedit cura salubris.
Mentas lri liquor expressus conducere fertur,
Infusum violis oleum bene consulit auri.

Annoxa rubros si legeris arbore vermes,
Ex oleo tere, sic tepidos infunde dolenti.
Si verò obtusa sensus * remoretur in aure,
Lumbricos terra, senumq; ex anseris rauco
Excoque: sic veterem poteris depellere morbum.
Felq; bonis surdis etiam prodesse loquuntur,

Si iun

* morietur

Si iungas olida graue quod minxere capella.
 Si vero ^{*}incautas animal penetrauerit aures,
 Proderit admisto pavidum fel muris aceto.
 At si lymphæ nocens peruaferit, anseris aptus
 Immittetur adeps ceparum non sine succo:
 Qui grauis est oculis, sensum tamē auribus auget..
 Vis & Phœbigena diuinam discere curam,
 Quicquid vel annosis confecta doloribus auris,
 Alia tum septem numero, septemquē lupinos
 Cretaceam dabis in testam: in delphica frondis.
 Addatur, musto totum feruescat aceto.
 Doctus eris tepidos illinc immittere rores.

* in patu
 las

Oculorum dolori mitigando..

Summa boni est alacres hōi contingere visus,
 Quos quasi cūctodes, defensoresquē pericli
 Prospiciens summa natura locauit in arce:
 Sic tamen ut nullos paterentur desuper ictus,
 Atque supercilio pavidum tegerentur opaco.
 Sed dolor immeritum lumen si forte lacescit,
 Lana madens oleo nocturno connectitur apte,
 Vinentis venepæ lumen gestatur amicum.
 Ex folio caulis cineres, confractaquē thura
 Et lacicem Bacchi sata cum lacte capella
 Desuper induces, atque una nocte probabis..
 Hyblæ mellis succi cum felle caprino
 Subueniunt oculis dira caligine pressis.
 Veronica mansus succabit lumina succus.
 Si tenebras oculis obducit pigra senectus,,
 Expressa marathro gutta cum melle liquenti:

Defer:

Detergere malum poterunt, vel vulturis atrī
 Fella, chelidonia fuerint quis gramina nūsta,
 Hac etiam annosis poterunt succurrere morbis.
 Fel quoq; de gallo mollitum simplice lymphā
 Exacuet pueros dempta caligine visus.
 Siue columbarum sinus miscetur aceto,
 Sen fel perdiciis parili cum pondere mellis.
 Vina Chelidonia simili ratione iugantur,
 Efficiuntq; suo præclaros unguine visus.
 Aspera quinetiam mulcent & rupta reducunt.
 Si genus est morbi, miserum quod lumen adurit,
 Hic calor infuso mitescit lacte caprino.
 Anguibus creptos adipēs arugine misce,
 Hi poterunt ruptas oculorum iungere partes.
 Si verò horrēdum ducunt glaucomata *peplum,
 Spiritus alterius prodest, qui grana cimini
 Pallentis mandens visus exhalat in ipsos.
 Si tumor *insolitus typho se tollat inani,
 Turgentes oculos vili circumline cæno.
 Dentium vitio, & oris fœtori
 medendo.

*plūbum
 *infestat,
 rufos &
 gliscit in
 orbes,

H Aud facile est acerrē dentis tolerare dolorē,
 Quo magis ē aquū medicā pernoscere curā,
 Cum Baceho violas decoxeris, ore teneto:
 Mansius item prodest succis oleaster acerbis:
 Hinc oscedo fugit, lingua quoq; vulnera cedunt.
 Cum vino piper & nitro tepidum inde dolenti.
 Sape chelidonia succo vel lacte capelle
 Sanescunt dentes, aut tauri felle iuvantur.

Aut acidi latices clauso voluntur in ore.
 Manditur apta rubus gingivis, & bona labris.
 Lentiscus myrtusq; emendant oris odorem.
 Quod verò assumpsit nomen de dente fricando,
 Cervino ex cornu cinis est, aut ungula porca
 Torrida, vel cinis ex ovis, sed non sine vino,
 Muricis aut tostis, vel bulbi extrincta favilla.
 Ambitiosa putas, sunt ista salubria cunctis,
 Exesos autem dentes si forte querêris,
 Vre finum muris, patulis & hiatibus adde,
 Vel cinerem dentis cervini extinguere aceto
 Convenit, atq; canis immittere partibus apte.
 Prodest & pulvis lumbrici corpore tosto.
 Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.
 Sape etiam gelida gingivas collue lymphâ,
 Dentibus ut firmum possis servare vigorem.
 Si verò insandum proserpit ad intima vulnus,
 Permisiceto salem parili cum pondere thuris,
 Hinc tractato locum, miram experiere medelam.
 Aut tu sume pitam quæ caudis haret ovivis:
 Hæc siccata dabit molles, & fracta farinas,
 Huius & attritu tetrum mulcebitur vlcus.

Vux, faucibus, collo, & quæ mollien
 da sunt, medendis.

A Egrescunt tenera farces, cum frigoris atri
 Vis subijt, vel cum ventis agitabilis aer
 Vertitur, atq; ipsas flatus gravis inficit undas:
 Vel rabidus clamor fracto cum forte sonore
 Plannum radit iter. sic est Hortensius olim

Absump

Absumptus causis etenim confectus agendis
 Obtulit, cum vox domino vivente periret.
 Et nondum extincti moreretur lingua discreti.
 Ergo omni studio quæres inhibere dolorem.
 Simplicibus lymphis confunditur ærium mel,
 Additur excussus niuea similagine fursur,
 Decocta hac clauso simul exercentur in ore.
 Præterea fauces extrinsecus ungere prodest
 Ursino & tauri seuo cerisq; remissis,
 Omnia quæ geminis aquabis lancibus antè.
 Disce etiâ miram ex humili medicamine curam,
 Aëliaco melli iungas agreſte papaver:
 Decoctumq; simul mandes, mansumq; vorabis.
 Crinitæ porri radices quinq; coquantur,
 Hinc aqua non firuens voluatur fœnce sonora,
 Nec tamè in stomachû descendat gutta patentem.
 Si verò adflitam languor deiecerit unam,
 Tunc horas aliquot pronus recubare memento,
 Aut illam pulvis tostis releuabit anethi,
 Aut cinis ex cochlea, vel torrida brassica flammis.
 Verum angina sibi mistum sale poscit acetum,
 Quod refert clauso versatum agitare palato.

De rigore cervicis.

AT si cervices, duratq; colla rigeant,
 Mira loquar, geminus mulcebitur unguine
 Hic lōgū pariter nervos medicina sequitur, (poples,
 Anseris aut pingui torpentia colla fovebis.
 Illinitur valido multum lens cocta in aceto,
 Aut capre finus, & bulbi, aut cernina medulla,

Hec.

Hoc etiam immaros scilicet medicamine nervos.
Quos autem vocitant tolles, attingere dextra
Debebis, qua Gryllus erit pressante per unguem.

Tossi, & choleribus medendis.

NOxiæ si penitus cholærum sanare venena
Perspicias, cocta lactuca fronde lenabis.
Proderit & caules esse mere sape madentes.
Interdum fauces tussi quatiuntur atroci,
Alia tum sumes decocta, & melle peruncta,
Semina vel raphani permixta dulcia melle.
Aut si fraxinea semen de fronde reuellis,
* Interiora vora vetitus contingere dente.
Ouum melle teres domitum ferventibus undis,
* Integriora
Marrubiumque potes, hec faucibus optima sumes.
Fraxinabisq; gravem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho medendo.

Qui stomachum regem totius corporis esse
Contendunt, vera niti ratione videntur.
Huic enim validus firmat tenor omnia membra:
At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.
Quin etiam (nisi cura iuvet) vitare cerebrum
Fertur, & integros illinc auertere sensus.
Lactuca semen nigra quod lignea pila
Triverit, admixto ieiunus sumito melle;
Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit uno,
Aut tritum semen raphani, mulsumq; iuvabit:
Sive dua partes absinthii, & tertia vora
Decoctis potentur aquis, siliquaq; madentes,
Semina vel marathri sæta cum lacte capella.

Pulegium quoq; decoctum curabit anicè.
 Et potu, & fœtu stomacho conducit acetum.
 Seu cochleas undis calefactas ac propè villas
 Suppositis torre prunis, vinoq; garoq;
 Perfusas cape, sed prodest magis esse marinas.
 At male digestis si crafula sæuiet escis,
 Ex pipere, & calida florem de rore marino
 Ebibe, seu salibus piper adde, & tenue cummianum.
 Quæ coctis *tinges epulis, & rapta vorabis.
 Aut cubitum pergens succu cape tristis * anethi.
 Ventriculis mergi raptus sal tritus & villus
 Tosto pane super, piperis quoq; pulvere multo
 Miscentur, capies diuinum munus in istis.
 Proderit hoc stomacho, villas & concoquet escas
 Grana peregrini piperis diffundito quinq;
 Niliaco melli, quæ mane inscria capeffes.

Pelli, vomitui, vel phthisi arcendis.

L Vtea si crescant, & cunctis noxia fellis,
 Allia parua noue, piperis tot pmole grana,
 Quæ cyatho diluta gari mandesq; bibesq;
 Hac iterum septena capis, post deniq; quina.
 Præterea canles, frondet si paruo sabucus,
 Decoctos sale permisceas, ac iungis olino.
 Tunc capis, ac tali auxilio fella borrida purgat.
 Profunt & pelagi latices, quos pondere infuso
 Dulcibus associas lymphis, melliq; liquenti.
 Et viuens prodest ex ubere succus asella,
 Si tepido * vino infundas, ac mella piperis.
 At vomitum radix narcissi pota mouebit.
 Si verò phthisis annoso sedet improba manto,

* tanges
* aceti

* vinum

Intritas vino cochleas haurisse innabis.
 Proderit & veteris seni pila sumpta suilli.
 Carne asina senosq; capra medicina salubris.

Mammis sanandis, vel stringendis.

Vera facundo multum Lactantia succo
 Sæpe sibi noxa nimium nutando fuerunt.
 Ecce igitur valida duri reprimuntur aceti.
 Post partum tumidas iniuste assurgere mammæ
 Interdum aspicias, harum mala commemoratur.
 Murimus furus, ex pluvio sedare liquore.
 Sin autem clausas penitus dolor angit acerbus,
 Lumbricis terra turgentes unge corymbos.
 Si castigatas studium est præstare papillas,
 Ex hedera sercis ambas redimire memento
 Protinus, & raptas fumis mandare coronas,
 Anseris aut senum pariter cum lacte tepenti,
 Aut onum* illinito tulerit quod garrula perdix.
 Præterea pluvio decocta papavera rore
 Harescunt multis positi* dissolvenda diebus.
 Vis & Phæbigena cælestia sumere dona,
 Vbera cum tetris laniata doloribus* horrent?
 Quis rametis, et qua nomine præstion herba est,
 Et qua vulgari sermone Insana vocatur,
 Græcos hyoscyamon propria scito dicere lingua,
 Nec non & calami radix, lapathiq; legumen
 ista dabunt miras (experto crede) medelas.

* alias
 impositio
 * absol-
 uenda
 * urgent

* collectioni cibi, aut sanguinis * restringendæ.
 Si stomachus novum concoctas expuit escas,
 Et magis atq; magis vitium* renouet do valescit, * absti-
 nenda.
 * recolectio

Allia cademus, crebrumq; trahemus odorem.
 * fertur de Sin etiam rutulus* confertur pectore sanguis,
 Sorbitium mente, raphanus vel cocta iuvabit.
 Sape lapis teritur (Specularemi nomine dicunt)
 Et mistis hauritur aquis, sistitq; cruorem.
 * robore Uritur interdum raptus de* iubere cortex,
 Et cinis ex calido prodest epota Lyco,
 * pellis. Quorum cinis, aut cochlearum, aut deniq; * melio
 * Aut ci- * Aut mansus salicum fructus prodesse putatur,
 nis saliciū Aut platani pilulas acri infundemus aceto,
 ramis Nullus erit sanguis, quem non cibus iste moretur.

Iecoris, & lateris vitis medendis.

ΕΛΙΣΙΟ -
 φάκω &
 salvia.
 Si molles iecoris fibras dolor hauriet acer,
 Protinus ex mulli potada elelisphacis herba
 Sumitur & semē, qđ fraxipus alta pfudit, (est.
 Vulturis atq; iecur, vel ius perdicis aprica.
 Præterea simili drachma pix dura piperq;
 Franguntur, sic in mollito pulvere iuncta
 * Egelidis miscentur aquis, recreantq; bibentem.
 Absinthi quoq; decocti potabitur humor,
 Si latus immeritum morbo tentatur vento,
 Accensum tinges lapidem stridentibus undis,
 Hinc bibis, aut aceru radicem tundis, & vni
 Cum vino lapis, hæc præsens medicamen habetur.
 Quid referam multis compasta * Philonia rebus?
 Quid loquar antidotū varijs? quis ista requirit?
 At nos pauperibus præcepta feramus amica.
 Nec non & iecoris quaeretur fibra lupini,
 Iungunturq; simul costum, foliumq; piperq;
 Quæ diluta mero dantur potanda Lyco.

Est & vis morbi, quod telum commemoratur,
 Cum subito dolor insanus furit incitus iclu,
 Persicon huic potum è nuce traditur interiore,
 Quæ mihi curâ satis casu monstrantæ probata est.

spleni curando.

Quando lien tumido circûligat ilia vinclo,
 Et pleni splenis demôstrant mēbra rigore,
 Mollibus ex hedera tornantur pocula lignis,
 Hinc trahet effuetos ager quoscunq; liquores,
 Aut viridis coctorum holerum potabitur unda.
 Proderit exusto sternalis hirudo cruore,
 Sive myrica potens, seu ros cum pane marinus,
 Aut hedera succus potu apposituq; iuvabit.
 Nec non intectum ferro, quam videris alnum;
 Huic liber eripitur ferro sine; decoquiturq;
 Donec victarum pars tertia subsit aquarum.
 Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.
 Quonnulli memorant consumi posse lievem,
 Erum si semper ieiuno sumpsit ore.
 Arida fucus item feruente domatur aceto,
 Et trita illinitur, ve! splen apponitur hædi.
 Marrubium in vino potum prodesse loquuntur,
 Præterea piper, ac nepeta cum flore & anethum,
 Capparis atq; apium, buglossaq; iungitur una:
 Horum decoctos latices potare salubre est.
 Pulegium, abrotonum nitida cum mastice coctum
 Ac thymbra speciē (quam cōmemorat cephalotē)
 Prædixit spleni Deus Ida posse mederi.
 Dulcia, Plautus ait, grandi minus apta lieui.

Splē tumidus vocet, & risum tamē addit iurpū,
 Ut mihi Sardois videatur proximus herbis,
 Irrita qua miseris permiscet gaudia fatis.
 Dicitur exēctus faciles auferre cachinnos,
 Perpetuoq; auo frontem prestare seueram.

Præcordiis sanandis.

Languida si duro turgent præcordia merbo,
 Miscetur mulsæ farris sextarius unus,
 Nec non & lini tunsum, siliquaq; legumen.
 Hac decocta simul, nondumq; tepentia nectes.

* teres

Aut qua poma Cydon Cretæis misit ab oris
 Cocta * lines, durum ut possis mollire tumorem.
 Ocyma præterea, bulbivæ linuntur amari.

Proderit & lymphis corpus mersare marinis.
 Quin etiam catulum lactantē apponere membris
 Conuenit, omne malum trāscurrere fertur in illū.
 Cui tamen extincto munus debetur humandi.
 Humanos quoq; contactus mala tanta sequuntur,
 Et iunctus vitium ducit de coniuge coniunx.

* trite iū-
ges

* decator

thoma vi

te voca-

tur

Quod superest * thridaci iunges ramenta carina,
 Quod decem ex rebus * confit simul atq; vocatur,
 Mastichis addentur fracta iam mollia farra.
 Talibus auxilijs præcordia tuta resident.

Lumbis & renibus sanandis.

Cum sanis penitis hærens iniuria lumbis,
 Igne lapis candēs datur exultatibus undis,
 Hoc poteris potu tristem superare dolorem,
 Aut pice cum melli nitrum sulphurq; & acetum
 Succida lana rapit contacta calentibus istis,
 Proderit hanc ægris crebro perducere membris.

Aut caput asparagi cum vino sume vetusto,
 Sen manus appone, modus conducit uterq;.
 Aut adipi muscum lumbis inducito sulphur.
 Sape chelidonium cum succo Palladis addes,
 Farraq; que tremulis prosunt sudantia flammis.
 Fertur amygdalina succus nucis esse bibendus:
 Piusitur, ac tepidis sorbebitur addida lymphis.
 Aut tres ex vino coctileas feruescere coges.
 Camq; suis donibus franges, piperis quoq; grana
 Ter quinq; adicias, potuq; iuuaberis illo.
 Furfur item parca fuerit cum feruidus unda,
 Post olco madidus * succis immittitur aptis,
 Que vix passuris * vrentes addito membris.
 Prodest ceruina * vehemens natura medulla,
 Nec nocuit ciceris cocti potasse liquorem:
 Aut mistam teneris * maluam contundito porris,
 Contritumq; simul cum mastiche cõfer anethum,
 Quodq; decem rebus cõponi ex nomine clarũ est,
 His continget locũ. Deus hac mibi certa probauit.
 vndis

* saccis
 * vrētia
 iungito
 * medicas
 * madi
 damq; ele
 lissphacon
 vndis

Ventris dolori mitigando.

S I dolor insanus tota desecuit in aluo,
 Heminis tribus in lymphatu decoque tritũ,
 In vino prius hyssopum, validam quoq; rutam,
 * Aut apium, donec pars duplex desit aquatum. * Atq;
 Potus erit medicus non detractante palato.
 Præterea ninei sterilis cocta vritur oui.
 Que postquam in tetrã fuerit conuersa farinam,
 Ex calidis potatur aquis, & pota medetur.
 Nec non iungenda est vtero noua virga myrica,

Illa sa hac ferro terræq; intacta teratur.
 Aut medio ventris prodest aspersere terram,
 Quom signauerunt vestigia pressa rotarum.
 Proderis & puluis facili sub cardine raptus.
 Quin etiam ex lymphis tritum potare cuminum
 Conueniet, quod iam nobis documenta probauit.
 Menta quoq; hoc pacto medicos dabit hausta sa-
 ciliacos autē recreabis pane salubri, (poris.
 Quem madido farre effuies, ac mollibus ouis:
 Quorum testa fero prius euanescere aceto
 Refert, & teretes bulbos mollire terendo,
 Cumq; his Linai durum potare fluentum.

H. Dropsi depellendæ.

Corrapti iecoris vitio, vel splenis, acerbus
 Crescit hydrops, aut cū siccata fibre medulla
 Atq; auida fauces gelidum traxere liquorem,
 Tum lymphæ interius vitio gliscente tumescit,
 Secernens miseram proprio de viscere pellem.
 Conueniet tenera radix dicolthi sabuci
 In geminis calidi cyathis potanda Lyai.

Nec non & tepidi canuolues corpus arenæ.
 Apposituq; lenes nepeta, gustuq; iuuabunt.
 Helleboro quoq; purgatur lymphaticus error.
 Aut huius vice quod fert semen lenta genista
 Miscetur, mulsis & cantis ducitur undis.
 Sape & si, lino pelluntur noxia Baccho.
 Est qui fraudalidum* friso sale miscet acetum.
 Atq; olei succo refricant* albescentia membra.
 Fraxineum semen cum Bacchi rore bibendum est.
 Nec non apposito curantur dropace membra,

nitro
 turgētia

* silicis

Aut calido* salicis radicem mollit Iaccho,
 Qui subito riptos ventos, succosq; renellit.
 Unguine quo frangit vires languoris aquosi.

Ventre molliendo.

Specie, id
est quali-
tate.

Sæpe cibi specie, vitio vel corporis ipso,
 Potibus aut duris restricta merabitur alvus.
 Vincetur talis mora gramine Mercuriali,
 Cuius aquam cocti minimo cum melle bibemus.
 Prunaq; conveniunt, qua mittit elixa Damascus.
 Multos præterea medicum componere succos
 Assuerunt: pretiosa tamen cum veneris emptum
 Falleris, frustra; immensa non sumata fundes.
 Quin age, & in tenui certam cognosce salutem.
 Aut igitur testum lana supponis alumen,
 Aut edis in patinis tenera decocta sabuci,
 Vel cum lacte capra salsum mulsumq; capeffes.
 Crede tamen potum meliorem Lictis equini.
 Dicitur hic validos asina pervincere succos.
 Sylvestris fici lacrymam prodesse loquuntur.
 Quodq; satis melius verbis dicemus Horati
 Mugilis, & viles pellent obstantia conchæ.
 Sed cochleas prius est vitula aut fursare pasci.
 Purior hinc gustus noxa sine mouerit aluum.
 Sæpe thalassomeli* innectū cumulanimus hymbri, * adiecto
 Hac purgant, parili fuerint si pondere mista.

solutioni ventris, & dysenteria compescendæ.

Tam varij casus mortalia secla fatigant,
 Ut sint diversis obnoxia corpora morbis.
 Sæpe etenim nimio cursu fuit impetus alui,

*Pulegium hinc potens domitum fruentibus undis:
 Si vero in lapides densus conuertitur humor,
 Qui retinet cursus, genitumq; dolore frequentat,
 Pūgītē Saxifragam seu fontigenam sic currere credunt.
 Præterea semen myrti sylvæstris Iaccho;
 Atq; oleo mustum bibitur, nec desit acetum,
 Vinaq; sumantur frillo condita cumino,
 Sine palumborum capitur finius acre ferorū
 Dulcacidis sparsum succis trituq; solutum,
 Nec non obscurus, capra potabitur humor.
 Obruūt hic morbum, calefactaq; saxa remittit.*

Conceptioni, & Partui.

I Rēta coniugij sterilis si munera languent,
 Et sobolis spes est, multos iam vana per annos,
 Famineo fiat vitio res, nec ne, silebo:

Hoc poterit quartus magni monstrare Lucreti.
 Sed natura tamen medicamine victa potenti
 Sæpe dedit satius studio curante paratos.
 Aut igitur leporis consumit saxina vuluam.
 Aut ovis in stabulis fractas eum ruminat herbas
 Pendentem spumam molli de ducit ab ore,
 Atq; illam maminis misto potare falerno.
 Mercurialis item capitur communiter herba:

Sic cubitum noctu coniunx festinet uterq;
 Atq; ubi iam certum spondet pragnatio satum,
 Ut facili vigeat servata puerpera partu,
 Dictamnū bibitur, collicæ manduntur edules,
 At qui olim menses minus octo moratus in aluo,
 Irrumpit thalamos, & nexus soluit inertes.
 *Pulegiū quoq; purgati tunc convenit hymbet.

Regi, subau
 di partus.
 * Pulegio
 admixto
 cepit em
 oryo neq;
 aceto.

Cuius opem veram casus mihi saepe probant.
 Quinetiam stercus supponunt vulguris atrī,
 Sentiat ut minimi partus quā proximis urget.
 Qua etiam ruta & fragili miscetur anetho,
 Quae diluta simul vino, atq; exhausta medentur.
 Profluio cuiusq; sanguinis, & matrici subueniendæ.

ſentiat, sub
 audi ſœmpt
 na.

Si modicus plenus inat de corpore sanguis,
 Subuenit: at nimis cum vita funditur ipsa.
 Quapropter multo natis completa cruore
 Cum fluit, attritus cimex conducit odore.
 Lana oleo madesit, sed nondum luta rosato,
 Hac datur in nāres, vel claudet densius aures.
 Contritis prodest cochleio* perducere frontem,
 Aut galli cerebro, vel sanguine tinge columba.
 Quod nisi supprimitur sanguis, potadus et ipse est.
 Præterea Pharygis caput emetire papyris.

* obduce-
 re

Detrahe quod superest, alio genitalia nocte.
 Fæmineas prodest illinc vincere in imillas,
 Menstruus immesso si profluit impete sanguis.
 Succida lana malos remoratur subditi cursus,
 Mortuâ quinetiam producit corpora partu.
 Sed quacumq; fuit, vitæ immoderata cruoris,
 * Suberectus cortex calidis potatur in undis.

* Suber-
 nus

Antequinuatim studio vincente terendus.
 Pulegij calido purgatur sæmina potu.
 Sed si forte cruor clausa cunctabitur aluo,
 Aut molles nepeta, aut ruta quacumq; bibentur,
 Aut si puniceos fundis ut sicca liquores,
 Marcubium ex passo, tritum perfunditur undis,
 Hi poterunt haustus rursus purgare colorem.

* diſſipat detr. Reliquias partus* eadem tibi detrahit herba.
 Quod ſi ſæminei properabit ſanguinis humber,
 Eſt qui fruſtra mole percuffu decuit uno,
 Quorum aliquot lenis tectū ad præcordia pellit,
 Hac ſimul incantans ſiſti debere cruorem,
 Ut lapis ille via ſolitos iam deſtitit orbes.

Internecandis, quæ oculos impediunt.

Mobilis birſutas horret laſcinia ſetas,
 Et gaudet raptò nudari flore pilorum.
 Sed boia nonnunquam vellendi cauſſa videtur,
 Corpora cum releuat, ratio manifeſta ſalutis.
 Namq; oculos infeſta pilorum tela liceſſant,
 Quodq; illis dederat vallum natura tenendi,
 Inde inimica ſeges proprios deſcendit in orbes.
 Ergo locum criminis vulſi continge cruore,
 Quæ dat auis, tremulis ſimulat quæ pellibus alas.
 Præterea quiſcunq; voles auertere ſetas,

* obdu- cere Atq; in perpetuum reduimur* occludere tela;
 Corporibus vulſis ſanctum perducito rana,
 Sed quæ parua ſit eſt, & rauco garruli queſtu.
 Necnon quæ ſtagnis ceſſantibus hæſit hirudo
 Sumitur, & viuens ſamia torretur in olla,
 Hæc acidiſ iningit permixta liquoribus artus,
 Auulſamq; vetat rursus* percreſcere glutinū.

* procre- ſcere

Omnibus obſcenis medendis.

Dicēdū, & quæ ſit mēbris medicina pudēda.
 Languidus antiquo purgatur penis Iacabo,
 Ac ſuper illinitur ſæuenda felle capellæ.
 Mane nouo myrti frondes commendere prodeſt,
 Cui dolet, atq; illas in vulnus deſpiciat ipſe.

Ecce etiam vini genitalia laeta leuantur,
 Et tumidos testes neruia lymphæ coërcet,
 Vel bulbi ex mulso, vel cara immista cupresso:
 Aut faba cum tepidis Bacchi decocta fluentis.
 Ramicis immensum fertur cohibere tumorem
 Far madidum lymphæ, & ferali fronde cupressi,
 Unde etiam potus frons hæc m. moratur amica.
 Sin autem existit durum tibi glandibus inguere,
 Proderit induci cochleus cum melle minutas.
 Obscuros si pone locos noua vulnera carpent,
 Horrentum mansa curantur fronde ruborum.
 At si iam veteri succedit fistula morbo,
 Mustela cinere immisso purgabitur vlcus,
 Sanguine seu ricini quem hos gestauerit ante.
 Herba chelidonia fertur cum melle mederi,
 Herbaq; cum senu folijs de nulle vocata.

Ischiæ, & articulari morbo.

Sapius occultus victa coxendice morbus
 Perfurit, & gressus diro languore moratur,
 Populus alba dabit medicos de cortice potus,
 Necnon & tenere gracili de fronde genisia.
 Arreptos caules, acidoq; liquore madentes
 Sumere conueniet, rubiam quoq; ducere potus.
 Aut in * amineo cochleas haurire Lyæo.
 Si vero articulos tabes inimica per omnes
 Haferit, ex ficu betas ac melle ligabis,
 Vel pelagi Latices simu! & bacubia dona.
 Sumere curabis, nimio sed parco vino.
 Ennius ipse pater dum pocula siccant iniqua,
 Hoc vitio tales ferunt mernisse dolores.

* aliàs
 Pithyno:
 vel, iirina

Purunculo medendo.

Cum sanguis nimius puri commistus atroci
 Aetuat, & papulas alte sustollit acutas,
 Resinam mifces, & saxis ordea fracta.
 Conspersa hac tepidis apponere convenit undis.
 Vis & * hyoscyamum cara seuoq; ingratum
 Nescere, non minus hac poterit medicina inuare.
 Prætereaq; sumum ex gallo quod legeris albo.
 Hymbribus ex acidis fideus appone dolenti.
 Auribus aut pecudum molles exproinito sordet,
 Inguine quo foetis dabitur medicina papillis.

Carboni * medendo.

Horrendus magis est, pimit q corpora, carboni:
 Urit hic inclusus, vitalia rumpit acerbis.
 Hunc veteres quondam varijs populere medebis.
 Tertia namq; Titi simul & centesima Lini
 Charta docet ferro talem candente dolorem
 Excelsum, aut poto vaporum semine pulsum:
 Infæti dicens vix septem posse diebus
 Vitam produci: tanta est violentia merbi.
 Dulcisidum * laticemq; cumini semine iunges,
 Atq; sumum pariter Paphia compositone columba.
 Hinc line disruptas partes, & clausa venena.
 Præterea triti reserant * & operta lupini.
 Nonnullus calcem vinam dissolvit aceto,
 Fum intemq; ninem papulis apponit acerbis.
 Est qui gallina perducatur stercore corpus.
 Alia vel piperi parce commissa linuntur
 Pythagora cognata leni condita cumino.
 Præderit & madida fermentum polline turgent.

* hyoscyamum
 mi semen
 seuumq;

* tollendo

* laticem
 cum lini

* adoper-
 ta

Pani, vomica, & strumæ depellendis.

* vomit

Sunt alij quos dura* mouet natura tumores
 Non minus horrendi, sed non ita perniciosi.
 Vomica qualis erit, vel eidem proxima quadam:
 Simplice resina miscbimus hordea tusa,
 Et mulsos amnes, & purgamenta columba,
 His bene decoctis languentia membra fouentur.
 Mollis odorato faba iungatur coriandro.
 Proderit appositum, mollitq; aperitq; tumorem.
 Aut de phasgano radix decocta palustri,
 Quæ salis admisto tundetur condimento.
 Proderit & māsūm quod traxeris arbore viscum.
 Gramen byoscyami cara senioq; vetusto
 Concilia, misistq; locos perduce dolentes.
 Exerceri etiam corpus medicina potens est.
 Ouum de fundes in fœtile, deinde putamen
 Marruby succo implebis, post melle liquenti
 Omnia consociata petenti prospera potu
 Sumuntur, reserantq; malum purgantq; lenantq;.

Igni sacro demouendo.

Et etiam morbi species, quæ dicitur ignis,
 Languida quo multo torrētur mēbra calore,
 Vel tu vicino seuum bonis igne remittis,
 Mollitumq; lines, vel oloris fecibus onas,
 Sed non colla dabis, sic torrida membra fouebis.
 Lumbricus terra misso inducetur aceto,
 Aut parili noua ruta medo, sed iungis olium,
 Quæq; cum betis prosunt saepe illata tritis,
 Alia dant cinerem sociato oleoq; garoq;.

ἱερὸς ἰγνίς -
 ἁπλῶς Græ-
 cis dici-
 tur, vulgo
 ignis diui
 Antonii.
 Fecibus, id
 est, excre-
 mentis. siue
 pinguib^{us},
 hoc est adli-
 pe.

Vnguine quo gliscens deponet flamma furorem.
 Sape chelidonia pars candida iungitur oui.
 Qua modico potu sed vili trita capeffes,
 Admiscere memor lymphas amnemq; fulerni.

Podagræ depellendæ.

* trigemi
nas

Quadã sunt rabida medicamina digna podag.
 Cui ter* tricenas spēs Epidaurius ipse (græ.
 Dixit inesse deus, requiem tamen indere morbo
 Fas erit, & tristem saltem mulcere dolorem.
 Ergo age & arreptũ salicis frondemq; librumq;
 Cum vino tere, sic contractos perline nervos.
 Aut cum prima mali sese ostentabit origo,
 Fernida non timidis tolera cauteria plantis,
 Seminecisve hirci reserat o pectore calces.
 Invere, sic dira reprimes primordia pestis.
 Aut si corruptus persederis altius humor,
 Trita cupressus ibi Baccho iungetur acerbo
 Panibus & teneris, cohibebitq; addita questus
 Parua sabucus item hircino collita seno,
 Triticeaq; acido manantes amne farine,
 Aut nitidum ranæ decoctum viscus olini,
 Sine chelidonia succus sale mistus aceto.
 Sunt quibus apposita siccatur hirundine sanguis.

* rabidus

* mersit

Vide Plin.

lib. 22. cap.

25.

Hoc quidam* raptus morbo per tempora mersis
 Vicino plantas frumenti* pressit aceruo,
 Euasitq; grauem casu medicante dolorem.

Vulneribus ferro, aut verberibus factis.

Natura vitij medicas obiecinus artes,
 Nunc & fortuna iaculis obsistere pat est.

Si cui forte lapis teneros violauerit artus,
 Neēte adipēs vetulos & tritam chamaciſſon,
 Ne pudeat lutea ſtercus perducere porca.
 Sin autem ſauo laceratum eſt verbere corpus,
 Tum lixiua cinis caras diſſoluit & oua,
 Admiſtoq; oleo vibices comprimit atraſ.
 Si verò inſranus manat de vulnere ſanguis,
 Purpura torretur conchyli perlita * ſuco,
 Huius & atra cinis currentem detinet vndam.
 Verruca quoq; deſecta franare cruorem
 Dicitur ambuſtus tyrio de vellere puluis:
 Præterea nimios reſerati vulneris annes
 Peniculi cinis aſtringit vel ſimbria porri.
 Siue ſimius manni cum teſtis vritur oui,
 Et reprimiſt fluidos miro medicamine curſus.

* ſucco

Vulneribus quibuſcunq; caſibus factis.
 Am varia humana ſūt vulnera cōditiōis,
 Ut nequeāt proprias cūctis aſcribere curas.
 Iſdem igitur monitis caſus * arabinaus omnes,
 Sic tamen vt nullus medicinam clauſerit error.
 Ergo modus quicunq; obtingit vulneris atri,
 Contritus cum melle dabit medicamina bulbus:
 Herbaq; qua folijs nomen de mille recepit,
 Appoſitu prodeſt adipi permixta vetuſto.
 Succida cum tepido neētetur lana Lyao.
 Ambuſtaūe cinis complebit vulneris ora.
 Concludit verò vel frons vel ramus ab vlnō,
 * At ſuccis hedera pulchreſcit ſæda cicatrix.

* ſanabi-
mus

* Pl.

Hominis ac ſimix morſus.

N 2

Sine

* puro **S**ive homo, seu similis turpissimæ bestia nobis
Vulnera dēte dedit, virus simul intulit atrū,
Betonicam ex * duro prodest assumere Bacebo.
Necnon & raphani cortex decocta medetur,

* venenis. Si trita admorsis fuerit circumlata membris.

Serpentium moribus, & * viperinis excludendis.

Cuspide non quisquā longe neq; cade carissa,
Fulmine nō gladij, volueris nec felle sagitta
Quam cito vipereo potis est affligier icū.

Quare aptam dicamus opem, suicosq; medentes.

Quem nocuit serpens, fertur caput illius apte
Vulneribus iungi, sanat quem sauciat ipsa:

Utq; Larissæ curatus Telephus hastā.

Proderit & caulem cum vino haurire sabuci,

Aut coctum raphani librum tritumq; ligare,

Sine etiam excelsa folium de mole cupressi.

Aut tithymallus atrox vulnus cōtrita perungit.

Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,

Ex illo radix tepido potatur in amni.

Cervino ex sætu commissa coagula vino

Sumuntur, quæ res membris agit atra venena.

Aut ferula radix potatur in hymbre Lyæi

Betonicæve leues, gallina aut intra vetusta.

Si verò horrendum vulnus fera fecerit aspis,

Urinam credunt propriam conducere potū,

Varronis fuit ista senis sententia: necnon

Plip. 14. (Plinius ut memorat) sumpti iuvat lymber acetū

cap. 6.

Dicendū, & quæ sit præcox medicina timentis

Cautio: nanq; potest diros præueriere morsus,

Si iecur excelsū tardo de vulture portet.

Erucis aut si totos perduxeris artus,
 Quas prius attritas vehementi spargis aceto.
 Aut tu cernina per noctem in pelle quiesces,
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.
 Toxicæ præterea quæ sint pellenda medelo,
 Ex prædium: sanguis poterit prodesse caninus,
 Qui facili potu antidotos imitatur honestas.
 Vis & mirificos cautus prædiscere odores,
 Accensus quibus arcetur teterrima serpens,
 Aut styracem torres, aut diri vulturis alam,
 Vel nepetâ, aut frondem rigida stirpemq; myrica.
 Itæ bni scorpion, & Morsibus Muris cæci, vel Aranei.

Sicut minima species, sed dira vulnere peñtes,
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallant,
 Scorpion ut gravis est & araneus, hæc mala semper
 Captant securos multa iam nocte sopores,
 Et documenta dedit nobis prostratus Orion, * membra
 Magna quod exiguis perimantur * sæpe venenis.
 Et quum vulnus atrox incussit scorpion ardens,
 Continuo capitur, tunc digna cade retusus,
 Vulneribusq; aptus, fertur renocare venenum.
 Aut calidæ pelagi lymphis loca læsa fouentur,
 Sine meri potu dissolvitur improba peñtis.
 Ad cunctos autem morsus ictusq; minorum * pauida
 Caseus aptus erit * sima de lacte capella,
 Cumq; hoc absumi debet origanum herba:
 Hæc duo mirificis curabunt icta medelis. * saniculo
 Necnon * peniculo calidum annectetur acetum,
 Aut vinum sulphur sicci cum fice Lyæi.

* *melis* Exiguu piperis cerebrum conspergito * *gallis*,
 Quo lita sanescunt depulso membra dolore.
 Sin autem muris nocuit violentia caci,
 Qua sola signavit voluendis orbita planstris,
 Illinc, mira datur vili de pulvere cura.

Subitaneo dolori, febri atque oſtrocopo.
Nonnūquā existit subiti noua causa doloris.
 Cuius origo latet, veris reprimēda medelis.
 Nanq; helidoniam misto sale necesse predest,
 Velleraq; infuso recalentia sulphure sanant.
 Oſtrocopon lento conducit melle perungi.
 Sin autem calida depascent corpora febres,
 Tunc apij succus leni sociatur olino.
 Membra lines, fotuq; ferus mulcebitur ignis.
 Nec spernendus adeps, dederit quē bestia melis.
 Seminecis cerui lacrymam miscere liquori
 * *dolētes* Conuenit, atq; artus illinc mulcere * *calentes*:
 Sic lacerat morbum, bilemq; reuoluit in aluum.
 Præterea chymum stomacho desiccet iniquum,
 Qua magis atq; magis promittunt corpora claudi.
 Febribus aut longis galli noua intra vetusti
 Subueniunt, etiā tremulis medicantia membris.

Quartanz typo med-cando.

* **N**Ec tu crede lenem dilato tempore febrem,
 Qua spatium sibi dat, magis ut cessando
 Letali quæ grassatur quartana calore, (caleſcat,
 * *discam* Nī medicas adhibere manus * *curemus* et herbas.
 Alia non pūdeat terno cum cimice trita,
 Et diluta micro medijs haurire diebus.
 Aut facilem iecoris murini ducere fibræ

Quattuor ut duri iungantur scrupulla Bacchi.
 Mira est absinti cum simplice potio lymphæ.
 Sume tribus digitis apprensū semen anethi,
 Tantundem marathri, mulsū nec desit aceti,
 In cuius cyatho prædicta salubriter hauris.
 Maonia Iliados quartum suppone timenti.
 Aut leporis trepidi diluta coagula trade.
 Prodest & potus, * sed mulsus doridis humor.
 * vel
 Quidam etiam miranda ferunt veniente calore,
 Iurantes ludum Veneris munusq; petendum.
 Sed prius est oleo partius fervere rana,
 In triuijs, illoq; artius perducere succo.

Tertianæ typo medicando.

Est etiam alternis febris rediitua diebus,
 Tempora discernēs quasi iusta pōdera libra.
 Ut possis igitur talem prohibere furorem,
 Inuolues cera pallentis grana cumini,
 Puniceaq; indes pelli, colloq; ligabis.
 Pulegi ramus lana velatus amictu
 Tempore suspecto medicos præbebit odores.
 Præterea tritus cimex potatur in ouo
 Horridius attractu, sed gustu commodus apto.

Puniceæ
 pelli, hoc
 est, malico
 rio, quæ
 testa est ma
 li punici.

Quotidianæ typo medicando.

At qui continuis non cessat adire diebus,
 Sed tantū certas morbus discriminat horas,
 Triticeum metuit granū (si credere dignum est)
 Quod lætans fracto fuerit sub pane reperitum,
 Nec non ossa iuuant sepius inuenta domorum.
 Conuenit hac tereti pendentia subdere collo.

*Multaq; praterea verborum monstra filebo:
Nam febrem vario depelli carmine posse
Vana superstilitio credit, tremulaq; parentes.*

Hemittit: & depellendo.

*Figes hoc
videlicet
modo, atq;
ordine:*

*Abracadabra
abracadabr
abracadab
abracada
abracad
abrac
abrac
abra
abr
ab
a*

M*ortis firu magis est, quod Gracis hemittit: &
Vulgatur verbis, hoc nostra dicere lingua*

*Non potuere ulli, puto, nec voluere parentes,
Inscribis charta, quod dicitur Abracadabra,
Sapius, & subter repetis, sed detrahe summam,
Et magis atq; magis desint elementa figuris
Singula, quae semper rapies, & caetera figes,
Donec in angustum redigatur, litera conum.
His lino nexis collum redimere memento.
Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.
Coralium atq; crocum corio connectito felis,
Coralium vero si collonectere velles,
Nec dubites illis virides miscere smaragdos.
Talia languenti conducent vincula collo,
Letalesq; abigevi (miranda potentia) morbos.*

Fracluris, & luxis sanandis.

I*nfandum dictu cunctis procul absit amicis,
Sed Fortuna potens omnia conuertat in hostes.
Vis indigna nouo si sparserit ossa fragore,
Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis,
Lintea deinde superq; inductasnectere lanaf.
Sapius ut succos conspergere pinguis oliui,
Dis septem credunt coalescere cuncta diebus.
Aut veteri Taccho capra fumus inde petula,
Hoc aperit clausum, trahit haerens, sanat aperta.*

Si

Si verò caput infelix colliserit ictus,
 Ex oleo necti vestis debebit arachnes,
 Nesciet hac illinc (nisi cum sanarit) abire.
 Quod si luxa suo decedunt membra tenore,
 Vttere sarnineos crines, ac iungere seuum
 Congruet, ac tali medicamine mota ligare.
 Aut malum ex pingui tritū appeuisse iuuabit.
 Aut si conclusum seruanit tibia vulnus,
 Stercus ouis placida iunges adipēsque; vetustos,
 Pandere quæ poterunt vlcus, patuleque; videri.

Neruis incis. & dolentibus, atque contractis.

Haud quicquam credet dissectos vulnere nernos
 Ad solitum rursus reuocari posse vigorem.

Sed prodest terra lumbricos indere tritos,
 Quis vetus & *rana sociari axungia debet.

* rancem

Si verò occultus nernos dolor vrit incertus,
 Vulturis excisos adipēs rutamque; remitte.

Aut caram, & tali recreabis languid i sotu.
 Conuenit & pelagi calidis perfundier vndis.

Carica, vel betis lento cum melle iungatur.

Aut Baccho madefacta Ceres cum fronde cupressi,
 Quo poteris *potu recreare rigentia membra.

* soto

Sin autem subito replicantur corpora morbo,
 Contractos reuocat neruos caro sumpta columba.

Aegris somno addiscendo.

Non solum miseros teterrima febris adurit,
 Sed super optato pergit viduare sopore,

Ne prosint placidi celestia munera somni.

Charta igitur, varijs quam pinxit litera Verbis,
 N 5 Vritur,

*Vritur, inde cinis calido potatur in amni.
 Proderit & magnum capiti substernere fulcrum,
 Prodest & mistam lymphis potare cypressum,
 Palladijs itidem succis, quos flore rosarum
 Iungis, & immisces madidum tritumq; papauer.
 Quo lita frons facilem praebebit nocte quietem.
 Necnon mandragora gustu sopor additur altus.
 Dilue praterca glomeramina, quae gerit intus
 Clausa aries inter gemina coxendicis umbras,
 Inde soporati ducentur gutture potus.*

Lethargia expellendæ.

D*iximus hanc sortē miseris mortalibus esse
 Ut sint saepe mala inter se contraria morbo.
 Deniq; nonnunquā somno sic mēbra gravantur,
 Ut coniungatur leto sopor altius acerbo.
 Ergo leni flamma torrentur cornua capra,
 Quo nidore gravem depellent lumina somnum.
 Aut veneris labrum quæ dicitur herba, bibetur,
 Quæ teritur prius, & vino confusa liquefeit.
 Conveniunt acidis euphorbia mista fluentis,
 Gramina vel ruta genuina si nare trahantur.
 Quidam dira iubent, septeno cimice trito,
 Ut vitientur aqua, cyathusq; bibatur earum.
 Hæc potiora putant, quàm dulci morte perire.*

Comitiali morbo.

E*st subiti species morbi, cui nomen ab illo est,
 Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.
 Sæpe etenim membris æro languore caducis,
 Consilium populi labe horrenda diremit.*

Ipse deus memorat dubia per tempora luna
 Conceptum, talis quem saepe ruina profudit.
 Prodest cum veteri Baccho fel vulturis * ampli, * atq;
 Sed cochlear plenum gustu tibi sufficit uno.
 Aut cruor ex progne mistus cum polline thuris,
 Aut apium elixum, aut conditum melle fel agni,
 Marrubiūmve pari confusum pondere mellis,
 Cui tu terna dabis gustu cochlearia in uno.
 Apium mustela cinis est & hirundinis una.
 Præterea pluvias hominis quas calva supina
 Excepit proiecta sinu, consumere prodest,
 Aut lapis ex nido, vaga quem congescit hirundo,
 Vellitur, & nexu foveat at collitq; iacentem.
 Pellitur (ut fama est) gustu quoq; languor anethi.

Regio morbo pellendo.

Regius est vero signatus nomine morbus,
 Molliter hic quoniam celsa curatur in aula.
 Huic rubia ex mulsa fertur conducere lymphæ.
 Allia trita dabis vino madefacta calenti.
 Vellera cum vino suffiri sulphure prodest.

Infantibus dentientibus, vel strige inquietatis.

Nvdū hominē primū * mater natura pfudit, * munda
 Insuper excruciat, nuncis cū dētibus armat.
 Collo igitur molli dentes necitentur equini,
 Qui primi fuerint pullo crescente caduci.
 Aut teneris cerebrum gingivis illine porci.
 Aut leporis nuncum bibitur cum lacte caprino.
 Præterea si forte premit strix atra puellōs
 Virosa immulgens exercis hubera labris,

Atq;

* alias: *Allia præcepit* * *Titini sententia neſti,*
tundi ſen *Qui veteri claras expreſſit more togatas.*

ſentiaVe-

ſti

Combustoris igne, vel frigore.

Sunt diuerſa quidem mala frigoris atq; caloris,

Sed tamen amborū ſimili nocet vlcere virtus.

Illa quoq; uſta putes, qua ſunt niue laſa rigente,

Conuerſa in cinerem platani pila curat utrunq;.

At verò ambuſtum flammis qui candidus oui,

Succus ineſt, penna inductus ſanare valebit.

Aut tu ſuccoſa cinerem perducito lana,

Aut viuam ex oleo * veteri composito calcem,

* lini

Ordea vel franges atq; oui candida iunges,

Adſit adeps porca (mira eſt hac forma medela)

Iunge chelidonijs, ac ſic line vulnera, ſuccis.

Quodq; recens uſit glacies axungia ſimplex

Mulcet, & ex facili grata eſt medicamine cura.

Venenis prohibendis.

Vt tutus ſias inſiſta fraude nouerca,

Vel quicunq; tuo carpetur linidus auctu,

Non expectatis eat obuia cura venenis,

Anſe cibos igitur inglandis ſæpius edatur.

ariatia Proſunt electri * corantia pocula virus.

Præterea coſta querno cum cortice lymphæ

Conueniunt potu, diuerſæve ſuis oliuo.

Sæpe etiam raphanum prædixit numen edendum,

Antidotus verò multis mithridatica fertur

Conſociata modis, ſed Magnus ſerinia regis

Cum raperet victor, vilem deprendit in illis

Syntheſin, & vulgata ſatis medicamina riſit.

Dis

Tis demum ruta folium, salis & breue granum,
 Inglandesq; duas, * totidem cum corpore fucus, * terno
 Hac oriente die paruo conspersa Lyao,
 Sumebat metuens, dederat quæ pocula mater.

Venenis datis.

S Inequit infandum prauertere cautio virus,
 Proximus ille gradus data pocula pellerè cura.
 Lac asina placidaq; bonis prodesse loquuntur.
 Betonicam ex paruo sumunt pleriq; Lyao.
 Quod si hedera succos, quæ truncos implicat altos,
 Instilles pateris, poterunt hand vlla nocere
 Pocula, quæ quisquam sanis vitiauerit herbis.
 Si quis hyoscyamum gustarit, lacte capella
 Exhausto, rabidos poterit mulcere furores.

Vulnibus ex re dubia curandis.

Vulnera tabescunt spatio vitiaata dierum,
 Curaq; nil prodest, nec ducitur vlla cicatrix.
 Sed tamen herbarum tam mira potentia pollet,
 Vlcus annosi sinus ut coalescere possit,
 Marrubium si * in recoquas, illeq; liquore * thure
 Vulnus atrox foveas, cineres vel hirundinis alba quas
 Inducas, leporisve aspersa coagula vino,
 Aut hedera in Baccho decocta, & si men anethi.
 Aut cineres alni cardo cum melle ligentur.
 Lumbrici terra poterunt conducere vulnus,
 Aut facilis lepathi * unctio vulnè purgat, * roma
 Et commistus adeps, sed nonnullo sale tactus. rior ul
 Pineæ præterea vino cum sulphure cortex, ra purg
 Et pice cum spissa iam perdita membra reponit.

Verecuis.

Verrucis tollendis.

Interdum existit turpi verruca papilla,
 Hinc quondā Fabio verum cognomen adbasit,
 Qui solus patriæ cunctando restituit rem.
 Id poterit vitium sanguis curare lacertæ,
 Aut urina canis cum terra induc̃ta madenti.
 * lichen Aut herba succus, quæ fertur nomine* lathyri,
 Et tithymallus item tali satis apta medela.
 Si rupta immensos fundit verruca cruores,
 Purpureo triti cineres de vellere profunt,
 Quod fuerit vero conchyli sanguine tinctum.

Hæmorrhoidibus medendis.

Exruciant turpes anum si forte papille,
 Agrestis prodest radix superaddita porri.
 Ni violet, sanat iuglandis fragmine clausa.
 Sal niueum sumes, beticum quod nomine dicunt.
 Dulcia cumq; nigra iunges fuligine mella.
 Apponesq; super, pellit medicina dolorem.

Quæ sequuntur, ex Aldino codice huc transferre
 libuit; ceteri vi deantur non esse Sereni.

PARALYSI DEPEL- LENDÆ.

Prima die ita agendum.

Hunc quicumq; cupis citius depellere morbum,
 Protinus antidotum studio tu perface mirum,
 Scilicet ut valeas languenti ferre medelam.
 Castoreas siliquas bis sex perquirere cura,
 Tristis item digitis lympham metire duobus.
 Deniq; tunc capies phialam quæ instior extat,
 Aut

*Aut equidem si ummas: sed prunas subijce solets.
Proderit interea tepidum potantibus illud.
ieiunis sed enim potius præbere memento.*

secunda ita medendum est.

*Cumq; secunda dies orbi peruenerit omni
Haud alijs rebus prudens adiungere cures.
Castoris atq; nomen siliquas appendito statim,
Atq; duos semis digitos metire memento
In calice atq; probo lympham miscere duobus:
Qui patitur tepidi linguens hinc sorbeat ipse.*

Tertia die ita curandum est.

*Gratior atq; dies ternus cum venerit imo,
Rursus in agroto constanter fer medicamen,
Castoreas siliquas iterum qua pondere sunt sex:
Hinc etenim binos digitos metire memento
De lymphâ liquida: sed enim subiungere cura
Et simili debes tepidum præbere modo tunc.*

*Ita peragendum est à quarta die vsq; ad sextam,
& à septima vsq; ad nonâ, à decima vsq;
ad duodecimam, & mirifice prodest.*

Quid quarta die, & reliquis peragendum sit.

*Quartus & ille dies consentit: necne priori
Quintus & est similis percellens nanq; secundo:
Sextus itemq; simul concordat deniq; ternio:
Septimus vsq; nonum percurritur ordine primo:
Sic decimas currens conscenditur ad duodenum.*

I N I S.

Q. RHEMNII FANNI

PALAEMONIS DE PON-

DERIBVS ET MEN-

SVRIS LI-

BER.

★.

Sunt, qui
huius opu-
sculi Pri-
scianū au-
torem esse
putant: sed
reclamat
erudito-
rū maior
pars.



ONDERA Peonijs Veterum me-
morata libellis

Nosse iuvat: pondus rebus natura
locavit

Corporeis, elementa suum regit omnia pondus,
Pōdere terra manet, vacuus quoq; ponderis aether
Indefesso rapit voluentis sidera mundi.

Ordinar a minimis, post hac maiora sequentur.

Nem maius nihil est aliud, quam multa minuta.

Semioboli duplū est Obolus, quē pondere duplo
Gramma vocant, Scrupulū nostri dixere priores.

Semina sex alij siliquis lititantia curnis,

Attribuunt scrupulo, lentes versa: iter octo,

Aut totidē speltas numerant, tristes ve lupinos

Bis duo: sed si par generatim his pondus inesset,

Seruarent eadem diuersa pondera gentes,

Nunc varient: etenim cuncta non sādere certo
Natura, sed lege valent, hominumq; reperiis,

In scrupulis ternis Drachmā, quo pondere doctis

hūmus Argenti facitis signatur pondus Athenis.

Hecq; a drachma non re, sed nomine differt.

Drachmā si gemines, adērit quē m diuier audis,

Siciliquis: drachma scrupuli si adicētio fiet,

Sexcula:

Sextula qua fitur, nam sex his uncia constat:
 Sextula cum dupla est, veteres dixere Duellam.
 Uncia fit drachmæ his quattuor: unde putandum
 Græmmata dicta, quod hæc viginti quattuor in se
 Uncia habet: tot enim formæ vox Græca notatur,
 Horis quot mundus peragit noct. m̃q; diemq;.
 Unciæq; in libra pars est, quæ mensis in anno.
 Hæc maior Latio libra est, genit̃q; rogata.
 Attica nã minor est, ter quinq; hæc deniq; drach-
 Et ter vigenis tradunt explerier unam. (mis.
 Accipe præterea, paruo quæm nomine Græy
 Minam vocitant, nostriq; Minem dixere priores,
 Centum hæ sunt drachmæ. quod si decerpseris illis
 Quattuor, efficies hanc nostram deniq; libram.
 Attica quæ fiet, si quartam dempseris hinc, Minæ
 Cecropium superest post hæc docuisse Talentum
 Sexaginta minas, seu vis, sex millia drachmas,
 Quod summũ doctis perhibetur pondus Athenis,
 Nem nihil hic Obolove minus, minusve Talento.
 Nunc dicam, solida quæ sit divisio libræ
 Siue Asis, nam sic legum dixere periti.
 Ex quo quod soli capimus perhibemur habere,
 Dicimur aut partis domini pro partibus huius:
 Uncia nam libræ si deest, dixere Deuncem:
 At si sextantem retrahas, erit ille Deuncis:
 Sed nullam reliquo nomen Semuncia certum
 Depta dabit, neq; enim est huius Sesiuncie triplex.
 Dodrantem reliquũ vocitât quadrante retracto:
 Cumq; triens desit, Bessem dixere priores.

Deuncis,
 prodecit,
 qui & De-
 ntas dict-
 tur, posi-
 tum vide-
 tur.

*Iidem Septuncem dempto quincunce vocarunt.
 Post hac Senissis solidi pars maxima firtur.
 Nam qua dimidium superat, pars esse negatur,
 Ut docuit tenui scribens in pulvere Atusa.
 Cetera dicta prius quibus est semuncia maior.*

De ponderibus, sine mensuris humidorū, & frugum;
ET de ponderibus, superest pars altera nobis,
*Humida metiri, seu frugum semina manu,
 Eius principio nobis pandetur origo.
 Pes longo spatia latoq; notetur in angulo,
 Angulus ut par sit, quem claudit linea triplex.
 Quattuor ex quadris medium cingatur inane.
 Amphora fit Cubus, quam ne violare licet,
 Sacrauere Ioui Tarpeio in monte Quirites.
 Huius dimidū firt Vrna, ut & ipsa Medimni
 Amphora, terq; capit modium, Sextarius istum
 Sex decies haurit, quot soluitur in digitos Pes,
 At Cotylas quas, si placeat, dixisse licebit.
 Heminas recipit geminas Sextarius vnus,
 Qui quater assumptus fit Graio nomine Chenix.
 Adde duos, Chus fit vulgo, qui est Congius idem,
 A quo sextarii nomen fecisse priores
 Crediderim, quod eos capiat sex congius vnus.
 At Cotyle cyathos bis ternos vna receptat,
 Sed de abaco nobis id pondus saepe notatur,
 Eis quinque hūc faciunt drachmae, si appedere tētes:
 Oxybaphus fiet, si quinque addantur ad illas.
 At Mystrum cyathi quarta est, ac tertius mystri,
 Quam vocitant Cyanē, capit hęc cooblecaria bina.*
Quod

Quod si mensura pondus componere fas est,
 Sextarij Cyathus pars est, quæ est uncia libra,
 Nec non oxybaphi similis Sescuncia fiet.
 Si illicquumq; tibi mystro simulare licebit.
 Cochlear extremū est, Scrupuliq; inutabit instar.
 Attica præterea dicenda est Amphora nobis,
 Seu Cadus, hanc facies, nostræ si adieceris urnā.
 Est & bis decies quem conficit amphora, nostris
 Cullens, hac nulla est maior mensura liquoris.
 Est etiam terris (quæ advena Nilus inundat)
 Artaba, cui superat modij pars tertia post tres,
 Næq; etiam modijs explebitur Artaba triplex.

De ponderibus variorum liquorum, & aquarum.

Illud præterea tecum cohibere memento,
 Finitum pondus varios servare liquores,
 Nam libra (ut memorat) bis Sextarius addet,
 Seu puros pendas latices, seu dona Lyæi.
 Addunt semissim libra* labentis olivæ,
 Selibramq; ferunt mellis superesse bilibri.
 Hæc tamen assensu facili sunt credita nobis:
 Næq; nec errantes undis labentibus amnes,
 Nec mersi puteis latices, aut fonte percunni
 Manantes par pondus habent: non deniq; vina,
 Quæ campi aut colles nuperiæ aut ante tulere,
 Quod tibi mechanica præptū est depromere mæsa.
 Ducitur argenti, tenui ve ex ære cylindrus,
 Quantum inter nodos fragilis producit arundo,
 Cui cono interius modico pars ima gravatur,
 Ne totus sedeat, totusne supernatet undis,

* linæis

Lineaq; à summa tenuis descendit ad ima
 Ducta superficie, tot quaq; in frustra secatur,
 Quot scrupulus grauis est argēti arisūe cylindrus,
 Hoc cuiusq; potest pondus spectare liquoris.

Maiori,
 subandi pō
 dere.
 Modulos,
 id est par-
 tes, in quas
 cylindrus
 intelliga-
 tur diui-
 sus.

Nam si tenuis erit, maiori mergitur unda:
 Sin grauior, plures modulos superesse notabis:
 Aut si tantundem laticis sumatur utrinque,
 Pondere prestabit grauior: si pondera secum
 Cōueniunt, tūc maior erit, quæ tenuior unda est.
 Quid si ter septem numeros texisse cylindri
 Hos videas latices, illos cepisse ter octo,
 His drachma grauius fœtearis pondus inesse.
 Sed refert æqui tantum conferre liquoris,
 Vt grauior superet drachma, quātū expulit unda
 Illius aut huius teretis pars mersa cylindri.
 Hac de mensuris, quarum si signa requires,
 Ex ipsis veterum poteris cognoscere chartis.

De inuentione argenti, auro in vna massa permixti.

NVni aliud partū ingenio trademus eodem.
 Argentum fuluo si qui permisceat auro,
 Quantum id sit, quōve id possis deprēdere pasclo,
 Prima Syracusy mens prodidit alia magistri.
 Regem nāq; ferunt Siculum, quam venerat olim
 Calicolum regi, ex auro statuisse coronam.
 Comperioq; dehinc furto, nam parte retenti
 Tantundemq; argenti opifex immiscuit auro,
 Orasse ingenium ciuis, qui mente sagaci
 Quis modus argenti fuluo lititaret in auro,
 Repperit, illa sum quod dīs erat antè diuatum.
 Quod te quale fiet, paucis (adverte) docebo.

Lancibus æquatis quibus hæc appendere mos est,
 Argenti atq; auri, quod edax purgauerit ignis,
 Impones libras, neutrum ut præponderet: hæc q;
 Submites in aquam, quas pura ut ceperit unda,
 Protinus inclinat pars hæc, quæ sustinet aurum.

* Pensus hoc nanq; est, similari cr: sibus unda.

* Densus

Ac tu siste iugum, mediq; e cardine centri
 Intervalla nota, quantum discerpserit illinc,
 Quotq; notis distet, suspensio pondere filum.

Fac draibmis distare tribus: cognouimus ergo

Argenti atq; auri discrimina, deniq; libram

Libra trib. drachmis superat cū mergitur unda.

Sume dehinc aurum, cui pars argentea mīsta est,

Argentiq; meri par pondus, itemq; sub unda

Lancibus impositum spectata: propensior auri

Materies* subsistit enim, surlumq; docebit.

* aliàs,
 sub aquis
 fiet

Nam si ter senis superabitur altera drachmis;

Sex solas libras auri dicemus inesse,

Argenti reliquum, quia nil in pondere differt.

Argentum argēto, liquidis cum mergitur undis,

Hæc eadem puro deprendere possumus auro.

Si par corrupto pondus pars altera gestet.

Nam quoties ternis pars illibata grauarit

Correptā drachmis sub aquam, totiaē esse notabis

Argenti libras, quas fraus permiscuit auro.

Pars etiam libre quævis si forte supersit,

Hæc quoq; draibmarum simili tibi parte notetur:

Nec non & sine aquis *

F I N I S.

INDEX OMNIV M QVAE IN CELSO CON-

tinentur. Et primus numerus li-
brum, secundus caput
designat.

*

<i>A</i>		1. proæ.
A Bdomen	lib. 4.	Adolescentia quibus
cap. 1.		morbis magis obno-
Abdominis ruptura		xia sit 1. 1
quomodo curanda sit		Adurentia 5. 8.
lib. 7. cap. 17.		Aduſta quomodo cu-
Additæ cauſſæ	lib. 1.	rari debeant. 5. 26
in proæ.		Aegilops 7. 7
Abſceſſus quibus ſignis		Aiſtas periculofa 2. 1
indicetur futuri 2. 6		Aiſtas quos pariat mor-
Abortus periculũ quã-		bos. 1. 2. 1
do lib. 1. cap. 7.		Aeſtate quæ ad victum
Abſtinentia nimia ſæ-		magis conducant 1. 3
pè inutilis ibidem		Aeſtuenti in balneo,
Accéſſiones in fibri-		quid opus ſit fac-
bris 3. 3		re 1. 3
Aceti natura & uſus		A. tatis differentia vi-
5. 27		ſtu & curatione 1. 3
Acopa 5. 2. 3		Aetatum differentia,
Acrochordones lib. 2.		quãtum ad bonã ma-
cap. 14. & lib. 5. ca. 28		lamiæ valitudinẽ 2. 1
Actiões naturales quæ		Aeſculapius in deco-
		rum

rum numerum rela-	Andro medicus	6.18	
tus	1.proæ.	Angina	4.4
Agamemnon	1.proæ.	Angina subito finita,	
Agricolam usu fieri,		quid portendat	2.5
nō disputatione ibid.		Animalium quadru-	
stiax quo genere in-		pedum differentia	
sania laborauerit	3:	2.17	
18		Angues in Italia, &	
Alentia	5.14	in frigidis regioni-	
Alopecia	6.4	bus minus terribi-	
Alphos lib.5.ca.vlt.		les	5.26
Alui stringentia	1.5	Ani vitia quomodo cu	
Aluum soluentia ibid.		rari debeant	7.30
Aluus quæ mala	1.3	Anodina	5.25
Aluus soluta, quibus		Antidoti, & eorum	
remedijs coërceatur		compositiones	5.23
1.6		Antheræ	6.11
Alui indicatio	2.7	Antigonus rex	3.22
Ambrosia Antidoti no		Apollonius medicus	
men	lib.5.23	1.proæ.	
Ammonius lithotomr.		Apostemata	2.1
7.20		Aphtha	ibidem
Anatomice, id est, in-		Apollonius, qui Mys	
sectio corporum ne-		cognominatus est	5.
cessaria	1.proæ.	proæ.	
Ancyloblepharos	7.7	Aperientia	5.8
Andreas medicus	5.	Aqua frigida quibus	
proæ.		profit	1.9
Andrea collyrium	6.6	Aqua differentia in	
		0 4	pes

potionibus	2.17	Aristonis malagma	
Aqua bonitatis proba-		ibidem	
tio	ibidem	Articulorum curatio-	
Aqua in qua candens		nes	5.26
ferrum tinctum sit		Asclepiades.	1. proz.
4.9		Ascites	3.21
Aqua inter cutē quan-		Asthma	4.4
do minime terribi-		Asius lapis	lib.4.
lis	2.7	cap.vlt.	
Aqua quomodo hy-		Aduersus aspidis ictum	
dropicis emittatur		5.26	
7.13		Atbenio	5.25
Aquilonis status quos		Atheroma	7.4
generet morbos, &		Attoniti qui dicantur	
quid boni sanis cor-		3.26	
poribus adferat		Atrophia	3.22
2.1		Attalicum emplastrum	
Area	6.4	5.19	
Arquatus morbus	3.	Auium differentia in	
24		cibo	2.17
Arteriaces compositio		Aurium vitium	6.7.
5.26		& lib.5.c.18.	
Articulorū vitia	2.7	Aurium morbi	7.8
Arteria aspera, eiusq;		Aurium fracturatum cu-	
descriptio.	4.1	ratio	8.6
Articulorum dolores		Autumnus periculosiss-	
4.vlt.		simus	2.1
Ad articulos malagma		Autumnus quos mor-	
5.18		bos pariet	ibidem
		Aurum	

Autumni tempore qua ad viſum magis con- ſerant	1.3	Calor quid corporibus adſerat	2.1
Auſter quos morbos ge- neret	2.1	* Calculo quomodo ſuc- curratur	7.26
Autopyron	2.17	* Cancer in ore	6.15
		Cancer in cole	6.18
B		aduerſus Cantharidas	
Basilicon empla- ſtrum	5.19	2.27	
Bathus	ibidem	* Capitis dolores quibus lenentur	2.7
Brachij fracti curatio	8.10	Capitis longus dolor ſi ſine cauſa eſt, &c.	
Brachium	8.1	ibidem	
Bronchocoele	7.13	Capitis deſcriptio	4.1
Bubonocoele	7.18	Capitis morbi, & eo- rum curatio	4.2
C			
Cachexia	2.1	* Caput quibus infirmum eſt, quid facere conue- niat	1.4
& 3.22			
Cacoëthes	5.28	Caput quod firmiſſi- mum	8.1
Calofacientia	1.3	Caput luxatum	7.13
Caluoli quibus indi- cis cognoſcantur	2.6	de Capillis fluentibus	
Calculus quibus ſignis cognoſcatur	7.26	6.1	
Caluaria	8.1	Carbunculus in oculis	
Caligatio oculorum	6.6	6.6	
Calor quibus proſit	1.9	Carcinodes	6.8
		Carbunculi in cole cu- ratio	6.18
			o 5 ad

<i>ad Carcinodas malagma</i>	8. cap. 5.	
5. 18	<i>Chirurgus Sostratus</i>	1.
<i>Cardiacus morbus quis</i>	<i>proæm.</i>	
<i>dicatur</i>	3. 19	<i>Casarianum collyrium</i>
<i>Carcinoma</i>	5. 28.	6. 6
<i>Casus quid innenerit</i>	<i>Cercis</i>	lib. 8. c. 1.
5. 26	<i>Chiragra</i>	2. 6.
<i>Cessius medicus</i>	1. pr.	¶ 4. 24
<i>Catapotiorum descri-</i>	<i>Chirurgica</i>	lib. 1.
<i>ptio, siue varia com-</i>	<i>in proæm.</i>	
<i>positio</i>	5. 25	<i>Chironium vlens</i>
<i>Catapotium ad somnũ</i>	5. 28	
<i>ibidem</i>	<i>Chirurgus qualis esse</i>	
<i>Catapotium Athenio-</i>	<i>debeat</i>	7. proæ.
<i>nis</i>	<i>ibid.</i>	8. 3
<i>Catapotium Heraclidis</i>	<i>Cholera</i>	4. 11
<i>ibidem</i>	<i>Chordapsos</i>	4. 13
<i>Causæ abdita quæ sint</i>	<i>Chordion</i>	<i>ibid.</i>
1. proæ.	<i>Chrite tuberculum</i>	7. 6
<i>Causæ evidentes quæ</i>	<i>Chrysippus</i>	1. in
<i>codem</i>	<i>proæm.</i>	
<i>Causæ obscura quæ</i>	<i>Chrysippi discipulus me-</i>	
<i>codem</i>	<i>dicus</i>	2. 21
<i>Cephalea</i>	4. 2	<i>Chrysippi malagma</i>
<i>Cerebri vel membrana</i>	5. 18	
<i>eius percussa curatio</i>	<i>Cibus à quibus rebus</i>	
5. 22	<i>melius incipiat</i>	1. 2
<i>Chirurgus Tryphon li-</i>	<i>Ciborum potionumq;</i>	
<i>bro 7. in proæ. & lib.</i>	<i>differentia</i>	2. 17
	<i>Cibus</i>	

Cibus quomodo &	eius curatio	4. 12
quando in febribus	Comitialis morbus	
dandus lib. 3. cap.	3. 23	
4. 5	Concoctio cibi in stoma-	
Cibi varij eduntur su-	cho lib. 1. in	
cilius quàm conco-	proxim.	
quuntur 3. 6	Concoctio quibus sit,	
Cibus febricitantibus	quomodo se gerere	
dandus, qualis esse	debeant 1. 2	
debeat ibidem. ad-	Concubitus qualis esse	
versus cicutam 5. 27	debeat 1. 1	
Cirsocele 7. 18	Concubitus in fœminis,	
Circulatores 5. 26	seper naturam probi-	
Claui 5. 28	bitus, quomodo resti-	
Claui oculorum 7. 7	tui debeat 7. 28	
Cleonis collirium 6. 6	Condita duab. de causis	
Coli dolor quibus reme-	inutilia 1. 2	
dijs inueter 1. 7	Condylomata 5. 28	
Coles 4. 1	Condylomatum curatio	
Colicon medicamenti ge-	7. 30	
nus, ex quibus rebus	Coquentia & maturan-	
consitet 4. 14	tia pus 5. 3	
Colliriorum variae com-	Cordis descriptio, &	
positiones 6. 6.	ubi situm sit	
& 4. 28	4. 1	
Coëuntiam aliqua cer-	Cordis percussæ signa	
poris parte dissoluen-	5. 22	
tia 5. 11	Corjza 4. 2	
Celiacus morbus, &	Corpus integrum quod	
	nam	

<i>nam habeat</i>	1. 2	<i>Crassissimum os in cā</i>	8. 1
<i>Corporum incisio</i>	1.	<i>pite</i>	ibid.
<i>proæ.</i>		<i>Cubitus</i>	
<i>Corpus gracile quale</i>		<i>Cubitus latus quomo</i>	
2. 1		<i>do restitui debeat, &</i>	
<i>Corpus quæ extenuent</i>		<i>quot in eo ossa coeant</i>	
1. 3		8. 16	
<i>Corporis humani descri-</i>		<i>Curta in auribus quo-</i>	
<i>ptio</i>	8. 1	<i>modo sariiri debeant</i>	
<i>Corpus quodnam habi-</i>		7. 9	
<i>lissimum</i>	2. 1	<i>Cutem purgantia</i>	5. 18
<i>Corporis noxæ quinque</i>		<i>Cucurbitularum genera</i>	2. 10
5. 26		<i>duo</i>	
<i>Costæ, & earum situs</i>		<i>Curatio morborum quot</i>	2. 8
<i>atque differentia</i>		<i>modis fiat</i>	
8. 1		<i>Curacionum duo genera</i>	
<i>Costarum fracturarum</i>		7. 7	
<i>curatio</i>	8. 9	<i>Cucurbitulis quomodo</i>	
<i>Coxarum dolores</i>	4.	<i>sanguinis extractio</i>	2. 10
22		<i>fiat</i>	
<i>Coxarum dolor, quid</i>		<i>Cynicus spasmus</i>	4. 2
<i>portendat</i>	2. 5	D	
<i>Coxarum os</i>	8. 1	<i>Democritus libr. 1.</i>	
<i>Crato medicus</i>	6. 7	<i>proæ.</i>	
<i>Cruſtas vulneribus in-</i>		<i>Deiectio</i>	1. 3
<i>ducentia</i>	5. 10	<i>Deiectio quando sint</i>	2. 4
<i>Cruſtas ulceram resol-</i>		<i>vlla noxa sit</i>	
<i>ventia</i>	eodem	<i>Defructi differentia in</i>	2. 17
<i>Cremasteres</i>	7. 18	<i>porcionibus</i>	
		<i>Dem</i>	

Denarij pondus	5.	Difficilime curationem	
17		admittentia	5. 22.
Dentiam situs & ordo		Diocles	1. proæ.
& numerus & nomini		Disciplina corpori ini-	
na	8. 1	mica	ibidem
Dentium dolor	6. 7.	Dionysij collyrium	
Dentium curatio	7. 12	6. 6	
Dentes quomodo extra-		Dyspræi	4. 4
hendi sint	ibid.	Dysenteria	4. 15
Destillatio, eiusq; cura-		E	
tio	4. 2	Ecotropium oculo-	
Destillatione laboran-		rum	7. 7
tibus quid opus sit		Eleodes	5. 16
1. 5		Eleodes	5. 28
Desidia libr. 1. in proæ.		Elephantia	3. 25.
Detractio materia à cor		Empiricus unde dictus	
poribus, quot modis		sit	libro 1. in
sit	2. 8	proæ.	
Dexij malagma	5. 18	Empirici qui sint	ibi-
Diaphragma	1. proæ.	dem	
Diatetica medicina		Empedocles	ibid.
ibidem		Emplastrorum varia	
Dies critici	3. 4	compositiones, & de-	
Digiti libr. 8. cap. 1.		scriptiones.	5. 17. &
19		deinc.	
Digitorum coheren-		Emprosthotonos	4. 3
tium curatio	7. 32	Enchanthis	7. 7
Digitorum ulcera		Enterocoele.	7. 18.
6. 19		Enncapharmacum em-	
		plast	

<i>Fistularum curatio</i>		<i>Genuum dolores, & eo-</i>	
5. 28		<i>rum curatio</i>	4. 23
<i>Fluxus ventris, eiusq;</i>		<i>Genu luxatum</i>	8. 21
<i>curatio</i>	4. 19	<i>Gingivarum ulcera</i>	5.
<i>Famina</i>	8. 1		13
<i>in Faminis secunda</i>		<i>Glancias</i>	1. proæ.
7. 30		<i>Glandula</i>	4. 1
<i>Foramina in capite</i>		<i>Glande coles quo pacto</i>	
<i>ibidem</i>		<i>regendus</i>	7. 25
<i>Frigus quibus inimi-</i>		<i>Glâs colis siue penis cou-</i>	
<i>cum</i>	1. 9	<i>recta, quomodo ape-</i>	
<i>Frigus quibus proffit</i>		<i>rienda sit</i>	ibid.
<i>ibidem</i>		<i>Glutinantia</i>	5. 2
<i>Frigus quid mali cor-</i>		<i>Glutinatio vulnerum</i>	
<i>poribus adferat</i>			5. 26
2. 1		<i>Gorgias medicus</i>	2.
<i>Frigus in febribus quid</i>			14. & libro 7. in
<i>dicatur</i>	3. 3		proæm.
<i>Fruetuum arboreorum</i>		<i>Grandedines quomodo</i>	
<i>differentiæ in cibus</i>		<i>curantur</i>	4. 2
2. 17		<i>Grandedine laboranti-</i>	
<i>Fruentorum differen-</i>		<i>biles quid conveniat</i>	
<i>tiæ in cibus</i>	ibid.		1. 5
<i>Furunculus</i>	5. 28	<i>Gubernator usu sic-</i>	
		<i>ri non disputatione</i>	
			1. proæm.
			11
G <i>Angrana curatio</i>		H <i>Ammonius me-</i>	
7. 33		<i>dicus</i>	7. proæ.
<i>Ganglion</i>	7. 6		11. 17. 18.
<i>GargariZationes</i>	5. 22		

I N D E X.

<i>Hæsus</i>	7. 26	<i>Homo sanus</i> , nullis se
<i>Hecateus</i>	5. 25	medicorum legibus
<i>Hecatei emplastrum</i>		obligari debeat
5. 19		1. 1
<i>Hepatitis morbus</i>		<i>Hominem sanum</i> , va-
4. 7		rium vita genus ha-
<i>Hæmorrhoidis</i>	6. 18	ber: oportet cod.
<i>Herbarum differentia</i>		<i>Horror in febribus</i>
in cibis	2. 17	3. 3
<i>Hæradides</i>	1. proæ.	<i>Humectantia</i> 1. 3
<i>Herophilus</i>	libro 1.	<i>Humerus</i> 8. 1
in proæ. & libro 5.		<i>Humerorum dolores</i>
cap. 25		quibus tollantur
<i>Hermonis collyrium</i>		2. 7
6. 6		<i>Humeri fracti curatio</i>
<i>Hernia</i>	7. 18	8. 10
<i>Heron sine Hieron me-</i>		<i>Humerus luxatus quo-</i>
<i>dicus</i>	7. proæ.	modo restitui debeat
<i>Herpes</i>	5. 28	8. 15
<i>Hippocrates</i>	1. proæm.	<i>Humer spissescens</i> , aceto
<i>Hippocrates omnis medi-</i>		intus sumpto discen-
<i>cina parens</i>	7.	tur 5. 26.
proæm.		<i>Hyeme qua magis con-</i>
<i>Hireneus</i>	5. 25	ueniant 1. 3
<i>Hieracis collyrium</i>		<i>Hyems salubris est</i> 2. 1
6. 6		<i>Hyems quos morbos par-</i>
<i>Hieræ compositio</i>	5.	riat ibidem
27		<i>Hydrocele</i> 7. 18
<i>Homerus</i>	1. proæmio.	<i>Hydrops</i> , ac eius spe-
		cies

cies tres	3. 21	qua	2. 17
Hydropis curatio		Implentia	5. 14
ibidem		Insanabilia qua sint	
Hydrocephalon	4. 2	5. 26	
aduersus Hyoscyamum		Infibulatio quomodo	
5. 27		fit	7. 25
Hyposarca	3. 21	Inedia si cui eueniat,	
Hypochoysis	6. 6	quid faciendum	
1		1. 2	
Ichor	5. 26	*Inguem quomodo inci-	
Iecur, & eius situs		dendum sit	7. 20
4. 18		Intemperantia qua in	
ad Iecur dolens malig-		re tolerabilior	1. 2
ma	5. 18	Intemperantia exem-	
Ieiuni hominis vis ad-		plum	3. 21
uersus serpentis ictum		Insania quibus signis	
5. 26		denuntietur futura	
Ignavia quid faciat		2. 5	
1. 1		Insania species	53. 18
Ileos	2. 1	Insanientium commu-	
Ileon	4. 13	nia remedia	3. 18
ad Infantem mortuum		Intestinum ieiunum,	
expellendum	5.	& cur ita dictum	
25		* 4. 1	
Ilia, & eorum situs		Intestinum tenuius	
4. 1		ibidem	
per Imbros qui morbi		Intestinum crassius	
oriantur	2. 1	ibidem	
Imbecillissima materia		Intestinelorum nomina	
		P	dinet

* <i>Diversa, & differen-</i>	4. 3	
<i>tia & situs</i>	<i>ibid.</i>	L
<i>Intestinum cecum &</i>		L <i>Abor quid faciat</i>
<i>rectum</i>	<i>ibid.</i>	1. 1
<i>Intestinorum morbi,</i>		<i>Laborem quis facilius</i>
<i>& eorum curatio</i>		<i>toleret per etatem</i>
4. 10		1. 3
<i>Intestini tenuioris mor-</i>		<i>Laborantibus ex partu</i>
<i>bi curatio</i>	4. 14	<i>remedium</i>
		5. 25
<i>Iocinoris morbus</i>		* <i>Lagophthalmos</i>
4. 8		7. 7
<i>in Iocinoris morbo quæ</i>		<i>Lateris dolor</i>
<i>periculosa</i>	2. 7	4. 6
* <i>Intestinorum percussio-</i>		<i>ad Laternum dolores ma-</i>
<i>rum signa</i>	5. 26	<i>lagma</i>
		5. 18
<i>Intestina vulnerata</i>		<i>Lauatio</i>
<i>quomodo curari de-</i>		1. 3
<i>beant</i>	7. 16	<i>Lenticula</i>
<i>Iolla medici compositio</i>		6. 5
5. 22		8. 3
<i>Iocinoris percussi signa</i>		<i>Lepis</i>
5. 26		3. 20
<i>Iudai compositio</i>	5.	<i>Lenitas intestinorum,</i>
22		<i>à quibus etatibus de-</i>
<i>Iudai emplastrum</i>	5.	<i>pellitur</i>
19		2. 7
<i>Iugale</i>	<i>libr. 8.</i>	* <i>Leguminum differentia</i>
<i>cap. 1</i>		<i>in cibis</i>
<i>Iuguli fracti curatio</i>		2. 17
		<i>Leuca</i>
		<i>lib. 5. cap. ult.</i>
		* <i>Leuia ingenia qualia</i>
		8. 4
		<i>Lenitas intestinorum,</i>
		<i>& eius curatio</i>
		4. 16
		<i>Leucophlegmati</i>
		3. 21
		<i>Leuant</i>

<i>Leuantia siue leuigan-</i> <i>tia</i>	5. 13	<i>Luxuria</i>	libr. 1. in proam.
<i>Lienteria</i>	2. 1	<i>M</i>	
<i>Lien siue lienis</i>	4. 1	<i>M</i>	<i>Aschaon libr. 1.</i> in proam.
<i>Lienes quibus magni</i> <i>sint</i>	2. 5	<i>Malagmatum compo-</i> <i>sitiones varia</i>	5. 17
<i>Lienis malum quando</i> <i>periculosum</i>	2. 7	<i>Mala</i>	8. 1
<i>Lienis morbi curatio</i>	4. 9	<i>Manus luxata quo-</i> <i>modo restitui debeat</i>	8. 17
<i>ad Lienem malagma</i>	5. 18	<i>Materia extrahenda</i> <i>per malagmata</i>	5. 18
<i>Lienis vulnerati signa</i>	5. 26	<i>Materia genere & mo-</i> <i>do utendum pro vi-</i> <i>ribus cuiusq;</i>	2. 17
<i>Lingua resolutio, eiusq;</i> <i>curatio</i>	4. 2	<i>Maxilla</i>	8. 1
<i>Linguarum ulcera</i>	6. 12	<i>Maxilla fracta curatio</i>	8. 7
<i>Lippitudine laboran-</i> <i>ribus quid opus sit</i>	1. 5	<i>Maxilla luxata curatio</i>	8. 12
<i>Litterarum disciplina</i> <i>animo necessaria,</i> <i>corpori inimica</i>	1. proam.	<i>Medicina nusquam nō</i> <i>est</i>	1. proam.
<i>Lucubrandum quando</i> <i>potissimum</i>	1. 2	<i>Medicina quid promut-</i> <i>tat</i>	ibid.
<i>Luxata membra quo-</i> <i>modo restitui debeant</i>	8. 11	<i>Medicina multiplex</i> <i>ibidem</i>	
		<i>Medendi scientia, sa-</i> <i>pientia pars</i>	ibid.
		P 2	<i>Med</i>

<i>Medicina triplex</i>	<i>ibi-</i>	<i>Meliceria</i>	5.26
<i>dem</i>		<i>Meliceria</i> <i>sive meliceris</i>	
<i>Medicina qua victu cu-</i>		<i>lib.5.cap.28. & lib.7.</i>	
<i>rat in duas partes di-</i>		<i>cap.6</i>	
<i>uisa</i>	<i>ibid.</i>	<i>Meningophylax</i>	8.3
<i>Medicina qua pars dif-</i>		<i>Menophilus medicus</i>	
<i>ficilima</i>	<i>ibid.</i>		8.7
<i>Medicinam artem con-</i>		<i>Menemachus</i>	6.9
<i>iecturalem</i>	<i>ibid.</i>	<i>Mensa secunda</i>	1.2
<i>Medicina quid</i>	<i>ibid.</i>	<i>Metrodorus medicus,</i>	
<i>Medicorum officium,</i>		<i>Epicuri discipulus</i>	3.
<i>quodnam sit in curan-</i>			20
<i>do ex Asclepiadis sen-</i>		<i>Mentum</i>	8.1
<i>tentia</i>	3.4	<i>Mithridatis antidotū</i>	
<i>Medici periti officium</i>			5.23
<i>circa agrum, cuius-</i>		<i>Modiolus</i>	8.3
<i>modi esse debeat</i>	3.6	<i>Mollientia</i>	5.15
<i>Media materia</i>	2.17	<i>Morbos in decursum</i>	
<i>Medulla percussa signa</i>		<i>relatos</i>	1. in pro-
	5.26	<i>mio</i>	
<i>Meges chirurgus lib. 5.</i>		<i>Morbos non eloquen-</i>	
<i>cap. 28. & libro 7. in</i>		<i>tia, sed remedijs cura-</i>	
<i>proœmio</i>		<i>ri</i>	<i>ibid.</i>
<i>Melas lib. 5. cap. ult.</i>		<i>Morborum tria genera</i>	
<i>Melancholia</i>	2.5	<i>ibid.</i>	
<i>Mellis natura in medi-</i>		<i>Morbi per singulas tem-</i>	
<i>cina</i>	3.9	<i>pestates</i>	2.1
<i>ad Melicerat malagma</i>		<i>Morbus comitialis,</i>	
	5.18	<i>qua ætate agere cure-</i>	

I N D E X.

• Nota in singulis mor- bis observanda	2.6	curari debeant	7.11. & 6.11.
• Nota	8.1	Orthopnea	4.4
Numenij malagma	5.	Ōsis fracti curatio	
18		8.7	
Nymphodorus medi.		Os quot modis excida- tur	8.3 8.1
2.20		Osta vitata	7.13.
O		Ōsteos	6.8. & 7.3
Ōfcanarum par- tium vitia quo- modo curanda sint		Ōs alva	5.11
6.13		Ōs	
Oculorum varij morbi		P	
6.6		Alma	8.3
Oculorum natura indi- catio	7.7	Partus emertius in utero quomodo ex- cutiendus	7.29
Oculorum vitia , & eorum curationes	6.6	ad Panum malagmata	
Olerum differētia	5.17	5.13	
Omentum , eiusq; offi- cium	4.1	Paralysis	2.1.
Omenti curatio	7.21	Paralysis oculorum	
Onoplate	8.1	6.6	
Opisthotonos	4.3	Parasynanche	4.4
Ōphiocoris	6.4	Periculum in tabe qua denuntient	2.7
Oreſtes , quo genere insania laboraverit		Parodontides	6.13
3.13		Parotides	6.16
Oris ulcera , quomodo		ad Parotidas malagma- ta	5.13
		Partium animalium dif- ferentia	

I N D E X.

<i>Firentia in cibis</i>	2.18	<i>Phacos</i>	6.5
<i>Panificia</i>	eodem	<i>Phagedena in cole na-</i>	
<i>Pasti differentia in po-</i>		<i>scientis curatio</i>	6.18
<i>tionibus</i>	eodem	<i>Philippus Epirotes me-</i>	
<i>Pastillorum descriptio-</i>		<i>dicus</i>	3.21
<i>nes, & varia compo-</i>		<i>Philocratis emplastrum</i>	
<i>sitiones</i>	5.20		5.19
<i>Pastillus Polybij</i>	ibid.	<i>Philocrates</i>	5.26
<i>Pastillus Andronis</i>		<i>Philon</i>	6.6
<i>ibidem</i>		<i>Philothis collyrium cod.</i>	
<i>Parotides arteria</i>	4.1	<i>Philoxenus medicus</i>	
<i>Patella</i>	8.1		6.19
<i>Pecten</i>	ibidem	<i>Philotinus</i>	8.20
<i>Pediculi in palpebris o-</i>		<i>Phlegmone</i>	1. in pro.
<i>culorum</i>	6.6	<i>Phrenesis sine phrene-</i>	
<i>ad Pedum dolores ma-</i>		<i>tidis genera plura</i>	
<i>lagma</i>	5.18		3.18
<i>Peripneumonia</i>	4.7	<i>Phthisis</i>	2 c.1. &
<i>Pesti compositio</i>	5.21		lib.3.c.22
<i>Pesti alia compositio</i>		<i>Phygethlon</i>	5.18. &
<i>eodem</i>			6.28
<i>Pesti Numenij</i>	eod.	<i>Phymata</i>	2.7. &
<i>Pestilentia unde fiat</i>			5.18. & 5.28
1.2		<i>Piscium differentia in</i>	
<i>in Pestilentia qua sint</i>		<i>cibis</i>	2.17
<i>observanda</i>	1.3.	<i>Pituita oculorum quo-</i>	
ca.10		<i>modo curanda sit</i>	7.7
<i>Petro medicus</i>	3.3	<i>Planta</i>	8.1
<i>Pharmacentica</i>	1. pro.	<i>Plistonius Praxagora</i>	
			discip

discipulus 1. in pro.	Pterygion	6.19
Podagra li. 2. c. 6. &	Ptolemaeus rex	5.23
4.24	Ptolemaeus chirurgus	
Podagra calida cura-	6.7	
tio, per malagma	Pueritia quibus morbis	
5.18	periclitetur.	2.1
• Polypus	6.8	• Pulmo ubi situs sit, &
• Polypus in naribus		qualis sit
7.10	• Pulmonis morbus, quo	4.1
Ponderum ratio	5.17	pericula portendat
Porrigo	6.2	2.7
Potionum differentia	• Pulmonis percussi sig.	
2.17	5.26	
Potiones in febris,	Purgantia.	5.5
quando & quomodo	Purgationes reiecta ab	
dari debeant	3.6	Asclepiade
Praxagoras	lib. 1.	Purgationes interdum
in proæ.		necessaria, interdum
Prandium quid requi-	inutiles	1.3
rat.	1.3	• Pus in oculis
Protarchus	5.28	• Pusculari genera
Proptosis	6.6	Pus, eiusq; differentia
Prudens medicus quis	5.28	
habeatur	5.26	Puru significatio
Psorici descriptio	6.6	Pus coquentia sine ma-
Psydratio	5.28	turantia, & mouen-
Psylli, quibus medica-		tia
mentis vniuntur ad-	Pylorus	4.1
uersus venena	5.26	Pyrates
		5.18.
		Pysib

Pythagoras 1.pro. gna 5.28

Q Resolutio stomachi 4.5

Q Variata nemi- Resolutio oculorum 6.6

Q nem ingulat Rhagadia 6.18

3.15 Rhizas 7.7

in Quartana veteri, Rhypodes emplastrum

quid observare profit 5.19

3.15 Rodentia 5.6

Quartana febris cura- Rose natura in medi-

tio ibidem cina 3.9

R S

R Adius 8.1 S Acer ignis 5.28.

R Rationalis me- S Sanguis ex nari-

dicus quis & unde bus, quibus saepe fluit.

dicatur 1.pro. 2.5

adversus Rabidi canis Sanguinis detrahtio.

morsum 5.26 quot modis fiat 2.9

Ramex 7.18 Sanguinis natura &

Ramicis curatio 7.22 proprietas 4.3

Recidiva quando timen Sanguinem supprimē-

da 3.4 tia 5.1

Refrigerantia qua 1.3 ad Sanguinem suppri-

Regius morbus, & cur mēdu malagma 5.18

ita dictus sit 3.24 Sanguis, atq; eius dis-

Renes, & eorum situs sistentia 5.26

4.1 adversus Sanguinis pro-

Renum curatio 4.10 fusionem in vulneri-

Renū percussorum si- bus eodem.

ne vulneratorum si- Adversus Sanguisu-

I N D E X.

gam	ibidem	cap.1
Ganies, & eius differe-	Septi trāsuerſi percuſſi	
rentia	ibidem	ſigna 5.26
de Sanitate tuenda li-	Septicum	7.21
brum ſcripſit Aſcle-	Scrapion	1.in proc.
piades	1.3	*Siccitas quid mali infe-
Satietas nimia nunquā	rat corporibus	2.1
uſilis	1.2	*Signa in agrotantibus
Sarcophagus	4.c.vlt.	bona quæ ſint 2.2
Sarcoccele	7.18	*Signa in agrotantibus
Saſagoras	5.8	mala quæ ſint 2.3
Scapula	8.1	Signa longæ valetudi-
Scoptula	eodem	nis quæ ſint 2.4
Scorpio ſibi ipſe me-	Signa membrorum per-	
detur	5.26	cuſſorum 5.26
aduſus Scorpionis	Silanus	3.18
iltum	ibidem	2.7
Scrotum, quod & ſcor-	Siligo	
tum quidam dicere	*Singultus frequēs quid	
malint	indiceret	2.5
7.18	Singultus ſternutamē-	
Secunde quæ ſint	to finitur	2.7
7.29	Spagitites vena	4.1
Secunda menſa	1.2	2.1
Seminis profuſio, &	Spaſmos	
eius curatio	4.21	Spina luxata quomo-
Senectus, quibus mor-	do reſtitui debeat	
bis magis obnoxia ſit	7.14	
2.1	Sputum quid ſignificet	
Septū trāsuerſum li.1.	2.7	
in proc. & lib. 4.	Staphyloma	7.7
	Statu	

* Statura longa	2.1	periculosissima est	
Steatomata	7.6	1.3	
Sternutamenta quomo- do excitanda	5.22	Suffusio oculorum	6.6
Stercus animalium	5.	Sumpturis cibum post fatigationē, qua ob- servanda	1.3
5. & 8.12			
* Stomachum infirmum		Suppurationes	3.27
indicantia	1.8	* Supprimentia sangui- nem	5.1
* Stomacho laborantibus - qua agēda sint	cod.	Sutura in capite quot sint	8.1
* Stomachi infirmitas		Sycosis	6.3
quibus signis cogno- scatur	ibidem	Synanche	4.4
Stomachus nonnun- quam pro gula acci- pitur	4.1	T	
Stomachi duplex signi- ficatio	ibidem	Tabes	2.1. & 4.7
Stomachicuratio	4.5	Tabes, eiusque species	
Stomachi percussi sig.		Tali	8.1
5.26		Talus luxatus, quomo- do restitui debeat.	
* Stomachus studiosorum		8.22	
qualis plerūq; sit.	1.2	Telum Latum, quomodo educendum	7.5
Stomoma	6.6.	Telis extrahēdis reme- dium	codem
Stranguria	2.1	Tempora anni conside- randa	1.3
* Struma	5.28	* Tempestates qua opti- ma,	
Strophos	2.6		
Sudanti ex labore &			
vinere frigida potio			

<i>ma</i> , quâq; pessima		<i>Tormina</i> quando peri-	
2.1		culosa non sint	2.7
<i>Terebra</i>	8.3	<i>Tormina</i> quibus bona	
<i>Tetanus</i>	2.1. &	sint	eodem
4.3		<i>Tormina</i> , id est dysen-	
<i>Tether-pneumena</i>	5.19	teria	4.15
<i>Tetrabarmiacum em-</i>		<i>Tristitia</i> longa quid in-	
<i>plastrum</i>	5.19. &	dicet	2.5
6.18		<i>Tussis</i>	4.4
<i>Testiculorum natura, et</i>		<i>Tympanites</i>	3.21
<i>eorum morbi</i>	7.18		
<i>de Testiculorum mor-</i>		V	
<i>bis</i>	6.18	V <i>Aletudinis in-</i>	
<i>Testiculorum incisio</i>		stantis quæ si-	
7.19		gna	lib.1. pro.
<i>Tharrias medicus</i>	2.17	<i>Valentissimum</i> quid	
3.20		<i>Vari</i>	6.5.
<i>Themisum</i>	1. in pro.	<i>Varices</i> quomodo cu-	
<i>Theodoti collirium</i>	6.6	rari sint	7.17
<i>Therioma</i>	5.28	<i>Varicum</i> curatio	7.31
<i>Theoscnus</i>	5.18	<i>Vetus</i> toto die quid si-	
<i>Thymium</i>	5.18	cere debeat	1.3
<i>Tibia</i>	3.1	<i>Ventrem</i> solutum quid	
<i>Tinai compositio</i>	5.22	comprimat	eodem
<i>Titio extinctus</i>	3.12	<i>Ventrem</i> compressum	
<i>Tonsillarum vitium</i>		quid soluat	eodem
6.10		<i>Ventriculus</i> ex quibus	
<i>Tonsillis laborantibus,</i>		constet, & eius si-	
quid conveniat	1.5	tus	4.1
		<i>Ventri</i>	


- Ventriculus* ex quibus constet, & eius situs 4.1
Ventriculi vulnerati signa 5.26
Venarū ora subito suppressa, alioqui sanguinem fundere consueti, quid indicent 2.5
Venere abstinendum quando, & quando non sit 1.3
Venti quinā salubres, & qui non sint 1.1
Venenis omnibus contrarium quid 5.26
aduersus Venenosorum animalium ictus eodem
Ver saluberrimum 2.1
Vere quæ ad victum magis conueniant 1.3
Vere qui morbi fiant 2.1
Vertebre 8.1
Vesica, & eius situs 4.1
Vesica vulnerata signa 5.26
Vinere elatum *Asclepiades* funeri obuius intellexit 2.5
Viuorum corpora incidere, crudele & superuacuum esse 1.
proæmio
Vmbilici prominentis curatio 6.17
Vmbilici vicia quomodo curari debeant 7.18
Vngues 8.1
Vntio 1.3
Vonitus quando, & quibus utilis aut inutilis eodem
Vomitus si post cibum fieri debeat, quomodo pronocandus eod.
Vrina sana quæ 1.2
Vrina reddenda difficultati, quomodo succurratur lib.7.ca.26.
 & lib.1.ca.25
Vrina parum liquida, in sano homine quid signi

I N D E X.

<i>significet</i>	2.5	<i>Vulsella</i>	7.3 ^a
<i>Vrina quæ mala</i>	2.3	<i>Vulna & eius situs</i>	
<i>Vreteres</i>	4.1	4.1	
<i>Vti Synanche</i>	4.4	<i>Vulna percussa signa</i>	
<i>Vna morbus intra sin-</i>		3.26	
<i>ces</i>	6.14. & 7.12	<i>Vulna natura mirabi-</i>	
<i>Vulnera quomodo glu-</i>		<i>lis</i>	7.21
<i>tinanda</i>	5.26		
<i>Vulnerum signa eodem</i>		Z	
<i>Vulnerum differentia</i>			
<i>ex ipso mersu eodem</i>		Z <i>Enon</i>	lib. 5.
<i>Vulnus glutinantis</i>	5.2	Z <i>in præ.</i>	
<i>Vulnera aperientia</i>	5.4	<i>Zopyrus</i>	li. 5. ca.

P I N I S.







fol. 130..

120747081

